

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.	
im DEI	Exemplare
Phyto adolescens Rondani 1861	7
Melanophora roralis (Linné 1758)	80
Oplisa aterrira (Strobl 1899)	1
Oplisa aterrira (Strobl 1899)	1
Stevenia atramentaria (Meigen 1824)	58
Stevenia eggeri (Strobl 1906)	11
Oplisa caesia Villeneuve 1911	3
Phyto celer (Rondani 1862)	8
Phyto celer (Rondani 1862)	8
Stevenia deceptorica (Loew 1847)	8
Phyto discrepans (Pandellé 1896)	2
Phyto discrepans (Pandellé 1896)	2
Stevenia eggeri (Strobl 1906)	11
Paykullia kugleri (Herting 1961)	10
Stevenia laeviventris Loew 1847	1
Rhinophora lepida (Meigen 1824)	166
Acompomintho lobata Villeneuve 1927	67
Macrotarsina longimana (Egger 1856)	3
Paykullia maculata (Fallén 1815)	29
Paykullia maculata (Fallén 1815)	29
Rhinophora melania Meigen 18	1
Phyto melanocephala (Meigen 1824)	28
Paykullia nubilipennis (Loew 1847)	1
Stevenia obscuripennis (Loew 1847)	11
Stevenia pannonica Villeneuve 1919	32
Paykullia nubilipennis (Loew 1847)	1
Melanophora roralis (Linné 1758)	80
Tricogena rubricosa (Meigen 1824)	32
Rhinomorinia sarcophagina (Schiner 1862)	138
Stevenia signata (Mik 1866)	5
Stevenia deceptorica (Loew 1847)	8
Rhinomorinia subrostrata Villeneuve 1913	6
Oplisa tergestina (Schiner 1862)	4
Tromodesia vibripennis Rondani 1862	1
Tricogena rubricosa (Meigen 1824)	32
Stevenia umbratica (Fallén 1820)	22
Tromodesia vibripennis Rondani 1862	1