

Institut für Pflanzenschutzforschung (BZA)
der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR zu Berlin
Zweigstelle Eberswalde
Abteilung Taxonomie der Insekten (ehem. DEI)
Eberswalde

HELGA DÖBLER

Katalog der in den Sammlungen des ehemaligen Deutschen Entomologischen Institutes¹ aufbewahrten Typen — XII

(Coleoptera: Carabidae)

abnormicollis HEYDEN, 1882 (*Tachypus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 26, 100, 118)

♂ Holotypus, Hochgebirge um Margelan, leg. HABERHAUER, in Coll. KRAATZ; im DEI.

acroglyptus BATES, 1892 (*Colpodes*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 374)

Mehrere Syntypen, Burma; Karin Asciuii Ghecù, alt. 1400—1500 m, leg. FEA; Naga Hills, alt. 4000—5000 ft., leg. CHEN-NEILL.

DEI: 1 Syntypus, Carin Asciuii Ghecù, alt. 1400—1500 m, III.—IV. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

acutipennis BATES, 1892 (*Gnathaphanus*)

(l.c., 328)

Mehrere Syntypen, Burma, Rangoon, Mandalay, Toungoo, leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Birmania, Rangoon, 1887, leg. FEA.

Syn. zu *laevistriatus* STURM, 1818.

adamst subcylaneus KRAATZ, 1878 (*Sphodristus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 22, 101)

Mehrere Syntypen, Kaukasus, Coll. LEDER.

Lectotypenfestlegung durch MANDL (im Druck).

DEI: Lectotypus, Kaukas., durch LEDER, Nr. 120, Coll. KRAATZ; 2 Ex. dto., 1 Ex. dto. KASBECK, 1 Ex. Coll. KRAATZ; Paralectotyphen.

aegaeus APPFELBECK, 1904 (*Zabrus*)

(Käferf. Balkanh. 1, 312—313)

Mehrere Syntypen, Griechenland, Attika, Kykladen, Syra, Naxos, leg. KRÜPER und LEONIS; Kreta, leg. v. OERTZEN.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Syra, leg. LEONIS, Coll. FRANKLIN MULLER.

aeneipennis BATES, 1889 (*Drypta*)

(Ann. Mus. Genova (2) 7 (27), 109)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamò, leg. FEA, in Coll. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamò, VII. 1885, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

aenescens CHAUDOIR, 1850 (*Feronia*)

(Bull. Soc. Nat. Moscou 23, 142—143)

Mehrere Syntypen, parties orientales de la Sibérie, leg. GEBLER und SÉDAKOFF,

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, durch CHAUDOIR, Coll. KRAATZ, Nr. 12.

aenigmaticus ALLUAUD, 1935 (*Hyperectenus*)

(Afra 9, 15—16, Fig. 7—8)

Holotypus, Camerun, leg. CONRADT, ex Coll. KRAATZ; im DEI.

aequecostata STERNBERG, 1907 (*Anthia*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 49, 60)

3 ♂♂, Syntypen; Brit. Ostafrika, östlich vom Shire-Fluß, Blantyre; Deutsch-Ostafrika, Uhehe; in Coll. STERNBERG.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Kigonsere, 1906, Coll. KRAATZ.

aetolica olympica MARAN, 1938 (*Nebria*)

(Sborn. Nar. Mus. Praze 1, No. 4, 52, 55)

ca. 150 Syntypen; Thessalia, Berg Olympus, 2000—2700 m, 1. VI. 1937, im Museum Prag.

DEI: 1 Syntypus, Graecia albin, Olympos, 2200—2700 m.

¹ Jetzt: Institut für Pflanzenschutzforschung (BZA) der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR, Zweigstelle Eberswalde, Abteilung Taxonomie der Insekten.

aetolus SCHAUM, 1864 (*Zabrus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 8, 186)

Mehrere Syntypen, Griechenland, am Velucchi, leg. KRUEPER.
DEI: 3 Syntypen, Veluchi, Coll. SCHAUM.

afgana JEDLIČKA, 1956 (*Cymindis*)

(Acta Ent. Mus. Pragae 30 (1955), Nr. 452, 203)

Holotypus, 20 Paratypen, Afghanistan, Badakshan, Anjuman Paß, 1952—1953, Exped. KLAPPERICH, in Coll. KLAPPERICH und Coll. JEDLIČKA.
DEI: 1 Paratypus, NO-Afghanistan, Badakshan, Anjuman-Paß, Anjuman-Geb., 4200 m, 18. VIII. 1952, leg. KLAPPERICH.

albanicus APFELBECK, 1904 (*Zabrus*)

(Käferf. Balkanh. 1, 316)

♀ Holotypus, Albanien, bei Prisren, leg. DIECK, in Coll. v. HEYDEN; im DEI [Sweti Troitze]¹.

albicornis KOLBE, 1889 (*Euleptus*)

(Stett. Ent. Ztg. 50, 121)

Mehrere Syntypen, Kongo, im Gebiet des unteren Quango, Kwako bis Kimpoko, leg. BüTTNER.
DEI: 1 Syntypus, Kongo, Kimpoko, leg. BüTTNER, Coll. KRAATZ.

albicornis SCHAUM, 1860 (*Tachys*)

(Berl. Ent. Ztschr. 4, 199)

Mehrere Syntypen, Honkong, leg. BOWRING.

DEI: 2 Syntypen, Honkong, Coll. GERMAR-SCHAUM.

Syn. zu *ovatus* MOTSCHULSKY, 1851.

alini JEDLIČKA, 1942 (*Amara*)

(Arb. morph. tax. Ent. 9, 10—11)

♀ Holotypus, Mandschukuo, Gaolinzy, leg. ALIN; im DEI. [14. VII. 1946]

alpestris kalofericus MLYNÁŘ, ? (*Molops*)

(soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden)

DEI: 1 ♂ Paratypus, Kalofer-Balkan, VI. 1933, Mař. Táb.

alpestris rhilensis APFELBECK, 1904 (*Molops*)

(Käferf. Balkanh. 1, 225)

Mehrere Syntypen, Bulgarien, Rhilo-Dagh.

Lectotypenfestlegung durch MLYNÁŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).

DEI: 1 ♂ Paratactypus, Balkan, via KRAATZ.

alternans KUNTZEN, 1912 (*Dercyloides*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 583)

2 ♂♂, 2 ♀♀, Columbien, leg. MORITZ; 1 ♂, 1 ♀, bei Caracas, leg. THIEME, im Museum Berlin; Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, Venezuela, Coll. SCHAUM-Coll. KRAATZ.

alveolatus BATES, 1892 (*Mastax*)

(Ann. Mus. Civ. Genova, (2) 12 (32), 398)

Mehrere Syntypen, Palon (Pegu), leg. FRA.

DEI: 1 Syntypus, Palon (Pegu), VIII. IX. 1887, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *laeviceps* BATES, 1891.

amphibolus MÜLLER, 1922 (*Dyschirius*)

(Koleopter. Rundsch. 10, 40, 57)

Mehrere Syntypen, Transkaspien, Gr.-Balachan, Dschebell, 1898, leg. HAUSER, im Wiener Museum.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

anatolica JEDLIČKA, 1965 (*Nebria*)

(Reichenbachia 5, 213, Fig. 1 b)

♂ Holotypus, mehrere Paratypen, Anatolien, Egribel-Paß südlich Giresun, ca. 2400 m Höhe, am Rande von Schneefeldern, VII., leg. HEINZ und KORGE, in Coll. JEDLIČKA, Coll. KORGE und HEINZ.

DEI: 1 Paratypus, Anatolia bor., Egribel-Paß, 2000—2400 m, 28. VII. 1963, leg. KORGE.

andreae TSCHITSCHERIN, 1898 (*Amara*)

(Horae Soc. Ent. Ross. 32, 221—222)

3 ♂♂ Syntypen, Province de Semiretschje, Umgebung von Issyk-kul, durch KOLTZE.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Issik-kul (nicht Issyk-kull), leg. TSCHITSCHERIN, Coll. KOLTZE, Nr. 1837.

andreae polonicum MÜLLER, 1930 (*Bembidion*)

(Coleopt. Centralbl. 5, 1)

Holotypus, Warschau, im Museum „Pietro Rossi“ in Duino; 4 Ex. Umgeb. von Warschau; 1 Ex. N.-O. Polen, Wilno; 1 Ex. N.-W. Russland, Peipus-See; durch MAKOLSKI: Paratypen.

DEI: 2 Paratypen, Warszawa, Baniocha.

¹ In [] wurden die Angaben gesetzt, die sich auf den Etiketten befanden, in der Originalbeschreibung aber fehlten.

andreinii GESTRO, 1907 (*Anophthalmus*)

(Ann. Mus. Genova (3) 3, 170—171)

Mehrere Syntypen, in der Nähe Castelnuovo di Garfagnana, 17. IV. 1907, leg. DODERO und GESTRO.
 DEI: 1 Syntypus, Garfagnana, durch PAGANETTI, Coll. FRANKLIN MÜLLER.

andrewesi JEDLIČKA, 1932 (*Horniulus*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 29, 86)

Holotypus, 15 Paratypen, Formosa, Banshōryō, Distr. Sokutsu, SAUTERS Exp., im DEI, in Coll. ANDREWES und Coll. JEDLIČKA.
 DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung, 7. VIII. 1912, leg. SAUTER; 11 Paratypen dto.

andrewesi JEDLIČKA, 1931 (*Pterostichus*)

(l.c. 28, 23—24)

ca. 70 Syntypen, China mer., Prov. Szechuan, Chung-king, V.—VI. 1929, in Coll. ANDREWES, Coll. BECKER, Coll. JEDLIČKA und im DEI.
 DEI: 2 Syntypen, Szechuan, Chung-king, Coll. BECKER.

andrewesi JEDLIČKA, 1932 (*Risophilus*)

(l.c. 29, 84—85, Fig.)

Holotypus, Formosa, Suisharyo, Exp. SAUTER; im DEI.

andrewesi JEDLIČKA, 1932 (*Tachys*)

(l.c., 79—80)

Holotypus, 10 Paratypen, Formosa, Akau, Exp. SAUTER, im DEI, in Coll. ANDREWES und Coll. JEDLIČKA.
 DEI: Holotypus, 6 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, XII. 1907.

andrewesi EMDEN, 1937 (*Taridius*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 4, 123—125)

♂ Holotypus, 36 Paratypen, Java, Nongkodjadjar, in Coll. v. EMDEN, Coll. ANDREWES und im DEI.
 DEI: 3 Paratypen, O-Java, Tengger, Nongkodjadjar, 1300 m, leg. WEGENER, Gesch. XII. 1935 von OVERBECK.

angolensis BASILEWSKY, 1942 (*Hystrichopus*)

(l.c., 9, 165—166)

Holotypus, Angola, Benguela, ex Coll. v. BENNIGSEN; im DEI [Portug. 90. A].

angulifrons BATES, 1892 (*Siagona*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 284—285)

Mehrere Syntypen, Burma, Rangoon, Mandalay, Palon (Pegu), leg. FEA.
 DEI: 2 Ex. Palon, Pegu, 8. IX. 1887; 2 Ex. Birmania, Rangoon, 1886, leg. FEA, Coll. KRAATZ; Syntypen.

angusticollis BATES, 1892 (*Dolichoctis*)

(l.c., 413)

Mehrere Syntypen, Burma, Meetan, Moulmein (Tenasserim), leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Tenasserim, Moulmein, VII. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

apfelbecki GANGLBauer, 1892 (*Molops*)

(Käfer Mitteleuropas 1, 302, 305—306)

Mehrere Syntypen, Herzegovina, Volujak, leg. APFELBECK.

DEI: 1 Syntypus, Herzegovina, Montenegro, Volujak, leg. APFELBECK, Coll. FRANKLIN MÜLLER.

arctica SAHLBERG, 1880 (*Feronia*)

(Svensk. Akad. Handl. (2) 17, nr. 4, 31)

Mehrere Syntypen, nordwestl. Sibirien, *Lapponia russica*, im Thal des Jenisseensi, Exped. 1876—1877, im Museum Holm. und Museum Helsingf.

DEI: 1 Syntypus, Lapp. ross., leg. SAHLBERG, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *fastidiosus* MANNERHEIM, 1853.

arimao DARLINGTON, 1934 (*Schizogenius*)

(Psyche 41, 71—72)

♂ Holotypus, no. 19492, 24 Ex. Cuba, Soledad, nahe Cienfuegos, aus dem Arimao River, VI., 19. X., 1., 3. XII., leg. DARLINGTON, im Museum Comparative Zoölogy; 1 Ex. Cumanayagua, Santa Clara, 10. VI., leg. DE ZAYAS, in Coll. Estación E. Agronómica, Cuba; Paratypen.

DEI: 2 Paratypen, Cuba, Soledad, Cienfuegos, 1. XII. 1926, leg. DARLINGTON.

armeniacus repletus REITTER, 1884 (*Carabus*)

(Wien. Ent. Ztg. 3, 143)

Mehrere Syntypen, Kaukasus, Swanetien, leg. LEDER.

DEI: 1 Syntypus, Kaukasus, Swanetien, LEDER-REITTER, Coll. KRAATZ, Nr. 462.

armeniacus scintillus REITTER, 1884 (*Carabus*)

(l.c., 143)

Mehrere Syntypen, Kaukasus, Swanetien, leg. LEDER.

DEI: 1 Syntypus, Kaukasus, Swanetien, durch LEDER-REITTER, Coll. KRAATZ.

armeniacus subincatenatus KRAATZ, 1878 (*Sphodristus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 22, 108)

♂ Holotypus, ex Coll. SCHAUM; im DEI.

articulatooides JEDLIČKA, 1932 (*Bembidion*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 29, 79)

Holotypus, China, Prov. Schantung, im DEI; 2 Ex. dto.; 7 Ex. Tientsin: Paratypen.

DEI: Holotypus, 1 Ex. China, Schant., Jentschoufu, 1911—1912, leg. KREYENBERG, 6 Ex. Tientsin, Ross commut: Paratypen.

asper JEDLIČKA, 1936 (*Platynus*)

(Čas. Čs. Spol. Ent. 33, 17)

Holotypus, China, Yunnan fous; 18 Paratypen, dto., in Coll. JEDLIČKA, Coll. ANDREWES und im DEI.

DEI: 2 Paratypen, China merid., Provincia Yunnan.

europunctata alaiensis LAPOUGE, 1930 (*Campalita*)

(Misc. Ent. 32, 85—86)

Mehrere Syntypen, Alai.

DEI: 1 Syntypus, Alai, Jspajran, Coll. LEONHARD.

babaulti ANDREWES, 1924 (*Bembidium*)

(Miss. BABAUT, Prov. Centr. Inde, 80—81, Tafel 1, Fig. 7)

Indien, occ. Himalaya, 1914: 1 Ex. Kulu, Mandi, leg. BABAUT; mehrere Ex. Kumaon, W. Almora und Nainital, leg.

CHAMPION; Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, W. Almora, Divn, Kumaon, U.P. III. 1917, leg. CHAMPION.

badakschanus JEDLIČKA, 1955 (*Harpalus*)

(Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 30, Nr. 452, 196)

♂ Holotypus, 4 ♂♂ Paratypen, Afghanistan, Badakshan, Shiwa, Exped. KLAPPERICH, 1952—1953, in Coll. KLAPPERICH und Coll. JEDLIČKA.

DEI: 1 ♂, Paratypus, NO-Afghanistan, Badakshan, Schiwa, Hochsteppe, 2900 m, 11. VII. 1953, leg. KLAPPERICH.

bakeri DUPUIS, 1913 (*Casnoidea*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 57, 270—277)

3 Syntypen, Philipinen, Los Banos, leg. BAKER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, P.J.

balcanicus HEYDEN, 1883 (*Zabrus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 27, 309)

♂ Holotypus, Balkangebirge, leg. HABERHAUER, in Coll. v. HEYDEN; im DEI.

banningeri JEDLIČKA, 1931 (*Pterostichus*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 28, 24—25)

11 ♂♂, Syntypen, China mer.; Prov. Szetschuan, Chung-king, V.—VI. 1929, in Coll. ANDREWES, Coll. JEDLIČKA und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Chung-king, Szetschuan, Coll. BECKER.

basalis SLOANE, 1907 (*Phloeocarabus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 182)

Mehrere Syntypen, New Guinea, New Pommerania (N. Britain), Gazelle, Peninsula, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN und Coll. v. BENNIGSEN.

DEI: 1 Syntypus, Gazelle, M. Insel, Coll. v. BENNIGSEN.

batesii CHAUDOIR, 1861 (*Hiletus*)

(Bull. Soc. Nat. Mosc. 34 (1), 508—510)

Mehrere Syntypen, Region des Amazonas, Ega, leg. BATES.

DEI: 1 Syntypus, Ega, ex Museo BATES 1892 — ex Coll. v. HEYDEN.

beckeri JEDLIČKA, 1931 (*Dolichus*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 28, 28—29)

11 Syntypen, China mer.; Prov. Szetschuan, Chung-king, V.—VI. 1929, in Coll. JEDLIČKA.

DEI: 1 Syntypus, Chung-king, Szetschuan, Coll. BECKER.

beesoni ANDREWES, 1927 (*Pterostichus*)

(Ent. Mitt. 16, Nr. 2, 145—146)

Holotypus, Irak, Amara, 13.—15. XI. 1916, leg. BEESON, im Britischen Museum; 3 Ex. dto., 6 Ex. Basra, 16.—22. IV., 13. VI. 1926, leg. SCHMIDT, im DEI; Paratypen.

DEI: 4 Paratypen, Basra, 16.—22. IV., 13. VI. 1926, leg. SCHMIDT.

belli ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova 51, 411—412)

14 Syntypen, Sind, Karachi, leg. BELL.

DEI: 1 Syntypus, Karachi, leg. BELL.

bennigseni STERNBERG, 1906 (*Anthia*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 164–165)

6 ♂♂, Syntypen, Afrika, in Coll. STERNBERG.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. v. BENNIGSEN.

bennigseni SLOANE, 1907 (*Colpodes*)

(l.c., 177–178)

Mehrere Syntypen, New Guinea, Kaiser Wilhelm Land, Sattelberg, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN.

DEI: 1 Syntypus, D.N. — Guinea, Sattelberg, Coll. v. BENNIGSEN.

bennigseni SLOANE, 1907 (*Lesticus*)

(l.c., 471–472)

♀ Holotypus, New Guinea, Gazelle Peninsula, Herbertshöhe, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN; im DEI [Hinterland von Herbertshöhe].

bennigseni ALLUAUD, 1935 (*Rhopalomelus*)

(Afra 9, 11–12)

Holotypus, Afrique, N.-E. Nyassa, Uhéhé, Coll. v. BENNIGSEN, im DEI.

bhamoensis BATES, 1892 (*Ophionea*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 380)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamo, leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamo, VI. 1885, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

biangulata DUPUIS, 1912 (*Pentagonica*)

(Bull. & Ann. Soc. Ent. Belg. 56, 312–314)

Holotypus, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER; im DEI [VIII. 1909].

bicolor BASILEWSKY, 1942 (*Pseudolebia*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 9, 164, Fig. 1)

4 Syntypen, Madagascar, Coll. KRAATZ, im DEI.

DEI: 1 Ex. Madagascar, Coll. KRAATZ, 1 Ex. ohne Fundort; Syntypen.

bifasciata SCHAUM, 1860 (*Pericarus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 4, 191–192, Tab. 3, Fig. 4; nom. praeocc. = *schaumii* CHAUDET, 1861, l.c., 5, 123)

Mehrere Syntypen, Costarica, leg. WAGNER.

DEI: 1 Syntypus, Costa Rica, Coll. SCHAUM.

biharicus BREIT, 1912 (*Pterostichus*)

(Koleopter. Rundsch. 1, 153–154)

Mehrere Syntypen, Ungarn, Südbihar, Waldregion des Cucurbetastockes, leg. BREIT.

DEI: 2 Syntypen, Hungaria, Biharföld, Bihar.-Com., Coll. LEONHARD.

Syn. zu *sacheri* FRIVALDSKY, 1865.

binoculus BATES, 1892 (*Creagris*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 390)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamo, Khasia Hills, leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamo, VIII. 1885, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

birmanica BATES, 1892 (*Galerita*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 385–386)

Mehrere Syntypen, Birmania, Bhamo, leg. FEA.

DEI: 2 Syntypen, Birmania, Bhamo, VIII., IX. 1886, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *peregrina* DOHRN, 1880.

birmanicus BATES, 1892 (*Megalonychus*)

(l.c., 369)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamo, Teinzò, Karin Asciuii Chebà, alt. 1200–1300 m; Noa Dehing in Assam, Khasia Hills, alt. 2000 ft.; leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Karin Asciuii Chebà, 1200–1300 m, III. 1888, leg. FEA.

birmanicus BATES, 1892 (*Trechus*)

(l.c., 297–298)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Asciuii Ghecù, alt. 1400–1500 m, leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Karin Asciuii Ghecù, 1400–1500 m, III.–IV. 1888, leg. FEA.

blandulum NETOLITZKY, 1910 (*Bembidion*)

(Wien. Ent. Ztg. 29, 221–223)

Holotypus, „Persia sett. Doria 62“, ex Museo Civ. Genova, in Coll. v. HEYDEN; im DEI.

blandus ANDREWES, 1924 (*Tachys*)

(Miss. BABault, Prov. Centr. Inde, 85–87, Taf. 1, Fig. 8)

Indien, occ. Himalaya, 1914; 1 Ex. Provinces Centrales, Montimala, leg. BABault; mehrere Ex.: Nagpur, Hoshangabad, Mandla, Fluß Nerabudda, leg. D'ABREU; Chota Nagpur, Ranchi, leg. IRVINE, im Indischen Museum; Bombay, Khandesh, leg. BELL; Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, Ranchi, leg. IRVINE, Indian-Museum Calcutta.

blumenthalii HEINZ, 1965 (*Pterostichus*)

(Reichenbachia 6, 18–20)

♂ Holotypus, Kleinasiens, Abant-Gebirge, 8. VIII. 1963, ca. 1100 m, leg. HEINZ, in Coll. HEINZ; Paratypen: 5 Ex. dto., in Coll. HEINZ und Coll. JEDLICKA; 16 Ex. dto., 20., 21. VIII. 1964, in Coll. HEINZ; 13 Ex. dto., 8. VIII. 1963/30. V. 1964, leg. KORGE, in Coll. KORGE.

DEI: 1 Paratypus, Anatolia bor., Abant-Geb. bei Bolu, 30. V. 1964, leg. KORGE.

bodemeyeri REITTER, 1907 (*Agonum*)

(Wien. Ent. Ztg. 26, 66)

Mehrere Syntypen, Kleinasiens, Sabandja, Karakeny, leg. v. BODEMEYER; Syrien, Kaukasus.

DEI: 1 Syntypus, Asia minor, Sabandja, leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

bodemeyeri DANIEL, 1902 (*Bembidium*)

(Münch. Kol. Ztschr. 1, 101)

Mehrere Syntypen, Asiae minoris provinciae, Phrygia und Bithynia, Biledschik, Eskischehir, 1899, leg. v. BODEMEYER; DEI: 1 Syntypus, Asia minor, Bilejek, leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

bodemeyeri APFELBECK, 1904 (*Brachynus*)

(Käferl. Balkanh. I, 347, 352–353, Fig. 4)

Mehrere Syntypen, Ost-Rumelien, Burgas, am Ufer des Salzsee's von Athanaskenj, 1892; Türkei, Konstantinopel, am Meeresstrand bei San Stefano, Floria und Kütschür Tschekmedje, 1900; Griechenland, Korfu, Salzsumpf bei Kalichipoulo, 1893; leg. APFELBECK; Missolonghi, leg. LEONIS; Albanien, Valona, leg. PATSCH; Kleinasiens, Ak Chéhir, Konia, Burna, Bulghar Maadén, 1899, leg. v. BODEMEYER; Kaukasus; Algerien, Zeitoun; in Coll. REITTER; Andalusien, Chiclana, 1890, leg. KORB, im Museum Wien.

DEI: 2 Syntypen, Asia-Minor, Bulghar-Maaden, Konia, leg. v. BODEMEYER.

bodemeyeri GANGLBAUER, 1900 (*Laemostenus*)

(In BODEMEYER, Quer durch Klein-Asien, 134–135)

1 ♂, 2 ♀, Syntypen, bei Bulghar-Magara, Nordseite des cilicischen Taurus.

DEI: 2 Syntypen, Asia minor, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. LEONHARD.

bodemeyeri FLEISCHER, 1915 (*Tachys*)

(Ent. Mitt. 4, Nr. 4/6, 130)

Mehrere Syntypen, Nordpersien, Iran, Elburzgebirge, leg. v. BODEMEYER.

DEI: 2 Ex. mit den Angaben der Beschreibung, Coll. LIEBMANN, 1 Ex. dto. Dörwögh-Dagh, Coll. LEONHARD; Syntypen.

bodemeyeri GANGLBAUER, 1914 (*Zabrus*)

(Münch. Kol. Ztschr. 4, 95, 120)

♂ Holotypus, Bos Dagh bei Eski Schehir, leg. v. BODEMEYER; im DEI [Asia minor, Bos-Dagh].

bodoanus REITTER, 1913 (*Trechus*)

(Ent. Bl. 9, 172–173)

Mehrere Syntypen, Chinesisch-Turkestan, Thian-Schan, leg. v. BODEMEYER.

DEI: 1 Syntypus, China, Thian-Schan, leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

bodongi STERNBERG, 1910 (*Tefflus*)

(Stett. Ent. Ztg. 71, 139)

Wenige Syntypen, Rhodesia, Manika-Land, Umtali, leg. BODONG, Zomba, Brit. S.-O. Afrika.

DEI: 1 Syntypus, Rhodesia, Umtali, leg. BODONG, Coll. KRAATZ.

bombycinus ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova 51, 385–386)

Mehrere Syntypen, Kumaon, Tanakpur, Swal River Basin, River Sarda Gorge, Haldwani-Nandhauer River; leg. CHAMPION; Dehra Dun, leg. CAMERON, im Forest. Res. Inst.; Eastern Duars; Sikkim, Gopaldhara; leg. STEVENS.

DEI: 1 Syntypus, E. Doors, leg. STEVENS.

[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Eastern Duars“ steht auf dem Etikett „E. Doors.“]

bradyceclooides REITTER, 1900 (*Harpalus*)

(Verh. naturf. Ver. Brünn 38 (1899), 113)

Mehrere Syntypen, Ostsibirien, Irkut; Nördliche Mongolei, Urga, Changai; Turkestan, Thian-Schan.

DEI: 1 Syntypus, Quell. d. Irbut, leg. REITTER.

Syn. zu *pusillus* MOTSCHULSKY, 1850.

[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Irkut“ steht auf dem Etikett „Irbut“.]

breiti montisgrappae AGAZZI, 1960 (*Duvalius*)

(Boll. Soc. Ent. Ital. 90, 78–80, Fig. 1–3)

Veneto, M. Grappa (Vicenza): in una cannoniera lungo la S. S. Cadorna (N. 141), il 1. VII. 1951, leg. MAGISTRETTI, 4 Ex.; Valle di Cancell' alto, sotto pietre infossata, tra il terriccio delle dolinette e di un piccolo cañon di origine glaciale e sotto pietre vicino le pozze di neve: 9 Ex. 20. VI. 1957, leg. GIACOMAZZO; 7 Ex. 17. VII. 1957, leg. RAFFONE; 28 Ex. (di cui una ♀ molto immatura), 15. VIII. 1957, leg. CADAMURO; 13 Ex. 15. VI. 1958, leg. BUCCIARELLI; 38 Ex. 10. VIII. 1958, leg. AGAZZI; 75 Ex. 15. VIII. 1958, leg. CADAMURO; 10 Ex. 28. V. 1959, leg. CADAMURO; 34 Ex. 5. VI. 1960, leg. AGAZZI; Holotypus und Paratypen, in Coll. AGAZZI; altri paratypi nelle Coll. CADAMURO, BUCCIARELLI und MAGISTRETTI.

DEI: 1 ♀, Paratypus, M. Grappa, Cancell' alto, 5. VI. 1960, leg. AGAZZI, Col. AGAZZI.

bremii GERMAR, 1817 (*Nebria*)

(Fauna Ins. Eur. 14, Nr. 1, Tab. 1)

Mehrere Syntypen, *Helvetiae alpibus*, im Museum GERMAR.DEI: 1 Syntypus, *Helveta Alp.*, Coll. GERMAR-SCHAUM.***brevicostatus forticosis*** BASILEWSKY, 1932 (*Tefflus*)

(Bull. Soc. Ent. Fr., 203)

D.O. Afrika: ♀ Holotypus, Usequa, 1 ♂, Usambara; im Britischen Museum; 2 Ex. Bagamoyo, im Museum Paris; Paratypen. DEI: 1 Paratypus, D.O. Afrika, Bagamoyo.

breviformis BATES, 1892 (*Epicosmus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 299)

Mehrere Syntypen, Burna, Karin Cheba, alt. 900–1100 m, Palon in Pegu, Thagata in Tenasserim; leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Palon, Pegu, VII.–IX. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

brevimarginatus STRANEO, 1941 (*Caelostomus*)

(Ann. Mus. Stor. nat. Genova 61, 12–13)

Holotypus, mehrere Paratypen; Kenya, Budongo, Kaimosi, leg. TURNER; N. Kavirondo, Osiri, leg. TURNER; Kamerun; Togo; Is. Fernando Poo, Basilé, leg. FEA; Congo Belga, Elisabethville, leg. RICHARD; in Coll. STRANEO.

DEI: 4 Paratypen, Togo, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

breviuscula SAHLBERG, 1844 (*Feronia*)

(In Faun. Insect. Rossicam Symbola, 31)

Mehrere Syntypen, Ochotsk.

DEI: 1 Ex. Ochotsk, 1 Ex. ohne Fundort; Coll. KRAATZ, Syntypen.

breviusculus KRAATZ, 1876 (*Procerus*)

(Bull. Moscou 51, 132, 135–137, Taf. 1, Fig. 2, 3)

Mehrere Syntypen, Kleinasien, Brussa.

DEI: Syntypen: 1 Ex. Brussa, leg. KRAATZ; 1 Ex. Brussa, leg. FRIWALD; 5 Ex. ohne Fundort; Coll. KRAATZ.

Syn. zu *scabrosus* OLIVIER, 1795.***brucei*** ANDREWES, 1923 (*Amara*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 11, 276)

Mehrere Syntypen, Tibet, in der Nähe Base Camp, Upper Rombuk, 16.500 ft., V., leg. LONGSTAFF, Mount Everest Expedition.

DEI: 1 Syntypus, Tibet, Everest base camp, Bougbuk Glacier, 16.500 ft., 17.–20. V. 1922, leg. LONGSTAFF.

bruckii SCHAUM, 1859 (*Pterostichus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 3, 47)

Mehrere Syntypen, Serbien, leg. ZEBE.

DEI: 1 Ex. Serbia, 2 Ex. ohne Fundort; Coll. GERMAR-SCHAUM, Syntypen.

bucculentus KRAATZ, 1874 (*Harpalus*)

(I.c. 18, 299)

Mehrere Syntypen, bei Sarepta, leg. BECKER.

DEI: 2 Syntypen, Sarepta, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *servus* DUFTSCHMIDT, 1812.***bucharica*** TSCHITSCHERIN, 1898 (*Amara*)

(Horae Soc. Ent. Ross. 32, 211)

♀ Holotypus, Buchara occid., Karakum, Prov. Transcaspienne, leg. HAUSER, Coll. v. HEYDEN; im DEI.

bucharicus TSCHITSCHERIN, 1898 (*Harpalus*)

(L'Abeille 29, 94–95)

Mehrere Syntypen, Emirat de Buchara, durch STAUDINGER, in Coll. TSCHITSCHERIN.

DEI: 1 Syntypus, Buchara, Coll. KRAATZ.

bucolica KOLBE, 1894 (*Anthia*)

(Stett. Ent. Ztg. 55, 201)

Mehrere Syntypen, Central-Afrika, Bukoba, Westufer des Victoria-Njansa, 19. XI. 1890, leg. STUHLMANN.

DEI: 1 Syntypus, N. Victoria-Nyassa, Ussoga u. Uganda, V.–VIII. 1894, durch NEUMANN.

burgeoni STRANEO, 1941 (*Caelostomus*)

(Ann. Mus. Stor. nat. Genova 61, 9–10)

Holotypus, mehrere Paratypen, Is. Fernando Poo, Basilé, 400–600 m, leg. FEA; Camerun, Reg. Lolodorf, leg. VADON; Victoria, leg. FEA; Congo, Ogooué, Sam Kita; Lambaréne; leg. ELLENBERGER; im Museum Civio di Genova, in Coll. STRANEO und im Museum di Parigi.

DEI: 2 Paratypen, Kamerun, durch CONRADT, Coll. KRAATZ.

burešii KNIRSCH, 1923 (*Pheggomisetes*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 20, 1–5, Fig. 1)

Mehrere Syntypen, Bulgariae, in der Nähe Vratca, leg. BUREŠ.

DEI: 1 Syntypus, Levlenik b. Vratca, Balkan, Bulgarien, Coll. LEONHARD-Coll. KNIRSCH.

byzantinus APPFELBECK, 1901 (*Trechus*)

(Glasn. zem. muz. Sarajevo 13, 426)

Mehrere Syntypen, Bujuk-Dere (Zarigrad), leg. APPFELBECK.

DEI: 1 Syntypus, Constantinopel, Belgrader-Wald, durch v. BODEMEYER.

caligatus BATES, 1889 (*Brachinus*)

(Ann. Mus. Genova (27) 7 (2), 109—110)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamo, leg. FEA, in Coll. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamo, VIII. 1886, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *melancholicus* SCHMIDT-GOEBEL, 1846.

calva STERNBERG, 1907 (*Anthia*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 59)

7 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, Region des Tanganjika, ex Coll. OBERTHÜR, in Coll. STERNBERG und OBERTHÜR.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Region du Tanganyika, 1900—, leg. DEPAILLAT, Coll. KRAATZ.

camerunus breuningi BASILEWSKY, 1932 (*Heterotefflus*)

(Ent. Bl. 28, 24)

♀ Holotypus, Cameroun, Joko; im DEI.

caprai STRANEO, 1938 (*Caelostomus*)

(Ann. Mus. Stor. nat. Genova 60, 66—67)

Holotypus, mehrere Paratypen (ca. 100 Ex.), Java: Mons Gede, Pengalengang, leg. FRUHSTORFER; Tangkoeban Prahoe, leg. DRESCHER und JACOBSEN; Preanger, M. Boetangrang, G. Patoeha-Preanger, G. Oengaran, Zuid-Banjoemas, Koebang-kang Koeng, G. Slatam, Batoerraden; leg. DRESCHER; Toegoe, Gounod Gedeh, Radja Mendala; leg. LEDRU; G. Raoang, Bajoe Kidoe, leg. LUCHT; Teibodas, leg. BECCARI, etc.; in Coll. STRANEO, Coll. ANDREWES, Coll. DRESCHER, Coll. OBERTHÜR, im Museum Civ. Genova, Museum Amsterdam, Museum Buitenzorg und im Museum Paris.

DEI: 1 Paratypus, Java, Preanger, G. Tangkoeban Prahoe, 4000—5000 ft., XII. 1937, leg. DRESCHER.

castaniventris BATES, 1892 (*Colpodes*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 374)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Asciui Ghecu, alt. 1400—1500 m, leg. FEA.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, III.—IV. 1888, Coll. KRAATZ.

catenulatus rattii MANDL, 1966 (*Carabus*)

(Koleopter. Rundsch. 43/44 (1965), 48—49)

♂ Holotypus, Italien, Erber, Mte. Palanzone (Como), ca. 1000 m, 20. III. 1966; Paratypen: 1 ♀, dto., 20 Ex. Mte. Palanzone; leg. RATTI; 2 Ex. Lombardia, Canzo, Gajum, in der Nähe Mte. Palanzone, leg. BARI; in Coll. MANDL.

DEI: 2 Paratypen, Italia, Prealpi Lombarde, Mt. Palanzone (Co.), 800—1000 m, 11. V. 1966, leg. RATTI.

celebensis SCHAUFUSS, 1885 (*Misculus*)

(Horae Soc. Ent. Ross. 19, 184)

Mehrere Syntypen, Süd-Celebes, Macassar, leg. HOECK, im Museum LUDWIG SALVATOR, in Coll. SCHAUFUSS oder Coll. KLOCKE.

DEI: 1 Syntypus, Macassar, Coll. SCHAUFUSS.

Syn. zu *javanus* KLUG, 1834.

cephalonicus WINKLER, 1914 (*Trechus*)

(Koleopter. Rundsch. 3, 171)

Mehrere Syntypen, Cephalonia, Megalo Vuno, IV. 1905, ca. 1200 m, leg. LEONHARD, MOCZARSKI und WINKLER.

DEI: 1 Syntypus, Cephalonia, Gleutherios-Paß, 1905, leg. LEONHARD, Coll. LEONHARD.

ceylanensis STRANEO, 1938 (*Caelostomus*)

(Ann. Mus. Stor. nat. Genova 60, 28—29, Fig. 31)

Holotypus, mehrere Paratypen, Ceylon, Vavuniya, Anuradhapura, leg. HORN; Hiwaite; in Coll. ANDREWES, Coll. STRANEO, Coll. OBERTHÜR, im Museum Oxford und im DEI.

DEI: 1 Paratypus, Anuradhapura, 1899, leg. HORN, Coll. KRAATZ.

charis ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova 51, 407, 454—455)

Holotypus, Central Provinces, Nagpur, leg. D'ABREU; mehrere Paratypen: Ceylon, leg. NIETNER, HORN und HENRY; Bombay, Belgaum, leg. ANDREWES; Chota Nagpur, Konbir, leg. CARDON; Orissa, Kallikote, leg. ANNANDALE; Bengal, Galatea Expedition-Copenhagen Mus.; Madras, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES und MAINDRON, Vizagapatam, leg. PATUCK; Mysore, leg. ANDREWES und CAMPBELL.

DEI: 2 Paratypen, Ceylon, Anuradhapura, 1899, leg. HORN.

chinadensis JEDLIČKA, 1932 (*Harpalus*)

(Ent. Nachr.bl. 6, 69—70)

Holotypus, 89 Paratypen, China, Prov. Szetschuan, Tatsienlu, in Coll. JEDLIČKA, Coll. SCHAUBERGER und Coll. REITTER.

DEI: Paratypen: 4 Ex. China, Tatsienlu-Kiulung, leg. REITTER; 1 Ex. China merid. Tatsienlu, Prov. Szetschuan.

chinensis JEDLIČKA, 1932 (*Tachys*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 29, 81—82)

Holotypus, China, Prov. Schantung, Jentschoufu, im DEI; 3 Ex. dto.; 1 Ex. Tientsin; Paratypen.

DEI: Holotypus, 1 Ex. Jentschoufu, Schantung, 22. V. 1911—12, leg. KREYENBERG; 1 Ex. China, Tientsin, Ross commut.; Paratypen.

chinnada ANDREWES, 1921 (*Dioryche*)

(Rec. Ind. Mus. 22, 342–343)

Holotypus, Bombay, Belgaum, leg. ANDREWES, (?) Ex. Kanara, leg. BELL; 5 Ex. Madras, Bangalore, Malabar, Pondicherry, Bombay, Ceylon, Trincomali, leg. BAKER; im Britischen Museum; 1 Ex. Madras, Ganjam Dist., Chilka Lake, Barkuda, leg. ANNANDALE, 1 Ex., „at light“, U.P., Gorakhpur; 1 Ex. Bombay, Satara, Medha, 1 Ex. Ratnagiri, Pimpri, Rashtra Valley, leg. GRAVELY; in Ind. Museum; 2 Ex. Madras, leg. PATTON, im Bombay Nat. Hist. Soc.; 1 Ex. Bengal, Pusa, 2 Ex. Bombay, Belgaum, 1 Ex. C.P., Bilaspur, Janjir, 1 Ex. Madras, Coimbatore; im Agric. Res. Inst. Pusa; 1 Ex. Madras, Coimbatore, im Agric. Coll. Res. Inst. Coimbatore; mehrere Ex. C.P., Nagpur, Raipur Dist., Tumgaon, leg. D'ABREV., im Centr. Mus. Nagpur; 1 Ex. Mysore State, leg. CAMBELL, 3 Ex. BUTLER coll. PONDICHERRY; im Oxford University Museum (Hope Dept.); Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, C.P. India, Tumgaon, Raipur Distr., 21. II. 1917, leg. D'ABREV., Central Mus. Nagpur, C.P.

chitra ANDREWES, 1923 (*Dolichoctis*)

(Spol. Zeyl. 12, 246–247)

Ceylon, leg. GREEN, in Coll. ANDREWES (Holotypus), Nalanda, Negombo und Kandy, leg. HORN, im DEI, Ceylon, leg. NIETNER, im Museum Stettin; mehrere Paratypen.
DEI: 2 Paratypen, Ceylon, Kandy, Negombo, 1899, leg. HORN.

circassicus GANGLBAUER, 1886 (*Tribax*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 30, 334, 336)

6 ♂♂, 9 ♀♀, Syntypen, west. Kaukasus, Atchischcho, Pseaschha, leg. STARCK.
DEI: 2 Syntypen, Caucasus, durch GANGLBAUER, Nr. 344, Coll. KOLTZE.

circumtinctus BATES, 1892 (*Brachinus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 396)

Mehrere Syntypen, Burma, Sennigion, leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Sennigion, 28. II. 1886, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

clandestinum STURM, 1824 (*Agonum*)

(Deutschl. Fauna, Insekta. 5, 212, Taf. 137, Fig. c, C)

Mehrere Syntypen, Oesterreich, leg. MEGERLE VON MUHLENFELD.
DEI: 1 Syntypus, Oesterreich, Coll. GERMAR-SCHAUM.
Syn. zu *mulleri* HERBST, 1785.

clarum ANDREWES, 1923 (*Bembidium*)

(Ent. Monthly Mag. 59, 98–99)

Holotypus, Sikkim, Gopaldhara, mehrere Ex. dto. und Gielle Khola in der Tista Valley; leg. STEVENS, in Coll. ANDREWES; mehrere Ex.: Assam, Yambung und Janakhmukh, Bank von Dihong River, leg. KEMP, Abor Expedition, im Indischen Museum; Kumaon, W. Almora, Chakrata, Khaula, Ranikhet, Tanakpur, Nainital, Upper Gumti Valley, River Sarda Gorge; Garhwal, Siuni Gad; leg. CHAMPION; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Br. Sikkim, Gopaldhara, leg. STEVENS.

coelestis BALIANI, 1932 (*Amara*)

(Mem. Soc. Ent. Ital. 11, 16, Taf. 2, Fig. 12)

11 ♂♂, 15 ♀♀, Syntypen, China centrale, Tatsienlu-Chiulung, prov. di Szechuan, durch REITTER.
DEI: 1 Syntypus, China, Tatsienlu Kiulung, durch REITTER.

coelestis buchi HAUSER, 1913 (*Coptolabrus*)

(Stett. Ent. Ztg. 74, 304–306)

Mehrere Syntypen, Prov. Tschekiang, ad urb. Wenchow und Haimen.
DEI: 1 Syntypus, Tschekiang, Wentschan.

coeruleiceps BATES, 1892 (*Chlaenius*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 320–321)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Cheba, alt. 900–1100 m, leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Cheba, 900–1100 m, V. XII. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *prudicus* FABRICIUS, 1801.

coeruleipennis HAUSER, 1913 (*Coptolabrus*)

(Stett. Ent. Ztg. 74, 304)

Mehrere Syntypen, Yuyao.
DEI: 1 Syntypus, Chekiang, Yuyao.
Syn. zu *lafossei* FEISTHAMEL, 1845.

colchicum CHAUDOIR, 1850 (*Bembidium*)

(Bull. Soc. Nat. Moscou 23, 175–176)

Mehrere Syntypen, Armenien, am Ufer des Rion, in Mingrélie und bei Koutais in Imérétie, leg. CHAUDOIR.
DEI: 1 Syntypus, Armenien, Coll. SCHAUM.

compactum ANDREWES, 1922 (*Bembidium*)

(Ent. Monthly Mag. 58, 240–241)

Holotypus, mehrere Paratypen, United Provinces, Kumaon, West Almora, Ranikhet, Bhatkot, Swal R. basin, R. Sarda gorge, leg. CHAMPION, Dehra Dun, leg. CAMERON, im For. Res. Inst. und Britischen Museum.
DEI: 1 Paratypus, W. Almora, Kumaon, leg. CHAMPION.

***concinna* ZIMMERMANN, 1832 (*Amara*)**

(Faunus, Gistl, 1, 32)

Mehrere Syntypen, Deutschland.

Neotypenfestlegung durch FASSATI, 1858; Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 32, 519—532 (aller Wahrscheinlichkeit nach existiert die *Amara*-Sammlung ZIMMERMANNS nicht mehr).

DEI: ♀ Neotypus, Freienwalde, Coll. KRAATZ; 1 ♂, Küstrin, STIERLIN, 1 ♂, Saxonia, leg. WEHNCKE; Coll. HEYDEN; 1 ♀, Coll. STIERLIN; 1 ♀, Hyères, Coll. GERMAR-SCHAUM; 2 Ex. Le Plansag (?), Coll. LEONHARD; 1 ♀, Zürich, Coll. LETZNER; 1 ♂, Zaleszany, K. Sandomierza, 9. III. 1891, leg. und Coll. STOBIERICKI, teste MAKOLSKII und FASSATTI, ex Coll. Zool. Mus. Warszawa, 57, Coll. FASSATI, Nr. 824; 1 Ex. Coll. GERMAR-SCHAUM, 1 Ex. St. Quentin, leg. SCHULZ, Coll. KÜNNEMANN (in der Beschreibung nicht erwähnt!); Neoparatypen.

Syn. zu *lepidia* ZIMMERMANN, I. c. (?).***congoensis* BURGEON, 1928 (*Graphipterus*)**

(Ann. Soc. Ent. Belg. 68, 114)

Mehrere Syntypen; Katanga, Dilolo, 14. X. 1920, leg. OVERLAET; Kasai, Luluabourg, Hemptinne Saint-Benoit, leg. CALLEWAERT und HAAS, im Musée du Congo und Bruxelles.

DEI: 1 Syntypus, Katanga, Tschibobe, 25. IX. 1921, leg. OVERLAET.

[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Dilolo“ steht auf dem Etikett „Tschibobe“.]

***constricticollis* KRAATZ, 1886 (*Coptolabrus*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr. 30, 241—242, Fig. 1, 3)

3 Syntypen, Suyfun (Amur), leg. DREHERS, via STAUDINGER an KRAATZ, in Coll. KRAATZ.

DEI: 2 Syntypen, Suyfun, Coll. KRAATZ.

***constrictus* SCHAUM, 1860 (*Trechus*)**

(Nat. Ins. Deutschl. Col. 1, 1 (1856—60), 651)

Mehrere Syntypen, in den Alpen von Steiermark, leg. MILLER, in Kärnthen, leg. KAHR.

DEI: 1 Syntypus, Styria, Coll. SCHAUM.

***constrictus franzii* SCHWEIGER, 1950 (*Trechus*)**

(Proc. 8th int. Congr. Ent. Stockholm (1948), 492—493, Fig. 3, 4)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Tappenkär, westliche Radstätter Tauern, leg. LEDER, in Coll. SCHWEIGER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***convexus bucciarelli* MANDL, 1966 (*Carabus*)**

(Koleopter. Rundsch. 43/44, 30—31)

♂ Holotypus, Monte San Giorgio, 29. XI. 1964, Ligurischer Appennin (nördlich von Savona), leg. BUCCIARELLI; 1 ♀, dto.; mehrere Ex. vom Monte San Giorgio; in Coll. MANDL, Coll. BUCCIARELLI und Coll. RAVIZZA: Paratypen.

DEI: 1 Ex. APP. Ligurg, Montenatico (SV), m 450/600, 677-XII. 1964 (nicht lesbar!); 1 Ex. APP. Lig./Emiliano, Pey (Pe) Mte Lesima, 29. IV. 1962, m 1400; leg. RAVIZZA: Paratypen.

***corax* REITTER, 1889 (*Pterostichus*)**(Dtsch. Ent. Ztschr. 33, 52—54; nom. praeocc. = *epiroticus* CSEKI, 1930, Coleopt. Cat., 694)

Mehrere Syntypen, Griechenland, Koraxgebirge, westlich vom Parnass, 1887, leg. v. OERTZEN.

DEI: 1 Syntypus, Griechenland, Korax Geb., leg. v. OERTZEN, Coll. KRAATZ.

***cordatus* LETZNER, 1841 (*Pterostichus*)**

(Übers. Arb. Veränder. schles. Ges., 101)

4 Syntypen, Schlesien, Altvater, 4200 ft. über der Ostsee, E. VII. 1840, leg. LETZNER.

DEI: 4 Syntypen, Altvater, leg. LETZNER (4 weitere Ex. vom gleichen Fundort aus der Coll. LETZNER werden nicht in der Beschreibung genannt).

***cordicollis* SLOANE, 1907 (*Promecoderus*)**

(In LEA, Proc. Roy. Soc. Victoria 20, 147—148)

Mehrere Syntypen, nordwestl. Tasmanien, King Island.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. HACKER,

***cordipenne* SLOANE, 1897 (*Carenum*)**

(Proc. Linn. Soc. N.S. Wales 22, 196—197)

♂ Holotypus, 5 ♂♂, Paratypen, Victoria, North-western District, via FRENCH an SLOANE.

DEI: 1 ♂, Paratypus, St Mallie (nicht lesbar!), V. (C.F.Jr.), Coll. v. BENNIGSEN.

***corinna* HOLDHAUS, 1924 (*Reicheia*)**

(L'Abeille 32, 171, 183—184)

Mehrere Syntypen; Umgeb. von Rom: Berg Albani, nahe Lago Albano, Exkursion von LUIGIONI und RAFFRAY; Subiaco leg. RAFFRAY; Marino, leg. MÜNSTER; Oriolo Romano, Lago di Nemi, leg. LUIGIONI.

DEI: 3 Syntypen, Roma, 1899, leg. MÜNSTER, Coll. LEONHARD.

***corpulentus* SCHAUM, 1864 (*Zabrus*)**

(Berl. Ent. Ztschr. 8, 182—183)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Vorderasien, Syrien oder Rhodus, leg. KINDERMANN, via LEDERER an SCHAUM.

DEI: 1 Syntypus, Orient, Coll. SCHAUM.

***costaricensis* LIEBKE, 1930 (*Calophaena*)**

(Mitt. Zool. Mus. Berlin 15, 677, 715, Fig. 54)

40 Syntypen, Costa Rica, Farm „Hamburg“, Reventazon, 15. III., 10. IX. 1923/1. X., 7. XI. 1924/5. XI., 3. XII. 1925/3. VI. 1926, leg. NEVERMANN, in Coll. NEVERMANN.

DEI: 1 Syntypus, Costa Rica, Hamburgfarm, Reventazon, Ebene Limon, 6. XI. 1925, leg. NEVERMANN.

crassipes SLOANE, 1904 (*Morio*)

(Proc. Linn. Soc. N.S. Wales 29, 533—534)

Mehrere Syntypen, Australien, Cairns District, Kuranda, leg. DODD, in Coll. SLOANE.

DEI: 1 Syntypus, Kuranda, durch HACKER.

cribriventris SCHAUBERGER, 1938 (*Lamproj. hirsutus*)

(Arb. morph. tax. Ent. 5, 41—42)

Holotypus, Paratypen (3 ♂♂, 2 ♀♀), Annam, Phuc-Son, leg. FRUHSTORFER, in Coll. ANDREWES, Coll. SCHAUBERGER und im DEI.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Annam, Phuc-Son, XI. XII., leg. FRUHSTORFER, Coll. KRAATZ.

crotalicus KRAATZ, 1875 (*Mclops*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 19, 371—372)

Mehrere Syntypen, Croatia, leg. HAMPE.

Lectotypenfestlegung durch MLYNAŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).

DEI: Lectotypus, Croatia, leg. HAMPE, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *simplex* CHAUDOIR, 1868.***cubanus*** BÄNNINGER, 1937 (*Taeniolabus*)

(Ent. Bl. 33, 321—322)

Mehrere Syntypen, Cuba, Buenos Aires, Trinidad Mts., 2500—3500 Fuß, leg. DARLINGTON, im Museum of Comparative Zoology, Cambridge, Mass., U.S.A.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 8.—14. V. 1936.

cupricollis KRAATZ, 1886 (*Eutelccarabus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 30, 263)

Mehrere Syntypen, Suufun-Mündung, leg. DÖRRIES, Amur, leg. CHRISTOPH; via STAUDINGER an KRAATZ.

DEI: 1 Ex. Askold, durch KRAATZ, Nr. 572; 1 Ex. Ussuri, leg. DÖRRIES; Coll. KOLTZE; 1 Ex. Suufun, Coll. KRAATZ, Nr. 174; Syntypen.

Syn. zu *büllbergi* MANNERHEIM, 1827.***curvatus*** SAHLBERG, 1880 (*Trechus*)

(Svenska Akad. Handl. (2) 17, nr. 4, 20)

Mehrere Syntypen, nordwest. Sibirien, im bergigen und waldigen Gebiet des Jenisseensi, von Krasnojarsk bis Fatjanovsk, Exped. 1876—1877, im Museum Holm., Museum Helsingf., in Coll. HAGL. und Coll. SAHLBERG.

DEI: 1 Syntypus, Jeniseisk, leg. SAHLBERG, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *montanus* MOTSCHOLSKÝ, 1844.***cyanellus*** KRAATZ, 1874 (*Harpalus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 18, 300)

Mehrere Syntypen, Sarepta und Astrachan, leg. BECKER.

DEI: 2 Ex. Sarepta, 1 Ex. ohne Fundort; Coll. KRAATZ.

Syn. zu *fuscicornis* MÉNÉTRIÉS, 1832.***cyanellus*** BATES, 1889 (*Stenolophus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 7 (27), 103—104)

Mehrere Syntypen, Burma, Teinjò, Bhamò, Mandalay, Rangoon, leg. FEA, in Coll. FEA.

DEI: 2 Syntypen, Birmania, Teinjò, V. 1886, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *smaragdulus* FABRICIUS, 1798.***dalmatinum levantinum*** VŠETEČKA, 1941 (*Bembidium*)

(Sborn. ent. odd. Zemsk. Praze 19, 89—90)

Mehrere Syntypen, Syrien, Damaskus, Libanon, Chtaura, Hamana und Palästina, Haifa.

DEI: 1 Syntypus, Syrien, Chtaura, Coll. KULT.

damascenus REICHE & SAULCY, 1855 (*Zabrus*)

(Ann. Soc. Ent. France (3) 3, 624—625)

♂ Holotypus, Umgebung von Damas in Syrie, X.—III. 1851, leg. SAULCY; im DEI [Syria, Coll. SCHAUM].

debilicostis STERNBERG, 1910 (*Tefflus*)

(Stett. Ent. Ztg. 71, 114—117)

Mehrere Syntypen, Ht. Congo, Leopoldville (Unterer Congo), Kisantu (Congo), Manghai (Kassai), Beni Bendi (Sankurru), Luluá, Lubuáberg, Kassai, Kuango, Malange, Mukenge.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Kassai-Fluss.

debilis BATES, 1892 (*Clivina*)(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 278; nom. praeocc. = *invalida* ANDREWES, 1919, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 3, 470)

Mehrere Syntypen, Birmania, Rangoon, leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Birmania, Rangoon, 1886, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

deceptor DARLINGTON, 1934 (*Pseudaptinus*)

(Psyche 41, 128, Taf. 5, Fig. 12)

Holotypus, no. 19545, 55 Paratypen, Cuba, Soledad, nahe Cienfuegos, VI., 21. X.—7. XI., im Museum of Comparative Zoölogy.

DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, 21. X. 1926, leg. DARLINGTON.

declivis LIEBKE, 1934 (*Lebia*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 1, 277—278)

4 Syntypen, Peru, Callanga, Coll. KRAATZ, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.***delectum*** LIEBKE, 1933 (*Zuphium*)

(Rev. Ent. Rio do Janeiro 3, 469—470)

2 Syntypen, U.S.A., Massachusetts, Framingham, XII. 1911, leg. FROST, im DEI und in Coll. LIEBKE.
DEI: 1 Syntypus, Framingham (Mass.), 13. XII. 1911—12, leg. FROST.***demensus*** ANDREWES, 1923 (*Microlestes*)

(Spol. Zeyl. 12, 248—249)

Mehrere Exemplare, Ceylon: Kanthalay, Trincomalee und Anuradhapura, leg. HORN, im DEI; Holotypus, in Coll. ANDREWES und Paratypen, im DEI.
DEI: Ceylon, 1899, leg. HORN: 3 Ex. Anuradhapura, 2 Ex. Kanthalay: Paratypen.***dentatus*** ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova 51, 343—344, Taf. 3, Fig. 1)

Mehrere Syntypen: 3 Ex. Malay States, Singapore, leg. SAUNDERS, in Coll. SAUNDERS; 1 Ex. Siam, Renong, leg. DOHERTY, im Britischen Museum; 1 Ex. Cambodia, Kompong Gedey, leg. VITALIS DE SALVADA; 1 Ex. Cambodia, im Museum Brüssel; 1 Ex. Cochin-China, Long Xuyen, leg. DORR, in Coll. FLEUTIAUX; 1 Ex. Java, Batavia, leg. GRABOWSKY, in Coll. SLOANE, 1 Ex. Soekaboemi, leg. WALSH, im Britischen Museum, 1 Ex. Princes Island, leg. DAMMERMANN, im Museum Buitenzorg, 1 Ex. Java, leg. KOLLER, im Museum Brüssel; ? Ex. Sumatra, Medan, leg. CORPORAAL.
DEI: 1 Syntypus, Prinsen Eil., 21. I. 1922, leg. DAMMERMANN, ex Mus. Buitenzorg.***depressus*** MEIXNER, 1922 (*Trechus*)(Koleopter. Rundsch. 10, 30, Fig.; nom. praeocc. = *meixneri* JEANNEL, 1924, Cat. Col. reg. palaeoarct. 1, 100)

♂ Holotypus, Bosnien, Bosna-Tal, VIII. 1900, ex Coll. LEONHARD; im DEI.

deubeli REITTER, 1896 (*Carabus*)

(Wiener Ent. Ztg. 15, 225)

Mehrere Syntypen, Transsylvanische Alpen, leg. DEUBEL.

DEI: 1 Syntypus, Transsylv. Alpen, m. 1896, Coll. REITTER, 5. IX. 1906, Coll. ROESCHKE.

diaphanus ROTTENBERG, 1874 (*Trechus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 18, 328—329)

Mehrere Syntypen, Taygetos, leg. RAYMOND.

DEI: 1 Syntypus, Taygetos, leg. RAYMOND, Coll. LETZNER-ROTTENBERG.

dichroma ANDREWES, 1923 (*Lebia*)

(Spol. Zeyl. 12, 249—250)

Ceylon: Hambegamuwa, im Colombo Museum, Anuradhapura, leg. HORN, im DEI; Madras, Nilgiri Hills, leg. HAMPSON, im Britischen Museum; Haidarabad, Sikandarabad, leg. BUTLER, in Coll. BUTLER; Bombay, Khandesh, leg. BELL, in Coll. ANDREWES (Holotypus), Stadt Bombay, leg. KINNEAR, im Bomb. Nat. Hist. Soc.; Bengal, Chapra, leg. MACKENZIE, im Agric. Res. Inst., Pusa; mehrere Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Ceylon, Anuradhapura, 1899, leg. HORN.***diegana*** ALLUAUD, 1897 (*Lebia*)

(Ann. Soc. Ent. France 66, 169)

Mehrere Syntypen, Madagascar, Diego-Suarez, XI. en Juni 1893 montagne d'Ambre, 1.000 m, d'altitude.

DEI: 1 Syntypus, Madagascar, Diego-Suarez, 1893, leg. ALLUAUD.

diffinis pseudoquadricollis SCHAUERGER, 1932 (*Harpalus*)

(Koleopter. Rundsch. 18, 62—63)

♂ Holotypus, Sardinien, mehrere Paratypen, Korsika, Sizilien, Balearen und im westlichen Nordafrika.

DEI: 2 Paratypen, Maroc, Casablanca, durch ANTOINE.

dilatatus ROTTENBERG, 1870 (*Tachys*)

(Berl. Ent. Ztschr. 14, 18)

Mehrere Syntypen, Sizilien, bei Palermo, am Oretto, 7. XII.—20. II. 1868, leg. v. ROTTENBERG.

DEI: 3 Syntypen, Sizilien, Palermo, Coll. LETZNER-V. ROTTENBERG.

Syn. zu *algiricus* LUCAS, 1846.***diligens*** STURM, 1824 (*Platysma*)

(Deutschl. Faune, Insekt. 5, 81—83, Taf. 117, Fig. a, A)

Mehrere Syntypen, in Mauer bei Wien, leg. MEGERLE VON MÜHLFELD.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort.***dilutus*** DANIEL, 1902 (*Trechus*)(Münch. Koleopt. Ztschr. 1, 63; nom. praeocc. = *validipes* DANIEL, 1902—1903 (1902), Münch. Kol. Ztschr. 1, 62)Mehrere Syntypen, Herzegovina, Cvrsnica, 18. VIII. 1901, durch LEONHARD.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.***distigma*** LIEBKE, 1934 (*Lebia*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 1, 278, Fig. 1)

2 Syntypen, Peru, Callanga, Coll. KRAATZ, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

distinctum BÄNNINGER, 1918 (*Omophron*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 108)

Syntypen: 2 ♂♂, Kondué, 1904, leg. LUJA, 1 ♀, „Haut Soudan, Oswald“; im DEI.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Belg. Congo, Kondué, 1904, leg. LUJA.

diversus PÉRINGUEY, 1898 (*Abacetus*)

(Trans. South Afr. Phil. Soc. 10, 360–361)

Mehrere Syntypen, Salisbury, Zambezia.

DEI: 1 Syntypus, S. Rhodesia, leg. BODONG.

dives guadarramensis WAGNER, 1932 (*Chlaenius*)

(Coleopter. Centralbl. 6, 9)

Spanien, Südhang der Sierra Guadarrama, bei El Escorial, Puerto Navacerrada, Madrid; Sierra de Gredos, Coll. LAUFFER; Holotypus und mehrere Paratypen, im Museum Berlin, im DEI und in Coll. WAGNER.

DEI: 9 Ex. Escorial, leg. v. HEYDEN, Coll. STERN und Coll. v. HEYDEN; 2 Ex. Gallia mer., Coll. KRAATZ und Coll. LETZNER; 1 Ex. Gudalusia, Coll. LEONHARD; 4 Ex. Hispania, Coll. KRAATZ, Coll. ROLPH und Coll. v. ROTTENBERG; 1 Ex. Madrid, Coll. V. ROTTENBERG; 1 Ex. Denálar, leg. v. HEYDEN; Paratypen.

dochit APFELBECK, 1906 (*Pterostichus*)

(Sitz. Akad. Wiss. Wien, 115, 1663)

Mehrere Syntypen, Albanien, Gebirge der Merdita, Mal Shéit, 1905, leg. APFELBECK und LATIF.

DEI: 1 Syntypus (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).

doderoi HOLDHAUS, 1924 (*Reicheia*)

(L'Abeille 32, 172, 209–210)

12 Syntypen, Umgebung Dorgali in Sardinien, leg. DODERO.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, V. 1910, Coll. LEONHARD.

dohrni KRAATZ, 1887 (*Coptolabrus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 31, 148)

Mehrere Syntypen, Amur.

DEI: 1 Syntypus, Amur, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *smaragdinus* FISCHER v. WALDHEIM, 1824.*eccoptopterus* KRAATZ, 1894 (*Apotomopterus*)

(I.c. 138–139, Taf. 1, Fig. 17–18)

Mehrere Syntypen, Central-China, Omei-Shan.

DEI: 2 Syntypen, Omei-Shan, Coll. KRAATZ.

edwardsii BATES, 1872 (*Amarotypus*)

(Ent. Monthly Mag. 9, 51)

3 Syntypen, New Zealand, leg. EDWARDS.

DEI: 2 Syntypen, New Zealand, ex Museo, BATES, 1892.

eichhoffi KRAATZ, 1888 (*Pseudolimnaeum*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 32, 365)

2 Syntypen, Lothringen, leg. EICHHOFF, ex. Coll. SCHILSKY und Coll. FISCHER, in Coll. KRAATZ.

DEI: 2 Syntypen, Lothringen, 1888, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *inustum* JACQUELIN, 1857.*elatus plitvicensis* HEYDEN, 1880 (*Pterostichus*)

(Verh. zool.-bot. Ges. Wien 29 (1879), 37)

Mehrere Syntypen, Ljescovac am See Plivica Croatiae, an der Grenze Bosniae, leg. v. HEYDEN, HOPFGARTEN und REITTER.

Lectotypenfestlegung durch MLYNAŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 30, veröffentlicht werden).

DEI: 3 Lectotypus, Ljescovac, 1 Paralectotypus, Original; Coll. v. HEYDEN.

elegans ANDREWES, 1929 (*Colpodes*)

(Ann. Mus. Genova 53, 437–438)

9 Syntypen, Sumatra: 3 Ex. Mount Singalang, VII. 1878, leg. BECCARI; 6 Ex. Si-Rambé, XII. 1890–III. 1891, leg. MODIGLIANI; im Museum Genova und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Si-Rambé, XII. 1890–III. 1891, leg. MODIGLIANI, Coll. KRAATZ.

elegans SLOANE, 1907 (*Dendrocellus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 473)

2 Syntypen, New Guinea, Baining Berge, Gazelle Peninsula, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN.

DEI: 1 Syntypus, Baining Berge, Coll. v. BENNIGSEN.

ellipticus BURGEON, 1928 (*Graphipterus*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 68, 115–116)

Mehrere Syntypen; Katanga, Tschilbobe, 25. XI. 1921, leg. OVERLAET, Sankisia und Tekanini, 6. X., 16. XI. 1911, leg. BEQUAERT, Kundelung, leg. Mme. TINANT; im Museum Tervuren.

DEI: 1 Syntypus, Katanga, Tschilbobe, 25. IX. 1921, leg. OVERLAET, Musée du Congo.

elongata DUPUIS, 1913 (*Hexagonia*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 57, 263–269)

Holotypus, Formosa, Suisharyo, leg. SAUTER; im DEI [X. 1911].

emmerichi BALIANI, 1932 (*Amara*)

(Mem. Soc. Ent. Ital. 11, 14–15, Taf. 2, Fig. 10)

18 ♂♂, 16 ♀♀, Syntypen, China centrale, Tatsienlu-Chiulung, Prov. di Szechuan, durch REITTER.
DEI: 2 Syntypen, China, Tatsienlu-Kiulung, durch REITTER.**emmerichi** JEDLIČKA, 1932 (*Colpodes*)

(Ent. Nachrichtenbl. 6, 108)

Holotypus, 8 Paratypen, China, Prov. Szetschuan-Tatsienlu, in Coll. JEDLIČKA und Coll. REITTER.
DEI: 2 Paratypen, China, Tatsienlu-Kiulung, Coll. REITTER.**eous** TSCHITSCHERIN, 1902 (*Harpalus*)

(Horae Soc. Ent. Ross. 35, 236)

Mehrere Syntypen, Mantschurie, Japon.
DEI: 1 Syntypus, Japon, Coll. KRAATZ.**ericae** WOLLASTON, 1854 (*Olisthopus*)

(Insect. Maderensia, 37, Tab. 1, Fig. 8)

Mehrere Syntypen, Madeira, Region Fanalensi bei Cruzinhas, unter der Rinde von *Erica scoparia* L. und *E. arborea* L., 4000'–5000' s.m., VII. 1850, leg. WOLLASTON.
DEI: 4 Syntypen, Madeira, Coll. KRAATZ.**erosus karascharensis** EIDAM, 1931 (*Zoocarabus*)

(Wien. Ent. Ztg. 48, 80)

4 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, China septentr.-occid., Kurla, Bagratsch-Kul, Karaschar, V. 1902, Coll. HAUSER-LEONHARD, im DEI.
DEI: 4 Syntypen, Ost-Turkestan, Bagratsch-Kul, Hurla, V. 1902, Coll. HAUSER—Coll. LEONHARD.**esau** HEYDEN, 1885 (*Sabenus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 29, 285)

♀ Holotypus, Turkestan, Namagan, durch STAUDINGER, in Coll. v. HEYDEN; im DEI.

eucharis BATES, 1892 (*Pristomachaerus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 305–306)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamo, Karin Cheba, alt. 900–1100 m, Palon, Pegu; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Palon, Pegu, VIII. IX. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.**eucnemis** BATES, 1892 (*Colpodes*)

(l.c., 376)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Cheba, alt. 900–1100 m, leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 5. XII. 1888, Coll. KRAATZ.

eulamprus BATES, 1892 (*Hypolithus*)

(l.c., 340)

Syntypen: 2 Ex. Palon, Pegu, 1 Ex. Kawkareet, Tenasserim; leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Palon, Pegu, VIII. IX. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

eutherum ANDREWES, 1923 (*Bembidium*)

(Ent. Monthly Mag. 59, 96)

Holotypus, Eastern Duars, leg. STEVENS, in Coll. ANDREWES; mehrere Paratypen: Sikkim, Tista Valley, Gielle Khola, 600 ft., leg. STEVENS; Assam, Pasighat und Kobo, Bank von Dihong River, leg. KEMP, Abor Expedition, im Indischen Museum; Punjab: Simla Hills States, Matiana, leg. KEMP, im Indischen Museum; Kumaon, Nainital, Jalabani, im Indischen Museum; West Almora, River Sarda Gorge, Tanakpur, Ranikhet, leg. CHAMPION; Dehra Dun, Mussoorie, Mossy Falls, Kempti Falls, leg. CAMERON, im Forest Res. Inst.
DEI: 1 Paratypus, Kobo, 400'.**exaratus** BATES, 1892 (*Gnathaphanus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 329)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Cheba, alt. 900–1100 m, leg. FEA.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, V. XII. 1888.

exiguus ANDREWES, 1933 (*Ocdes*)

(Ent. Monthly Mag. 69, 56–57)

Holotypus, 1 Paratypus (♂, ♀), Sumatra, im DEI und in Coll. ANDREWES.

DEI: Holotypus, Sumatra, Coll. KRAATZ.

exitis SCHAUM, 1857 (*Blechrus*)(Ber. Ent. Ztschr. 1, 132; nom. praeocc. = *apterus* HOLDHAUS, 1904, in APFELB. Käferf. Balk. 1, 330)

5 Syntypen, Griechenland, Zante, leg. v. KIESENWETTER.

DEI: 1 Syntypus, Zante.

extensus HEYDEN, 1884 (*Antisphodrus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 28, 1, 220–221)

♂ Holotypus, Turkestan, Osch, Coll. KRAATZ, im DEI.

fabulosa LIEBKE, 1939 (*Calleida*)
(Festschr. STRAND 5, 100)

1 Ex. Brasilien, Rio de Janeiro, Petropolis, XII. 1926, leg. OHAUS, in Coll. LIEBKE, 3 Ex. Sta. Catharina, Nova Teutonia, 27 Grad 11 Min. südl. Breite, 52 Grad 23 Min. westl. Länge, leg. PLAUMANN, in Coll. LIEBKE und Coll. PLAUMANN; 1 Ex. Paraguay, Hohenau, leg. JAKOB, im DEI: Syntypen.
DEI: 1 Syntypus, Paraguay, Hohenau, 3. IX. 1935, leg. JACOB, Nr. 1752.

fasciatus MOTSCHULSKY, 1851 (*Trechus*)
(Bull. Soc. Nat. Moscou 24, 4, 506)

Mehrere Syntypen, Ind. or.
DEI: 1 Syntypus, Ind. or. (Mndrstrn.)

fassatii KULT, 1947 (*Clivina*)
(Cas. Čsl. Spol. Ent. 44, 35–37)

Holotypus. Paratypen (ca. 50 Ex.), Brasilia, Corumba, Matto Grosso, in Coll. KULT, Coll. BÄNNINGER, im Museum Brüssel, Museum Prag, DEI, etc.; 4 Ex. Brasilia, Santos, leg. METZ, Coll. KRAATZ, im DEI; 1 Ex. Argentina, Missiones, S. Anna, in Coll. KULT; 2 Ex. Paraguay, leg. FIEBRIG, im DEI.
DEI: 2 Ex. Paraguay, leg. FIEBRIG, 1 Ex. Corumba, Matto Grosso, 4 Ex. Santos, leg. METZ, Coll. KRAATZ; Paratypen.

feae BATES, 1889 (*Epicosmus*)
(Ann. Mus. Genova (2) 7 (27), 101)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamò, Teinzò, Thigyam, Prome, leg. FEA, in Coll. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Bhamò, Birmania, VII.–VIII. 1885, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

feae BATES, 1892 (*Nanochlaenius*)
(I.c. (2) 12 (32), 322)

Mehrere Syntypen, Burma, Rangoon, Kathà, Palon, Pegu; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Palon, Pegu, VIII. IX. 1887, Coll. KRAATZ.

feae BATES, 1889 (*Pirantillus*)
(Ann. Mus. Genova (2) 7 (27), 109)

Mehrere ♀, Syntypen, Burma, Tenasserim, Meetan, leg. FEA, in Coll. FEA.
DEI: 1 ♀, Syntypus, Tenasserim, Meetan, IV. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

ferdinandikoburgi BREIT, 1912 (*Trechus*)
(Ent. Mitt. 1, 199)

Mehrere Syntypen, Rhodopegebirge, Xuchia Tschan, Schendemo, Schmerdele, leg. HILF, in Coll. LEONHARD und Coll. BREIT.
DEI: Syntypen, Rhodopegebirge, leg. HILF, Coll. LEONHARD: 2 Ex. Xuchia Tschan, 2 Ex. Schmerdele, 10. VIII. 1911, 1 Ex. Schendemo, 20. VIII.

ferrugatus REITTER, 1902 (*Ophonus*)
(Wien. Ent. Ztg. 21, 191–192)

Mehrere Syntypen, Alger, Bou-Berak, bei Dellys.
DEI: 1 Syntypus, Algeria, Bou-Berak, leg. REITTER, Coll. KRAATZ.

fissuralis REITTER, 1900 (*Blechrus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 376)

Mehrere Syntypen, Griechenland, Syrien, Kaukasus, Transcaspien.
DEI: 1 Syntypus, Attica, Coll. KRAATZ.

flavipes MOTSCHULSKY, 1858 (*Hispalis*)
(Etudes Ent. 7, 24)

Mehrere Syntypen, Ostindien.
DEI: 1 Syntypus, India orient., Mariderstjerna (Ex. beschädigt).

fokiensis SCHAUBERGER, 1930 (*Harpalus*)
(Coleopt. Centr.bl. 4, 175–177, 195)

Holotypus und mehrere Paratypen, südwest- und südliche Provinzen Chinas: Fokien, wahrscheinlich Futschou, ex Museum Hamburg; Szetschuan, Kwanhien, Mts. Yunling, ex Coll. HAUSER; Yunnan, Gebirge bei Mengtze, ex Coll. HAUSER.
DEI: 1 Paratypus, Szechuan, Giufu Shan, 1500–2000 m, leg. REITTER.

formosana DUPUIS, 1912 (*Diorycha*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 56, 324–328)

2 Syntypen, Formosa, Anping, leg. SAUTER; im DEI [11.V.].
Syn. zu *flavilabris* FABRICIUS, 1798.

formosana DUPUIS, 1912 (*Coptocdera*)
(I.c., 328–334)

16 Syntypen, Formosa, Hoozan, leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Hoozan, IX. 1910, leg. SAUTER.
Syn. zu *japonica* BATES, 1883.

formosana DUPUIS, 1912 (*Pentagonica*)
(I.c., 316–319)

Holotypus, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER; im DEI [VIII. 1909].

formosanus DUPUIS, 1912 (*Cillenus*)
(I.c., 384—388)

Holotypus, Formosa, Anping, leg. SAUTER; im DEI [22. VII. 1911].

formosanus DUPUIS, 1912 (*Mastax*)
(I. c., 282—285)

5 Syntypen, Formosa, Anping, leg. SAUTER.

DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, VI. 1911.

formosanus DUPUIS, 1913 (*Pericallus*)
(I. c., 57, 83—87)

Mehrere Syntypen, Formosa, Hoozan, 7. VI. 1911, Sokutsu, 1912, leg. SAUTER.

DEI: 1 Ex. Formosa, Chip Chip, 1907—1909, 4 Ex. Hoozan, IX. 1910; leg. SAUTER, Syntypen.

formosanus JEDLIČKA, 1932 (*Tachys*)
(Acta Soc. Ent. Čechosl. 29, 81)

Holotypus, Formosa, Anping, SAUTERS Expedition; im DEI.

formosum BATES, 1892 (*Zyphium*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 386—387)

Mehrere Syntypen, Burma, Palon, Pegu, leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Palon, Pegu, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

forticostis LIEBKЕ, 1934 (*Brachynus*)
(Mem. Soc. Ent. Belg. 24, 35)

Holotypus, Freistaat, Reddenburg, Orange, leg. BRAUNS, Coll. LANGENHAN, im Museum Dresden; 1 Ex. dto.; 1 Ex. Caffraria, leg. V. VAHRENDORFF, im Museum Stettin; 1 Ex. Transvaal, im DEI; 7 Ex. Freistaat, Bloemfontein, Orange, im Imperial Institut of Entomology und in Coll. SCHAUBERGER; Paratypen.

DEI: 1 Paratypus, Transvaal.

foveella LIEBKЕ, 1937 (*Agra*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 4, 158—159, Fig. 2)

♂ Holotypus, Mexiko, in Coll. LIEBKЕ; 1 ♂, Paratypus, dto., im DEI.

DEI: 1 ♂, Paratypus, Mexiko, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *obscuripes* CHAUDOIR, 1854.

foveolatus KOLBE, 1889 (*Euleptus*)

(Stett. Ent. Ztg. 50, 121)

Mehrere Syntypen, Kongo, im Gebiet des unteren Quango, Kwako bis Kimpoko, leg. BÜTTNER.

DEI: 2 Syntypus, Kongo, Kimpoko, leg. BÜTTNER, Coll. KRAATZ.

fulvibasis REITTER, 1900 (*Blechrus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 377)

Mehrere Syntypen, Calabrien, Istrien (Ins. Veglia), Griechenland, Araxesthal, Talysch, Transcaspien, Turkestan.
DEI: 1 Syntypus, Attica, Coll. KRAATZ.

fumatus SCHAUM, 1853 (*Peronomerus*)

(Ann. Soc. Ent. France (3) 1, 440—441)

Mehrere Syntypen, Hongkong, leg. BOWRING.

DEI: 1 Syntypus, Hongkong.

fumicata MOTSCHULSKY, 1851 (*Tachys*)

(Bull. Soc. Nat. Moscou 24, 509)

Mehrere Syntypen, Ind. or.

DEI: 1 Syntypus, Ind. or. (Mindstrn.) Coll. v. HEYDEN.

furcatala LIEBKЕ, 1934 (*Lebia*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 1, 278—279, Fig. 2)

2 Syntypen, Peru, Callanga, Coll. KRAATZ, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

fuscitarsis SCHAUM, 1857 (*Chlaenius*)

(Berl. Ent. Ztschr. 1, 135)

Syntypen: 1 Ex. Creta, leg. ZEBE, 1 Ex. Zante (Griechenland), leg. v. KIESENWETTER.

DEI: 1 Syntypus, Graecia, Coll. SCHAUM.

Syn. zu *nigricornis* FABRICIUS, 1787.

fusiforme NETOLITZKY, 1914 (*Bembidion*)

(Ent. Mitt. 3, 168—169)

Mehrere Syntypen, Formosa, Botanwan, Paiwandistr., VII. 1912, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

gaedikei JEDLIČKA, 1965 (*Nebria*)

(Reichenbachia 5, 213)

♂ Holotypus, Westkaukasus, Umgebung Dombai, 1900—2200 m Höhe, leg. GAEDIKE, in Coll. GAEDIKE; 2 Paratypen, dto., leg. BRAASCH, in Coll. BRAASCH.

DEI: ♂ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung, 11.—12. VIII. 1963.

ganglbaueri APFELBECK, 1904 (*Brachynus*)

(Käfer. Balkan. 1, 348–349, Fig. 8)

Mehrere Syntypen: Bosnien, Dervent, Sarajevo, D. Unac; Herzegowina, Sumpfgebiet der unteren Narenta bei Gabela und Dracévo, Utovo blato, Mostarsko blato bei Mostav; Serbien, Požarevac, Bela Palanka, leg. HILF; Epirus, Chani Driskos bei Jannina, 1900; Griechenland, Korfu, 1893; leg. APFELBECK; Paganetti, Kyllene im Peloponnes, leg. KRÜPER; Kleinasiens, Alem Dagh, Goek Dagh, leg. v. BODEMEYER; Transkaukasien, Talyshgebirge, leg. LEDER, in Coll. REITTER; Ungarn, Banat, in Coll. REITTER, Szólánok, leg. HENSCH; Slavonien, Ruma, leg. HENSCH.
DEI: 1 Ex. Klein-Asien, Alem-Dagh, leg. v. BODEMEYER; 2 Ex. Herzegovina, Mostav; Coll. LEONHARD, Syntypen.

ganglbaueri APFELBECK, 1908 (*Synuchidius*)

(Anz. Akad. Wiss. Wien 1, 2)

Mehrere Syntypen, Ostalbanien, Schar-Dagh, 1906.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Schar-Dagh, Ljuboten, Coll. MÜLLER.

ganglbaueri matějkai MAŘAN, 1939 (*Nebria*)

(Ent. listy, Brünn, 2, 21)

Mehrere Syntypen, Jugoslavia mer., Jakupica planina, 12. VI. 1937, leg. MATĚJKA, KODYM und PURKYNĚ; im Museum Prag.

DEI: 1 Syntypus, Jugoslavia mer., Jakupica, 12. VI. 1937, leg. KODYM, Coll. KULT.

gehardti BOKOR, 1926 (*Duvalites*)

(Ann. Mus. Nat. Hung. 24, 40–48)

Mehrere Syntypen, Ungarn, Grotte Kecskebarlang im Tale Forrásvölgy, Bükk-Gebirge, Komitat Borsod, 24. VII. 1924, leg. BOKOR und GEBHARDT.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Ungarn, Com. Borsod, Kecskebarlang, M^o Bükk, 1925 (Jahreszahl in der Beschreibung nicht erwähnt!), leg. BOKOR.*georgii* BASILEWSKY, 1932 (*Stictotefflus*)

(Ent. Bl. 28, 23)

♀ Holotypus, Mozambique; im DEI.

gestroi BATES, 1892 (*Mastax*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 399)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Cheba, alt. 900–1100 m, leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, V.–XII. 1888, Coll. KRAATZ.

ghidinii GESTRO, 1909 (*Anophthalmus*)

(l.c. (3) 4 (1908), 202)

3 Syntypen, Italien, grotta del Monte Tre Crocette, 5. IX. 1907, leg. GHIDINI.

DEI: 2 Syntypen, Grotta tre Crocette, 1100, 13. IV. 1909 (Datum in der Beschreibung nicht erwähnt!), Coll. LEONHARD.

giganteum SAHLBERG, 1900 (*Bembidium*)

(Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. B. 42, 175–177)

Mehrere Syntypen, Turkestan, Tschu nahe Dschilarik, 17., 18. VII. 1896.

DEI: 1 Syntypus, Dschilarik, Coll. KRAATZ.

gilvipes EMDEN, 1935 (*Arthrostictus*)

(Rev. Ent. Rio de Janeiro 5, 309–311)

Syntypen: 1 ♂, Chaco, Villa Montes, V. 1926, leg. LINDNER, im Museum Dresden; 1 ♂, Tucuman, im DEI; 2 ♂♂, 1 ♀, Argentinien, Embarcacion, ca. 10 km OSO von Oran, Prov. Salta, im Museum Hamburg; 1 ♂, Paraguay, Mborero, Cordillera de Villarrica, XII. 1933, 1 ♀, Villarrica, II. 1934; leg. SCHADE.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Tucuman, Coll. GERMAR-SCHAUM.

glabellus ANDREWES, 1923 (*Lissopogonus*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 12, 214)

Sikkim: Holotypus, Namsoo, in Coll. ANDREWES; mehrere Paratypen: Gopaldhara, Birik und Gielle Khola, in der Tista Valley; leg. STEVENS; Assam: Rotung, 1400 ft., leg. KEMP, im Indischen Museum; Kumaon: West Almora, Tanakpur und River Sarda Gorge, leg. CHAMPION; Dehra Dun-Kali Gad, Mussoorie-Arni Gad und Siwaliks-Lachiwala, leg. CAMERON, im Forest Res. Inst.; Laos: Lak Mune, leg. DE SALVAZA.
DEI: 1 Paratypus, India, Kumaon, Haldwani Dist., leg. H.G.C.*göbli* BREIT, 1914 (*Trechus*)

(Koleopter. Rundsch. 3, 166)

Mehrere Syntypen, Peristeri-Gebirge, bei Monastir, via REITTER an BREIT.

DEI: 2 Syntypen, Monastir, Peristeri alpin, Coll. LEONHARD.

goschi JEDLIČKA, 1930 (*Pterostichus*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 27, 21)

8 Syntypen, Sibiria or., Nikolsk-Ussurijsk, leg. MANDL; in Coll. JEDLIČKA und Coll. MANDL.

DEI: 2 Syntypen, Nikolsk-Ussurijsk, Ussurigebiet, leg. MANDL.

gracilipes BATES, 1892 (*Epicosmus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 302)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamò, Noa Dehing, Sadiyd in Assam Valley; leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamò, VII. 1886, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

gracilis KRAATZ, 1883 (*Goniognathus*)(Dtsch. Ent. Ztschr. 27, 361—362; nom. praeocc. = *sogdianus* SEMENOV, 1898, Horae Soc. Ent. Ross. 30, 218)

♂ Holotypus, Samarkand; im DEI [STDGR. 81].

grandis STERNBERG, 1906 (*Anthia*)

(l.c., 169—170)

2 ♂♂, 7 ♀♀, Syntypen: D.-Südwest-Afrika, Okahandja, Windhuk; Natal (?); in Coll. STERNBERG.
DEI: 1 ♀, Syntypus, D.S.W.-Afrika, Okahandja, X. 1902, Coll. STERNBERG.Syn. zu *homoplata* LEQUIEN, 1832.***gratiosus*** MANNERHEIM, 1853 (*Elaphrus*)

(Bull. Moscou 26, 118)

Mehrere Syntypen, Alaska, ostia fl. Kaktnu peninsulae Kenai, M. VI., leg. HOLMBERG.

DEI: 1 Syntypus, Amerika bor., Nak. Rod. (nicht lesbar!), Coll. LEONHARD.

Syn. zu *riparius* LINNÉ, 1758.***gravis*** DEJEAN, 1928 (*Zabrus*)

(Spec. Gen. Coleopt. 3, 442—443)

Mehrere Syntypen, Spanien, leg. DEJEAN; bei Guadarama, leg. GOUDOT, Coll. DEJEAN.
DEI: 1 Syntypus, Hispan., Coll. KRAATZ.***grossepunctata*** BASILEWSKY, 1953 (*Leleupidia*)

(Rev. Zool. Bot. Afr. 47, 270, Fig. 9)

52 Ex., dont l'Holotypus, Kivu, Territoire de Fizi. Itombwe Sud, galerie forestière de la Mukera, 1.000 m, II. 1952; 29 Ex. dto., 800—900 m, IV. 1951; leg. LELEUP; im Musée du Congo, Tervuren: Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Kivu, Terr. Fizi, Bas Itombwe, 1000 m (Gal. for. Mukera), II. 1952, leg. LELEUP, I.R.S.A.C.-Mus. Congo, Récolté dans l'humus.***gundlachi*** DARLINGTON, 1934 (*Celliuris*)

(Psyche 41, 122—123)

Holotypus, no. 19539, 34 Paratypen, Cuba, Soledad, nahe Cienfuegos, VI., 19. X.—7. XI., im Museum of Comparative Zoölogy.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 21. X. 1926, durch DARLINGTON, ex M.C.Z.

guttiger SCHAUM, 1860 (*Thyreopterus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 4, 189, Taf. 3, Fig. 5)

Mehrere Syntypen, Borneo, leg. WALLACE.

DEI: 2 Syntypen, Borneo, Coll. SCHAUM.

guttiger SCHAUERGER, 1938 (*Acupalpus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 5, 50—51)

Holotypus, 15 Paratypen, Hinterindien, Kambodja, Pnom-penh, leg. FRIEDERICHS, in Coll. SCHAUERGER und im DEI.
DEI: Holotypus, 9 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.***habilis*** SLOANE, 1907 (*Colpodes*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 178—179)

Mehrere Syntypen, New Guinea, Kaiser Wilhelm Land, Sattelberg, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN.
DEI: 1 Syntypus, D.N. Guinea, Sattelberg.***halli*** BROUN, 1917 (*Tarastethus*)

(Bull. New Zealand Inst. 5, Nr. 1, 367)

5 Syntypen, New Zealand, Mount Kiwi und Moa Basin, nahe Mount Algidus, 20. X. 1914, via HALL an BROUN.

DEI: 2 Syntypen, New Zealand, Canterbury, Mt. Hurr.

hamzi JEDLIČKA, 1932 (*Bembidion*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 29, 40)

Holotypus, 11 Paratypen, China merd., Prov. Yunnan, in Coll. ANDREWES, Coll. NETOLITZKY, Coll. JEDLIČKA und im DEI.
DEI: 1 Paratypus, Yunnan fou.***harpaloides*** BATES, 1892 (*Arsenoxenus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 365)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamo, Palon, Pegu, leg. FEA.

DEI: 2 Syntypen, Palon, Pegu, VIII. IX. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

hasurada ANDREWES, 1924 (*Embidium*)

(Miss. BABAUT, Prov. Centr. Inde, 77—78)

Syntypen, Indien, occ. Himalaya, 1914: 1 Ex. Ladack, Mulbeck; 1 Ex. Spiti, Pulga, leg. BABAUT; mehrere Ex. W. Almora, Kumaon, Nainital, leg. CHAMPION.

DEI: 1 Syntypus, W. Almora, Kumaon, leg. CHAMPION.

hasurada pagmanicum FASSATTI, 1956 (*Bembidion*)

(Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, 33, 487—488)

♂ Holotypus, O.-Afghanistan, Pagmangebirge, 2300 m, 30. V. 1952, leg. KLAPPERICH (es müssen aber zu der Originalbeschreibung mehrere Ex. vorgelegen haben, da erwähnt wird: „Die Gesamtgröße schwankt zwischen 5,0 und 6,0 mm“).
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***hauseri* JEDLIČKA, 1931 (*Colpodes*)**

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 28, 105)

4 Syntypen, China, Prov. Szetschuan-Chung-king, in Coll. ANDREWES und Coll. JEDLIČKA.

DEI: 1 Syntypus, China, Tatsienlu, Szechuan, Vüling Süd, Coll. REITTER.

[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Szetschuan“ steht auf dem Etikett „Szechuan“.]

***hauseri* JEDLIČKA, 1931 (*Kanoldia*)**

(l.c. 62)

2 ♀♀, Syntypen, China, Prov. Yunnan-Soling-ho, in Coll. HAUSER und Coll. JEDLIČKA.

DEI: 1 ♀, Syntypus, Yunnan.

***heinzi* JEDLIČKA, 1965 (*Calathus*)**

(Reichenbachia 5, 218, Fig. 5)

♂ Holotypus, mehrere Paratypen, in den Gebirgen am Schwarzen Meer: Zigana-Paß, Egribel-Paß, Soganli-Paß, Kulakkaya bei Giresun, 2000 m und 2700 m, leg. HEINZ und KORGE, in Coll. HEINZ und Coll. KORGE.

DEI: 1 Paratypus, Anatolien bor., Soganli-Paß bei Bayburt, 2. VIII. 1963, 2000–2600 m, leg. KORGE.

***heinzi* JEDLIČKA, 1965 (*Nebria*)**

(l.c. 211–212, Fig. 1a)

♂ Holotypus, mehrere Paratypen, Anatolien, Soganli-Paß bei Bayburt, 2600–2700 m, in der Nähe von Schneefeldern, VII., VIII., leg. HEINZ und KORGE, in Coll. HEINZ, Coll. JEDLIČKA und Coll. KORGE.

DEI: 1 Paratypus, Anatolien bor., Soganli-Paß bei Bayburt, 2700 m, 1. VIII. 1963, leg. KORGE.

***heinzi* JEDLIČKA, 1965 (*Pterostichus*)**

(l.c. 216–217, Fig. 4)

♂ Holotypus, mehrere Paratypen, Anatolien, Zigana-Paß südlich Trabzon, 2200–2300 m Höhe, VII., leg. KORGE und HEINZ, in Coll. HEINZ und Coll. JEDLIČKA.

DEI: 1 Paratypus, Anatolien bor., Zigana-Paß bei Macka, ca. 2200 m, 31. VII. 1963, leg. KORGE.

***heinzi* JEDLIČKA, 1965 (*Zabrus*)**

(l.c. 215–216)

Holotypus, mehrere Paratypen, Anatolien, Egribel-Paß südlich Giresun, ca 2400 m Höhe, leg. HEINZ und KORGE, in Coll. HEINZ, Coll. JEDLIČKA und Coll. KORGE.

DEI: 1 Paratypus, Anatolien bor., Egribel-Paß, 2000–2400 m, 28. VII. 1963, leg. KORGE.

***hemicalosoma* SEMENOV, 1903 (*Carabus*)**

(Rev. Russ. d'Ent. 3, 231–232)

2 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Persia septentr., Prov. Astrabad, montes Budshnurd, IV. 1902, leg. SAARO, in Coll. SEMENOV und Coll. JAKOVLEV.

DEI: 2 Syntypen, Anatolien bor., Ala-Dagh, Budshnurd, 1033 m, V. 1902 (nicht IV. 1902!), Coll. HAUSER-Coll. LEONHARD.

***henryi* ANDREWES, 1923 (*Abacetus*)**

(Spol. Zeyl. 12, 238–239)

Holotypus, Ceylon, Kala-oya river, im Britischen Museum, mehrere Ex. Colombo, Negombo, Matale, Kandy und Anuradhapura, leg. HORN, im DEI; 1 Ex. Madras, Trichinopoly; Paratypen.

DEI: 1 Paratypus, Ceylon, Negombo, 1899, leg. HORN.

Syn. zu *rufopiceus* NIETNER, 1858.***herlanti* BASILEWSKY, 1951 (*Lynnastis*)**

(Rev. Zool. Bot. Afr. 45, 85–86, Fig. 1)

Holotypus, 196 Paratypen, Congo Belge, Kivu, Territoire de Kabare contreforts Sud-Est du Kahuzi, savane à Hagenia, alt. 2080 m, 10.–26. VIII. 1951, leg. LELEUP, im Muséum du Congo Belge à Tervuren.

DEI: 1 Paratypus, Kivu, Terr. Kabare, contref. S. E. Kahuzi, 2080 m, 13. VIII. 1951, leg. LELEUP, ex I.R.S.A.C.-Mus. Congo.

***heydeni* GANGLBAUER, 1915 (*Zabrus*)**

(Münch. Koleopt. Ztschr. 4, 93, 123)

♂ Holotypus, Kabylia, in Coll. v. HEYDEN; im DEI.

***heydeni* KRAATZ, 1875 (*Molops*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr. 19, 374)

Mehrere Syntypen, Balkan, Rhilo-Dagh, leg. HABERHAUER. Lectotyphenfestlegung durch MLYNAŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).

DEI: Lectotypus, Rhilo Dagh; 5 Ex. dto.; 1 Ex. Balkan; Coll. KRAATZ; Paralectotypen.

Syn. zu *dilatatus* CHAUDOIR, 1868.***heyrovskyi* JEDLIČKA, 1932 (*Bembidion*)**

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 29, 38)

Holotypus, 7 Paratypen, China mer., Prov. Yunnan, in Coll. ANDREWES, Coll. NETOLITZKY, Coll. JEDLIČKA und im DEI.

DEI: 1 Paratypus, Yunnan fow.

***hexagonus modiglianii* EMDEN, 1936 (*Colpodes*)**

(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 270–271)

♂ Holotypus, Java, Nongkodjadjar, 25. XI. 1933, in Coll. v. EMDEN, 4 Ex. dto.; 2 Ex. Gedeh, 4. IV. 1909, leg. BRYANT; 31 Ex. Preanger, G. Tangkoeban, Prahoe, 4000–5000 ft., III., V. 1934, leg. DRESCHER; Paratypen, in Coll. v. EMDEN, Coll. ANDREWES, im Museum Buitenzorg und im DEI.

DEI: 1 Paratypus, O. Java, Tengger Nongkodjadjar, 1300 m, leg. WEGENER, Gesch. XII. 1935 von OVERBECK.

hilaris TSCHITSCHERIN, 1899 (*Acupalpus*)

(L'Abbe 29, 274)

4 Syntypen, Sibérie or.; Chabarowsk (Amur); Wladiwostok, Coll. KOLTZE, Coll. TSCHITSCHERIN.
DEI: 3 Syntypen, Amur, Nr. 1641, Coll. KOLTZE.***hirsutulus*** BATES, 1892 (*Apotomus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 287)

Mehrere Syntypen, Burma, Rangoon; Palon, Pegu; Calcutta; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Palon, Pegu, VIII. IX. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.***hirtus*** DIECK, 1869 (*Scotodipnus*)

(Diagn. neuer blind. Käfer 4)

Mehrere Syntypen, Nordküste Marocco, Col di Tenda, Piemont, leg. DIECK.
DEI: 1 Syntypus, Col di Tenda, Coll. KRAATZ.***hollbergi separandus*** KRAATZ, 1881 (*Carabus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 25, 170)

Mehrere Syntypen, Caucasus.

Lectotypenfestlegung durch MANDL (im Druck).

DEI: Lectotypus, Caucas., Coll. KRAATZ; 1 Ex. Caucasus, Nr. 267; 1 Ex. Oestreich, Coll. STIERLIN (?); 1 Ex. Bohemani, Faw., Coll. KRAATZ; 1 Ex. dto. teste CHAUD.; 1 Ex. dto. etc. Caucas.; Paralectotypen.

holtzi SCHATZMAYR, 1909 (*Laemostenus*)

(Wien. Ent. Ztg. 28, 42)

Mehrere Syntypen, Makedonien, Vodena, leg. SCHATZMAYR.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

Syn. zu *stussineri* GANGLBAUER, 1896.***hopffgarteni*** HEYDEN, 1881 (*Molops*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 25, 247—248)

Mehrere Syntypen, Croatian, am See Plitvica, 1878, leg. v. HEYDEN, HOPFFGARTEN und REITTER.

Lectotypenfestlegung durch MLYNÁŘ (soll in Acta Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).

DEI: ♂ Lectotypus, Capela, 1 ♀, Paralectotypus, Croatia, Plitvica; leg. v. HEYDEN.

horni ANDREWES, 1923 (*Acupalpus*)

(Spol. Zeyl. 12, 237—238)

Holotypus, Burma, Mandalay, leg. ANDREWES, in Coll. ANDREWES; Ceylon, Anuradhapura, leg. HORN, im DEI; Tenasserim, leg. HELFER, im Museum Prag; India, Bombay, Belgaum, XII. 1886, leg. ANDREWES; United Provinces, Sitapur, leg. CHAMPION: mehrere Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Ceylon, Anuradhapura, 1899, leg. HORN.***horni*** JEDLIČKA, 1932 (*Agonotrechus*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 29, 82)

♂ Holotypus, Formosa, Suisharyo, Exped. SAUTER; im DEI [X. 1911].

horni SCHAUBERGER, 1938 (*Anoplogenius*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 5, 53—54)

Holotypus, Paratypen (2 ♂, 2 ♀), Hinterindien, Cochinchina, leg. FRIEDERICHS, im DEI und in Coll. SCHAUBERGER.
DEI: Holotypus, 2 Paratypen, Cochinchina, leg. FRIEDERICHS.***horni*** JEDLIČKA, 1931 (*Beckeria*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 28, 27)

2 ♂, 2 ♀, Syntypen, China mer., Prov. Szetschuan, Chung-king, V.—VI. 1929.

DEI: 3 Syntypen, China, Szechuan, Tatsienlu, leg. REITTER.

[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Szetschuan“ steht auf dem Etikett „Szechuan“.]

horni LIEBKE, 1934 (*Calleida*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 1, 279)

2 Syntypen, Peru, Coll. KRAATZ, im DEI und in Coll. LIEBKE.

DEI: 1 Syntypus, Peru, Coll. KRAATZ.

horni JEDLIČKA, 1932 (*Catascopus*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 29, 82—83)

♀ Holotypus, Formosa, Sokutsu, im DEI [Banshoryo-Distr., IX. 1912, leg. SAUTER].

horni LIEBKE, 1930 (*Colliuris*)

(Mitt. Zool. Mus. Berlin 15, 695—696)

Holotypus, Brasilien, Coll. KRAATZ, im DEI.

horni JEDLIČKA, 1928 (*Harpalus*)

(Wien. Ent. Ztg. 45, 92—94)

2 ♂, Syntypen, China, Tsingtau, in Coll. JEDLIČKA und im DEI.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Tsingtau, II., durch HOFFMANN.

Syn. zu *davidi* TSCHITSCHERIN, 1896—1900 (1897).

horni LIEBKE, 1934 (*Lebia*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 1, 277)

3 Syntypen, Peru, Callanga, Coll. KRAATZ; im DEI.
DEI: 2 Syntypen, Peru, Callanga, Coll. KRAATZ.***horni*** SCHAU BERGER, 1938 (*Oxycentrus*)

(I.c. 5, 38–39)

Holotypus, 1 Paratypus, Celebes, Makassar, Coll. GERMAR-SCHAUM, im DEI und in Coll. SCHAU BERGER.
DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.***horni*** SLOANE, 1907 (*Pogonoglossus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 184–185)

Mehrere Syntypen, New Guinea, New Pomerania, Gazelle Peninsula, leg. v. BENNIGSEN.
DEI: 1 Syntypus, Gazelle, H. Insel, Coll. v. BENNIGSEN.***horni*** DUPUIS, 1913 (*Pentagonica*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 57, 175–181)

Mehrere Syntypen, Ceylon, Weligama, leg. HORN.
DEI: 3 Syntypen, Ceylon, Weligama, 1899, leg. HORN.***horni*** JEDLICKA, 1932 (*Risophilus*)

(Čas. Čsl. Spol. Ent. 29, 83–84)

Holotypus, Ostasien, Formosa, Kosempo; 3 Ex. dto., 1 Ex. Kankau, Exped. SAUTER; im DEI, in Coll. ANDREWES und in Coll. JEDLICKA; Paratypen.

DEI: Holotypus, Formosa, Kosempo, 22. V. 1912, 1 Ex. dto. 7. IX. 1909, 1 Ex. Kankau (Koshun), 7. IV. 1912; leg. SAUTER, Paratypen.

horni DYKE, 1938 (*Scaphinotus*)

(Ent. Amer. 18, 116–117, Taf. 5, Fig. 10)

♂ Holotypus, Mexico, Coll. KRAATZ; im DEI.

horni STRANEO, 1938 (*Trichallinus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 5, 243–244, Fig. 1)

Holotypus, Paratypen (1 ♂, 3 ♀♀), Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ; in Coll. STRANEO und im DEI.
DEI: ♂ Holotypus, 2 ♀♀, Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.***horni*** SCHAU BERGER, 1938 (*Trichotichnus*)

(I.c. 46–47)

Nord-Borneo, Coll. WATERSTRADT, 5 Ex.; Kinabalu, Coll. KRAATZ, 6 Ex.; Holotypus, Paratypen, in Coll. SCHAU BERGER und im DEI.

DEI: Holotypus, Kina Balu, 3 Ex. dto., 2 Ex. Nord- Borneo, Coll. WATERSTRADT; Coll. KRAATZ, Paratypen.

hornianus SCHAU BERGER, 1938 (*Calathomimus*)

(I. c. 43–44)

♂ Holotypus, Ceylon, Worlds-End, 1899, leg. HORN; im DEI.

horsti REITTER, 1888 (*Pristodactyla*)

(Wien. Ent. Ztg. 7, 88–89)

Mehrere Syntypen, Circassien, Schneefeldern des Tschet, 1887, leg. LEDER und HORST.

DEI: 1 Syntypus, Caucas. occ., Circassien, leg. LEDER-REITTER, Coll. KRAATZ.

hudsoni BROUN, 1904 (*Trichosternus*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 14, 44–45)

5 Syntypen (Nr. 192), New Zealand, Wellington, leg. LEWIS und HUDSON.

DEI: 2 Syntypen, New Zealand, Wellington, Kavori.

humboldti LIEBKE, 1930 (*Colluris*)

(Mitt. Zool. Mus. Berl. 15, 661–689, Fig. 34)

Holotypus, 4 Ex. Brasilien, Cuyabá, im Museum Berlin; 1 Ex. Paraguay, S. Bernardino, leg. FIEBRIG, im DEI; Paratypen.

DEI: 1 Paratypus, Paraguay, S. Bernardino, leg. FIEBRIG.

hummleri JEANNEL, 1927 (*Trechus*)

(L'Abeille 33, 559)

Mehrere Syntypen, Abruzzen.

DEI: 9 Syntypen, Mte. Graeco, Paganetti, Coll. FRANKLIN-MÜLLER.

hustachei ANTOINE, 1923 (*Bembidium*)

(Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc 3, 103–104)

6 Syntypen, Maroco, Timhadit, daya de Tidouit, 5. VII. 1922, leg. ANTOINE.

DEI: 1 Syntypus, Maroc, Lac Sidi Ali, V., leg. ANTOINE.

ibericus PANTEL, 1888 (*Harpalus*)

(Ann. Hist. Nat. Soc. Espan. 17, 219–223, Fig. 1 b)

Mehrere Syntypen, Spanien, Rio Salado, circa Tarancón, Montalvo, II.–V.

DEI: 1 Syntypus, Spanien, Ucles, Coll. STIERLIN.

ibericus HOLDHAUS, 1912 (*Microlestes*)

(Denkschr. Akad. Wiss. Wien., Math.-Naturw. Kl., 88, 486—487, 523, Fig. 26)

Syntypen, Spanien; 1 ♀, Lageciras, 1 ♂, 1 ♀, Andalusia; ex Coll. REITTER; 1 ♂, Valencia, ex Coll. LEONHARD.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Valencia, Coll. LEONHARD.*ignitus* KRAATZ, 1875 (*Pterostichus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 19, 417—418)

Mehrere Syntypen, Balkan, Rhilo Dagh, leg. HABERHAUER.
DEI: 1 Syntypus, Balkan, Rhilo Dagh, Coll. KRAATZ.*imbricatum löffleri* MANDL, 1953 (*Calosoma*)

(S.B. öst. Akad. Wiss. Abt. L, 162, 57)

♂ Holotypus, 12 ♂♂, 8 ♀♀, Paratypen, Südostiran, Rigmati, westlich des Dschas Morian, E. III., A. IV. 1950, leg. LÖFFLER.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, III. 1950.*immarginatus* STRANEO, 1938 (*Caelostomus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 5, 245—246)

♂ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ; in Coll. STRANEO und im DEI.
DEI: ♂ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.*imperfecta* LIEBKÉ, 1934 (*Lebia*)

(I.c. 1, 275—276)

Syntypen: 2 Ex. Amazonas, Itaituba, Coll. KRAATZ, im DEI; 1 Ex. Ceara, Serra de Baturilé, im Museum Paris.
DEI: 1 Syntypus, Fundort nicht lesbar.*impressa* MOTSCHULSKY, 1851 (*Tachys*)

(Bull. Soc. Nat. Mosc. 24, 508)

Mehrere Syntypen, Ind. or.
DEI: 1 Syntypus, Ind. or. (Mndrstrn.), Coll. v. HEYDEN.*incultus* KRAATZ, 1875 (*Pterostichus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 19, 417)

Mehrere Syntypen, Balkan, Rhilo Dagh.
DEI: 6 Ex. Balkan, Coll. KRAATZ, 1 Ex. dto. Rhilo Dagh; Syntypen.*inermis* BATES, 1892 (*Stomonaxus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 352)

Mehrere ♀♀, Syntypen, Burma, Teinzo, Thagata, Tenasserim, leg. FEA.
DEI: 1 ♀, Syntypus, Tenasserim, Meetan, IV. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ (Ex. ohne Caput).*infissa* ANDREWES, 1937 (*Tritrichis*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (10) 19, 492—493)

♂ Holotypus, Assam, Khasi Hills, im DEI; 1 ♂, dto.; 1 ♂, 1 ♀, Shillong, leg. GODWIN-AUSTEN; im Indischen Museum und in Coll. ANDREWES.

DEI: Holotypus, Khasis, 1898, Coll. KRAATZ.

ingusch ZOLOTAREV, 1913 (*Tribax*)

(Rev. Russe d'Ent. 13, 151—152)

10 Syntypen, Kaukasus, im Lande der Inguschen, am oberen Terek, ca. 7000 ft., leg. ZOLOTAREV.
DEI: 1 Syntypus, Terek, 6500, leg. ZOLOTAREV.*inschanicus* BREIT, 1914 (*Harpalus*)

(Koleopter. Rundsch. 3, 167—168)

Mehrere Syntypen, Mongolei, In-Schan (nördlichstes Flußknie des Hwang-ho), durch STAUDINGER & BANG-HAAS.
DEI: 2 Syntypen, Mongolei, Inn Shan, Coll. LEONHARD.

[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „In-Schan“ steht auf dem Etikett „Inn Shan“.]

insularis MUTHLER, 1934 (*Pseudaptinus*)

(Ann. Mus. Nov. Nr. 686, 4)

Holotypus, Mayaguez, Puerto Rico, 22. IX. 1916, leg. v. ZWALUWENBURG; 1 Ex. dto. 11. V. 1917; 17 Ex. Cuba, Soledad, Cienfuegos; 21. X.—3. XI. 1926/VI. 1929, leg. DARLINGTON; im Museum of Comparative Zoölogy und im Amerikanischen Museum; Paratypen.

DEI: 1 Paratypus, Cuba, Soledad, Cienfuegos, 3. XI. 1926, leg. DARLINGTON.

insulindae LIEBKÉ, 1934 (*Galerita*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 1, 280)

Holotypus, 5 Paratypen, Ost-Java, Pradjekan, in Coll. LIEBKÉ und im DEI.
DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, leg. HEYNE.*integra* ANDREWES, 1929 (*Clivina*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (10) 4, 354—355)

Mehrere Syntypen, Medan, Bandar Baroe, Sibolangit, leg. CORPORAAL; Manna; Palembang; leg. KNAPPERT; Liangagas, Coll. DOHRN, im Museum Stettin; Tebing Tinggi, leg. SCHULTHEISS, im DEI; Medan, Tjinta Radja und Kota Tjane, leg. MÖÖBERG, im Museum Stockholm, Kaju Tanam, leg. BECCARI, im Museum Genoa.
DEI: 1 Syntypus, N.O. Sumatra, Tebing-tinggi, leg. SCHULTHEISS, Coll. KRAATZ.

irakensis ANDREWES, 1927 (*Oodes*)

(Ent. Mitt. 16, Nr. 2, 144–145)

♀ Holotypus, Irak, Amara, 12. V. 1917, leg. BEESON, im Britischen Museum, 1 ♀, Paratypus, Basra, 13. VI. 1926, leg. SCHMIDT, im DEI.

DEI: 1 ♀, Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

iridea BATES, 1892 (*Dolichoctis*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 414–415)

Mehrere Syntypen; Burma, Karin Chebà, alt. 900–1100 m; Karin Asciuii Chebà, alt. 1200–1300 m; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Chebà, 900–1100 m, V. XII. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.*iridulus* BATES, 1892 (*Ophoniscus*)

(l. c., 337)

Mehrere Syntypen; Burma, Karin Asciuii Ghecu, 1400–1500 m; Palon, Pegu; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Asciuii, Ghecu, 1400–1500 m, III.–IV. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.*ischioxanthus* BATES, 1892 (*Colpodes*)

(l.c., 376)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Chebà, alt. 900–1100 m, leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 5. XII. 1888, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *cruralis* CHAUDOIR, 1878.*italicus* DANIEL, 1898 (*Trechus*)

(Koleopter. Studien 2, 13)

Mehrere Syntypen, Gran Sasso d'Italia, leg. FIORI.

DEI: 1 Syntypus, G. Sasso, Abruzzi, leg. FIORI.

jacobsoni ANDREWES, 1926 (*Chlaenius*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 18, 274–275)

Holotypus, 14 Paratypen, Sumatra, Fort de Kock, 3000 ft., leg. JACOBSON, im Britischen Museum.
DEI: 1 Paratypus, Sumatra, Fort de Kock, 920 M, 1925, leg. JACOBSON.*janthinus janthinus* GANGLBAUER, 1887 (*Sphodristocarabus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 31, 140)

Mehrere Syntypen, westl. Caucasus, Dagomys, Atschischho, Kitschmaj, leg. STARCK.

Lectotypenfestlegung durch MANDL (im Druck).

DEI: 1 Paralectotypus, occid. Caucasus, Atschischho, leg. STARCK.

japonica BATES, 1893 (*Coptodera*)

(Trans. Ent. Soc. London 3, 281, Taf. 13, Fig. 4)

Mehrere Syntypen, Japan, Kiuskuu.

DEI: 1 Syntypus, Japan, 1910–320, leg. LEWIS.

javanica EMDEN, 1937 (*Sarothrocrepis*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 4, 117–119)

Holotypus, 5 Paratypen, Java, Nongkodjadjar, in Coll. v. EMDEN, Coll. ANDREWES und im DEI.

DEI: 1 Paratypus, O-Java, Tengger, Nongkodjadjar, 1300 m, leg. WEGENER, Gesch. XII. 1935 von OVERBECK.

jezerensis APFELBECK, 1908 (*Trechus*)

(Glasn. Muz. Bosn. Herc. Sarajevo, 20, 525–526, Fig.)

Mehrere Syntypen, Bosnia centralis, Jezero, leg. APFELBECK.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Jezero, 1902, leg. APFELBECK, Coll. LEONHARD.

joërinii STIERLIN, 1890 (*Carabus*)

(Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 8, 239–240)

Mehrere Syntypen, in der Nähe von Zürich, leg. JOËRIN-GERBER, in Coll. STIERLIN.

DEI: 1 Syntypus, Zürich, Coll. STIERLIN.

Syn. zu *auronitens* FABRICIUS, 1792.*johnbeckeri* BÄNNINGER, 1927 (*Cicindela*)

(Suppl. Ent. 16, 119–121)

♀ Holotypus, Bushere am Persischen Golf, 22. IV. 1927, leg. BECKER; im DEI.

jurečekii JEDLIČKA, 1928 (*Pseudophonus*)

(Ent. Mitt. 17, 45–46)

Syntypen: 7 ♂♂, 2 ♀♀, Sachalin, 1 ♀, Japan, im DEI; 12 ♂♂, 4 ♀♀, Ussuri-Sutschwan, durch STAUDINGER & BANG-HAAS.
DEI: 6 Ex. Sachalin, Coll. KRAATZ (1 Ex. ohne Caput); 1 Ex. Japan, Coll. KRAATZ; 1 Ex. ohne Fundort; Syntypen.*jurečekianus* MAŘAN, 1940 (*Pterostichus*)

(Cas. Cs. Spol. Ent. 37, 3–4)

♂ Holotypus, mehrere Paratypen, Sibiria occ. Barnaul in parte septentrionali montium Altaj; im Museum Prag und in Coll. JUREČEK.

DEI: 1 Paratypus, Sibiria occ., Barnaul Altaj.

juvenile *jedličkai* BASILEWSKY, 1932 (*Tefflus*)

(Ent. Bl. 28, 21)

♀ Holotypus, D.O. Afrika, Usaramo, leg. v. BENNIGSEN; im DEI.

***kaninensis* POPPIUS, 1906 (*Cryobius ius*)**

(Acta Soc. Faun. Flora Fenn. 28 (1905), nr. 5, 20, 143—146)

Mehrere Syntypen, Nord-Kußland, Halbinsel Kanin, Sommer 1903, leg. POPPIUS, im Museum Helsingfors.

DEI: 1 Syntypus, Kanin, leg. POPPIUS, Coll. LEONHARD.

***kara* ANDREWES, 1921 (*Bembidion*)**

(Ent. Monthly Mag. (3) 7 (57), 250)

Holotypus, mehrere Paratypen; Tonkin, Chapa; Laos, Ban Sop Vi, Lak Mune, Sop Soup, Ban Nong, Sala Nam Chan Chin, Ban Samang, Pak Seng und Don Khoua; leg. VITALIS DE SALVAZA; Cochin China, Cap St. Jacques, Coll. FLEUTAUX; India, United Provinces; West Almora und in Swal River Basin, leg. CHAMPION; Sikkim, Namsu, 2100 ft. und Gopaldhara, 4720 ft., leg. STEVENS.

DEI: 3 Paratypen, Br. Sikkim, Gopaldhara, leg. STEVENS.

***kineli* MAKÓLSKI, 1952 (*Badister*)**

(Ann. Mus. Zool. Pol. 15, 14—16, Taf. 3, Fig. 3)

Polen: ♂ Holotypus, Gocławek, nahe Warszaw, 23. III. 1947, leg. MAKÓLSKI; 96 Ex. dto.; 17 Ex. Warszaw, leg. MAKÓLSKI, Szczecin, leg. ?; Gdańsk, leg. KNIPEHOFF; Toruń, leg. BARTOSZYŃSKI, Elk, leg. BIELAWSKI, Miedzyrzec Podlaski, leg. MAKÓLSKI und BURAKOWSKI, Kazimierz Dolny, leg. MRÓCZKOWSKI, Nowa Sol, leg. ? Wrocław, leg. POLENZ; Ukrainian S.S.R. Babijce und Krzywce an der Dniester, leg. TOLL, Dvinograd an der Dniester, leg. TENENBAUM; Yugoslavia, Zagreb, leg. WEINGARTNER; Austria, Neusiedlersee, leg. HOPFFMAN; im Polnischen Museum of Zoology in Warszaw.

DEI: 2 Paratypen, Polonia centr., distr. Warszawa, Gostawek, 23., 25. III. 1947, leg. MAKÓLSKI, Mus. Zool. Polonikum, Warszawa, 2/47.

***klapperichi* JEDLIČKA, 1956 (*Amara*)**

(Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 30 (1955), Nr. 452, 196—197)

Afghanistan, Badakschan: 26 Ex. Sarekanda, 1 Ex. Kandahar; 1952—1953, Exped. KLAPPERICH; Holotypus, Paratypen, in Coll. KLAPPERICH und in Coll. JEDLIČKA.

DEI: 1 Paratypus, N.O.-Afghanistan, Sarekanda, Gebirge Badakschan, 4100 m, 28. VII. 1953, durch KLAPPERICH.

***klapperichi* JEDLIČKA, 1956 (*Brachynus*)**

(l.c., 204)

21 Ex. Afghanistan, Bashgultal, 1952—1953, Exped. KLAPPERICH; Holotypus, Paratypen, in Coll. JEDLIČKA und Coll. KLAPPERICH.

DEI: 1 Paratypus, Afghanistan, Bashgultal, 1200 m, Nuristan, 15. IV. 1953, leg. KLAPPERICH.

***klapperichi* JEDLIČKA, 1956 (*Chlaenius*)**

(l.c., 208—209)

Holotypus, 3 Paratypen, China, Prov. Fukien, Kuatun, 1952—1953, Exped. KLAPPERICH, in Coll. JEDLIČKA und Coll. KLAPPERICH.

DEI: 1 Paratypus, China, Tschung Sen, Kuatun, Fukien, 1. VI. 1946.

***klapperichi* JEDLIČKA, 1956 (*Glycia*)**

(l.c., 203)

Afghanistan: 9 Ex. Nuristan, Bashgultal, 3 Ex. Kutian, 1 Ex. Asmar; 1952—1953, Exped. KLAPPERICH; Holotypus, Paratypen, in Coll. JEDLIČKA und Coll. KLAPPERICH.

DEI: 1 Paratypus, Afghanistan, Nuristan, Bashgultal, 1100 m, 6. IV. 1953, leg. KLAPPERICH.

***klapperichi* JEDLIČKA, 1956 (*Harpalus*)**

(l.c., 194—195)

Afghanistan: 30 Ex. Sarekanda, Badakschan, 6 Ex. Bashgultal; 1952—1953, Exped. KLAPPERICH; Holotypus, Paratypen, in Coll. JEDLIČKA und Coll. KLAPPERICH.

DEI: 2 Paratypen, NO-Afghanistan, Gebirge Badakschan, Sarekanda, 4200 m, 31. VII. 1953, leg. KLAPPERICH.

***klapperichi* JEDLIČKA, 1956 (*Zabrus*)**

(l.c., 197)

Afghanistan: 61 Ex. Kandahar Kuna; 1 Ex. Badakschan; 4 Ex. Pagmangebirge; 1 Ex. Turkestan, Osch; 1952—1953, Exped. KLAPPERICH; Holotypus, Paratypen, in Coll. KLAPPERICH und Coll. JEDLIČKA.

DEI: 1 Paratypus, S-Afghanistan, Kandahar-Kuna, 950 m, 28. I. 1953, leg. KLAPPERICH.

***kličkai* JEDLIČKA, 1934 (*Colpodes*)**

(Sborn. ent. Mus. Praze 12, Nr. 103, 197)

Holotypus, 4 Paratypen, China, Szechuan, Nitou-Tatsienlu, in Coll. JEDLIČKA und Coll. REITTER.

DEI: 2 Paratypen, China, Szechuan, Nitou Tatsienlu, Wassoland, Chunghua, Coll. REITTER.

***knauthi* GANGLBAUER, 1904 (*Trechus*)**

(Münch. Kol. Ztschr. 2, 189—190)

Mehrere Syntypen, Judicarien, Monte Pari, 1991 m, leg. GANGLBAUER.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1903.

***knirschi* JEDLIČKA, 1931 (*Brachynus*)**

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 28, 107—108)

1 Ex. China, Prov. Yunnan-Soling-ho, 2 Ex. Bougt, leg. DONCKIER, 1 Ex. Szetschuan-Kiating; in Coll. ANDREWES, Coll. BREUNING und Coll. JEDLIČKA; Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, China merid., Provincia Yunnan.

***koketii* MILLER, 1850 (*Pterostichus*)**

(Stett. Ent. Ztg. 11, 11)

Mehrere Syntypen, Obersteiermark, Seethal-Alpe bei Judenburg.

DEI: 1 Syntypus, Steiermark, Coll. STIERLIN.

kolariensis MAINDRON, 1898 (*Chlaenius*)

(Bull. Soc. Ent. Fr. 5, 130–131, Fig.)

2 ♂♂, 4 ♀♀, Syntypen, Inde orientale, Chotia Nagpore, Nawafully, XI. 1896, leg. CARDON, via OBERTHÜR an MAINDRON.
 DEI: 1 Syntypus, Chota Nagpore, Nowatoli, XI.–XII. 1896, leg. CARDON, Coll. LEONHARD.

koltzei REITTER, 1900 (*Bradyceillus*)

(Verh. Nat. Ver. Brünn 38 (1899), 133)

Mehrere Syntypen, Thibet, Kuku-noor.

DEI: 1 Syntypus, Kuku-noor, durch REITTER, Nr. 1648, Coll. KOLTZE.

Syn. zu *grandiceps* BATES, 1873.**komarowi** SEMENOW, 1889 (*Discoptera*)

(Horae Soc. Ent. Ross. 23, 397–398)

Mehrere Syntypen, Prov. Transcasica, Repetek, V. 1888, in Coll. KOMAROW; 1 ♂, 1 ♀, in collect. nostra, 1887, leg. EYLAND, detecta.

DEI: 1 Syntypus, Transcas., Coll. KRAATZ.

korbi TSCHITSCHERIN, 1893 (*Feronia*)

(l.c. 27, 482–483)

2 ♀♀, Syntypen, Asie Mineure, Amasia, im Museum Vienne und in Coll. TSCHITSCHERIN.

DEI: 1 Syntypus, Amasia, Coll. KRAATZ.

korschefskyi KULT, 1950 (*Aspidoglossa*)

(Arthropoda 1, 318–319)

Holotypus und 1 Ex. Argentina, S. Pedro de Colaiao, ex Coll. JEDLIČKA, in Coll. KULT, 1 Ex. Tucumán, ex Coll. STAUDINGER, in Coll. KULT, 12 Ex. Tucumán, leg. VÉZENYI, im Museum Budapest und in Coll. KULT; 2 Ex. Paraguay, leg. FIEBRIG, im DEI; 3 Ex. Brasilia, 1899, leg. MERKL, im Museum Budapest; Paratypen.

DEI: 2 Paratypen, Paraguay, leg. FIEBRIG.

korschefskyi EIDAM, 1931 (*Diocarabus*)

(Wien. Ent. Ztg. 48, 79)

1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen: Sibiria meridionalis, Semirjetschensk, Terskeitau, VI. 1902, Coll. HAUSER – Coll. LEONHARD, im DEI.
 DEI: 1 ♂, 1 ♀, Turk. Issyk-kul, Terski-tau, VI. 1902, Coll. HAUSER, 1 ♀, Turkestan, Kok-teke Gebirge, Coll. LEONHARD;
 Syntypen.**kraatzi** MÜLLER, 1889 (*Nebria*)(Dtsch. Ent. Ztschr., 424; nom. praeocc. = *diaphana* DANIEL, 1890, l.c., 130)Mehrere Syntypen; Kärnthen auf dem Obir, 6750 ft.; Vertazha-Sattel, 5770 ft., E. VI.; Lombardei, Monte Grigna, VI.;
 leg. MÜLLER.

DEI: 1 Syntypus, Carinthia, Vertazha-Sattel, Coll. KRAATZ.

kraatzi SCHAUBERGER, 1938 (*Oxycentropis*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 5, 44–46)

Holotypus und 16 Ex. Südost-Sumatra, Tebing-Tinggi, leg. SCHULTHEISS, Coll. KRAATZ, im DEI, in Coll. ANDREWES und Coll. SCHAUBERGER; 1 Ex. Celebes, Makassar, Coll. GERMAR-SCHAUM, im DEI: Paratypen.

DEI: Holotypus, Sumatra, T. T., Coll. KRAATZ; 9 Ex. dto.; 1 Ex. N.O. Sumatra, Tebing tinggi, leg. SCHULTHEISS, Coll. KRAATZ; 1 Ex. Celebes, Makassar, Coll. GERMAR-SCHAUM; Paratypen.

kraatzi HEYDEN, 1882 (*Pseudotaphoxenus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 26, 309–310)

♂ Holotypus, Samarkand, leg. HABERHAUER, in Coll. KRAATZ; im DEI.

kraatzi HEYDEN, 1882 (*Derus*)

(l.c., 311)

Mehrere Syntypen, Samarkand, leg. HABERHAUER.

DEI: 3 Syntypen, Namonigan (Fundort ist nicht aufzufinden und stimmt mit der Originalbeschreibung nicht überein), Coll. KRAATZ.

kricheldorfii WAGNER, 1913 (*Trechus*):

(Ent. Mitt. 2, 19–21)

Holotypus, mehrere Ex., Nord-Spanien, Picos de Europa, südwestl. v. Santander, im östl. Teil des Gebirges, im Bezirk La Libana, ca. 2000 m Höhe, Sommer 1911, leg. KRICHELDORFF, in Coll. WAGNER, mehrere Ex. Andara, Picos d. Europa, 1911, leg. E. & H. HOPP, in Coll. HOPP und im DEI: Paratypen.

DEI: 2 ♂♂, 1 ♀, Picos de Europa, La Libana, leg. KRICHELDORFF, Coll. WAGNER, 1 ♂, Picos de Europa, VI. 1911, leg. HOPP; Paratypen.

kubanicus REITTER, 1896 (*Pierostichus*)

(Wien. Ent. Ztg. 15, 202)

Mehrere Syntypen, Cirkassien.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *caucasicus* MÉNÉTRIÉS, 1832.**kultii** STRANEO, 1952 (*Feroniola*)

(Doriana, 1, Nr. 28, 3–4, Fig. 1)

Holotypus, 21 Paratypen, Bolivia, Cochabamba, Massiccio di Tunari, 4000 m, leg. ZISCHKA; im Museum Genóva.
 DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, Tunari-Massiv, durch REITTER.

kurdistanicus EIDAM, 1931 (*Cylocarabus*)

(Wien. Ent. Ztg. 48, 78)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Armenia turcica orientalis meridionalis, Wan 1912, leg. KULZER, Coll. LEONHARD, im DEI.

laetus SCHAUM, 1860 (*Pericalus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 4, 190—191)

Mehrere Syntypen, ohne Fundort.

DEI: 1 Syntypus, Celebes, Coll. SCHAUM.

laeviceps BATES, 1892 (*Clivina*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12, 277)

Mehrere Syntypen; Burma, Rangoon, Palon in Pegu; leg. FEA.

DEI: 1 Ex. Palon, Pegu, 8. IX. 1887; 1 Ex. Birmania, Bhamo, VII. 1886; 5 Ex. Rangoon, 1886/1887/XII. 1888; leg. FEA, Syntypen.

lagaroides REITTER, 1887 (*Haptoderus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 31, 249)

Mehrere Syntypen, Abchasiens, Circassien, leg. KÖNIG.

DEI: 1 Syntypus, Caucas. occ., Circassien, Coll. LEDER-REITTER-KRAATZ.

Syn. zu *quadrucollis* CHAUDOIR, 1846.***lamprotus*** BATES, 1892 (*Hypolithus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 338—339)

Mehrere Syntypen; Burma, Teinzd; Karin Ghecu, alt. 1300—1400 m; Karin Chebà, alt. 900—1100 m; Bhamo; leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Karin-Chebà, V. XII. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

laotinus ANDREWES, 1919 (*Chlaenius*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 4, 14—15)

Holotypus, mehrere Paratypen, Laos, Provinces of Luang Prabang, Haut Mekong, 1915—18, leg. DE SALVAZA; im British Museum.

DEI: 2 Paratypen, Luang Prabang, Muong Hién, 30. XI. 1917, leg. DE SALVAZA.

lapidicola BOKOR, 1913 (*Anophthalmus*)

(Ann. Mus. Nat. Hung. 11, 586—588)

2 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, ein Tal in der Gemeinde Aranyosfö, Komitat Torda-Aranyos, Ungarn.

DEI: 1 Syntypus, Vall. Ordinkus (Fundort ist nicht aufzufinden und stimmt mit der Originalbeschreibung nicht überein), durch BOKOR, Coll. LEONHARD.

Syn. zu *hickeri* KNIRSCH, 1913.***lata*** GUÉRIN, 1841 (*Antarctia*)

(Rev. Zool. Paris, 190)

Mehrere Syntypen, H. le Port Famine, détroit de Magellan.

DEI: 1 Syntypus, Magellan St., Coll. SCHAUM.

latefasciatum LIEBKE, 1931 (*Mastax*)

(Ent. Anz. 11, 262—263, Fig.)

Holotypus, 3 Paratypen, Annam, Phuc-Son, leg. FRUHSTORFER, in Coll. LIEBKE und im DEI.

DEI: 1 Paratypus, Phuc-Son, XI.—XII., leg. FRUHSTORFER, Coll. KRAATZ.

laticollis KRAATZ, 1876 (*Procerus*)

(Bull. Soc. Nat. Moscou 51, 127, 130—131, Taf. 1, Fig. 6—8)

Mehrere Ex. bei Külek, leg. HABERHAUER; 1 Ex. Karl-Boghd, ex Coll. LEDERER; Syntypen.

DEI: 2 Syntypen, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *scabrosus* OLIVIER, 1795.***latipennis*** BURGEON, 1930 (*Craspedophorus*)

(Rev. Zool. Bot. Afr. 19, 164—165)

Mehrere Syntypen, Camerun, Mukonge Farm, leg. ROHDE, im Musée du Congo, Musée de Bruxelles und DEI.

DEI: 1 Syntypus, Kamerun, CONRADT, Coll. KRAATZ.

lebioides BATES, 1892 (*Pristomachaerus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 306)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Chebà, alt. 800—1100 m; Karin Asciuui Chebà, 1200—1300 m; leg. FEA.

DEI: 2 Syntypen, Karin Cheba, 900—1100 m, V. XII. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

lentus STURM, 1818 (*Harpalus*)(Deutschl. Ins. 4, 28, Taf. 82, Fig. a, A; nom. praeocc. = *flavicornis* DEJEAN, 1829, Spec. gén. Col. 4, 366)

Mehrere Syntypen, Österreich, ex Coll. MEGERLE VON MÜHLFELD in Wien.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort.

leonhardi NETOLITZKY, 1909 (*Bembidium*)

(Wien. Ent. Ztg. 28, 43—44)

Mehrere Syntypen; Bosnien, am Ramafluß bei Prosor; Herzegovina, Doljankatale bei Jablanice, leg. LEONHARD.

DEI: 3 Ex. Bosnia, Prosor, 1902, 1 Ex. dto. Wassermoosgesiebe am Ramafluß; 1 Ex. Herzegovina, Jablanica, Doljanka Thal, Wassermoosgesiebe; leg. LEONHARD, Syntypen.

leonhardi BREIT, 1911 (*Laemostenus*)

(Wien. Ent. Ztg. 30, 112–113)

2 ♀♀, Syntypen, Kephalonia, am Eingang zur Drachenhöhle, Arythos-See, leg. HILF, in Coll. LEONHARD und Coll. BREIT.
DEI: 1 ♀, Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1. IV. 1905, Coll. LEONHARD.***leonhardi*** BREIT, 1914 (*Pterostichus*)

(Koleopter. Rundsch. 3, 53, 56)

4 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Kephalonia, Megalo Vuno, 1200–1400 m, E. III., leg. MOCZARSKI und WINKLER.
DEI: 2 Syntypen (Ex. verliehen, konnten nicht überprüft werden).***leonhardi*** BREIT, 1913 (*Setnikia*)

(Ent. Mitt. 2, 13–14)

3 Syntypen, bosnisch-herzegowinische Höhlenfauna, im Bjelasničagebiet in Südbosnien, leg. SETNIK, an LEONHARD.
DEI: 3 Syntypen, Herzegovenia, Vysosiča, Coll. LEONHARD.***leonhardi*** REITTER, 1901 (*Trechus*)

(Wien. Ent. Ztg. 20, 143)

Mehrere Syntypen: Herzegowina; Jablanica, leg. REITTER; Rana, leg. HILF; Komadina-Quelle, Tovarnica, VI., leg. LEONHARD.

DEI: Herzegowina: 1 Ex. Jablanica, 1901, 1 Ex. dto., Wassersiesel in der Tovarnica; 1 Ex. Komadina, VI. 1901; Coll. LEONHARD, Syntypen.

lepitrei KRAUSE, 1909 (*Carabus*)

(Int. Ent. Ztschr. Guben 3, 171)

Mehrere Syntypen, Marokko, Ebene Angad, via LEPISTRE an KRAUSSE.

DEI: 2 Syntypen, Marokko, Ebene der Angad, KRAUSSE 1910 erhalten, Coll. FRANKLIN MÜLLER.

Syn. zu *morbillosus* FABRICIUS, 1792.***lesnei*** STERNBERG, 1906 (*Anthia*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 454)

4 ♂♂, 6 ♀♀, Syntypen, Congo français, Haute Sanga, Nebenfluß des unteren Congo, im Museum Paris und in Coll. STERNBERG.

DEI: 1 ♀, Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. KRAATZ.

leus ANDREWES, 1927 (*Pterostichus*)

(Ent. Mitt. 16, Nr. 2, 146)

Holotypus, Irak, Mudelli, 2. III. 1917, leg. BEESON, im Britischen Museum, 5 Ex. Basra, 13. VI. 1926, leg. SCHMIDT, im DEI, 1 Ex. Amara, 12. VI. 1916, leg. BEESON; Paratypen.

DEI: 3 Paratypen, Basra, 13. VI. 1926, leg. SCHMIDT.

leveillei DEVILLE, 1914 (*Bembidion*)

(Cat. Col. Corse, 498)

Mehrere Syntypen, Corsika, durch RAYMOND-Coll. LÉVEILLE.

DEI: 1 Syntypus, Corsica, Coll. NETOLITZKY.

lineatopunctatus MILLER, 1850 (*Pterostichus*)

(Stett. Ent. Ztg. 11, 10–11)

Mehrere Syntypen, Obersteiermark, Haller Alpe, hoch'schen Alpenhütte, leg. MILLER.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. STIERLIN.

lineella SLOANE, 1907 (*Agonochila*)(Dtsch. Ent. Ztschr., 182–183; nom. praeocc. = *papuana* SLOANE, 1917, Proc. Linn. Soc. N.S. Wales 42, 433)

Mehrere Syntypen, New Guinea, New Pomerania, Herbertshöhe, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN.

DEI: 1 Syntypus, D.N. Guinea, Herbertshöhe, leg. v. BENNIGSEN.

löfferti JEDLIČKA, 1963 (*Amara*)

(S. B. Österr. Akad. Wiss., Mathem.-naturw. Kl., Abt. 1, 172, 174–175, Fig. 6)

Holotypus, 6 Paratypen, Iran, Kührang, Talwiesen, durch MANDL, Österreichische Iran-Expedition 1949/50, in Coll. JEDLIČKA.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, leg. LÖFFLER.

longicollis slovenicus SCHWEIGER, 1950 (*Trechus*)

(Proc. 8th int. Congr. Ent. Stockholm (1948), 491–492)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Slov. Bachergebirge, leg. BERNHAUER, in Coll. SCHWEIGER.
DEI: 1 Syntypus, Bachergebirge, GANGLBAUER.***longicornis*** SCHAUM, 1857 (*Stenolophus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 1, 145)

Mehrere Ex. Griechenland, Nauplia, leg. v. KIESENWETTER; 2 Ex. Oestreich, in Coll. SCHAUM: Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, Austria.

longipes DANIEL, 1902 (*Bembidium*)

(Münch. Kol. Ztschr. 1, 10, 29)

Mehrere Syntypen: bei Bozen im Sarntal am Talferufer, VI., IX. 1885, auf der Seiseralpe, 13. IX. 1885, am Sustenpaß, Meiental im Canton Uri, 15. VIII. 1891, bei Macugnaga am Monte Rosa, 11. VIII. 1886, auf der Spitze des Monte Bego in den Sealpen, 31. VII. 1894, 2873 m, am oberen Peso in Ligurien, 31. VII. 1890 und bei Blégiers, Basses-Alpen am

Ufer der Bléone, 9. VIII. 1898; Styria sup., Schladming, Coll. SCHUSTER, Wien; Karawanken, Stou, GELBR., Wiener Hofmuseum; Carniola, Kot-Thal, durch STUSSINER, Wiener Hofmuseum; Carinthia sup., Ober-Vellach, durch APFELBECK, Bosn.-herzegow. Landesmuseum; Salzburg, Lofer a. d. Saalach, Coll. SCHNEIDER, Dresden; Nord-Tirol, Niederthal im Oetzthal, 22. VII. 1899, Coll. KURZ, München; Allgäu, durch JÄGER, Coll. DORMEYER, Stettin; Meran, Coll. LEONHARD, Dresden; Val Bregaglia, Castasegna bei Chiavenna, durch RÖTTGEN, Coll. DORMEYER, Stettin; Savoie, La Giettaz, Coll. DEVILLE, Nizza; Alp. marit., Sirolo, Coll. DEVILLE, Nizza; Hautes-Pyrénées, Coll. SAHLBERG, Helsingfors; Eaux-Chaudes, Hautes-Pyr., Coll. DORMEYER, Stettin.

DEI: 2 Syntypen, Sustenpaß.

lucens BATES, 1889 (*Lamprophonus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 7 (27), 102)

Mehrere Syntypen, Burma, Teinzo, leg. FEA, in Coll. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Birmania, Teinzo, V. 1886, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

lucidissima BALIANI, 1932 (*Amara*)

(Mem. Soc. Ent. Ital. 11, 10–11, Taf. 1, Fig. 6)

1 ♂, 6 ♀♀, Syntypen, China Centrale, Tatsienlu-Chiulung, prov. di Szechuan, durch REITTER.

DEI: 1 Syntypus, China, Tatsienlu-Kiulung, durch REITTER.

lucidulum SCHAUM, 1857 (*Agonum*)

(Berl. Ent. Ztschr. 1, 138–139)

3 Syntypen, Griechenland, am Phalereus bei Athen.

DEI: 1 Syntypus, Attica, Coll. GERMAR-SCHAUM.

Syn. zu *extensem* MÉNÉTRIÉS, 1849.

lüdersi WAGNER, 1915 (*Dyschirius*)

(Ent. Mitt. 4, Nr. 10/12, 304–306, Fig. 1)

Mehrere Syntypen: Mark Brandenburg, am Ufer der Havel bei Caputh, Nieder-Neuendorf bei Salzbrunn, Papenberg, Schlachtensee, Paulsborn am Grunewaldsee, leg. WAGNER; Forsthaus Bredow bei Finkenkrug, Zeestow, Ziegeleien von Veiten und Birkenwerder, am Ufer der Briese, Briesental bei Birkenwerder, am Ufer der Oder bei Fürstenberg, leg. FREYMUTH, LÜDERS, MÜLLER, NERESHEIMER und WAGNER; Pankow, Tegel, Borgsdorf (Havel), Kolberg (Ostsee), leg. MÜLLER; im DEI.

DEI: 10 Ex. Mark Salzlöcher bei Salzbrunn; 24 Ex. Umgeb. Berlin, Bredow; 4 Ex. Mark, Umg. Beelitz; 5 Ex. Mark, Oder bei Fürstenberg; 1 Ex. Umg. Berlin, Schlachtensee, 1 Ex. Wannseegebiet, 1 Ex. dito. Griebnitzsee; 1 Ex. Mark, Havelufer bei Nd.-Neuendorf; leg. WAGNER; 2 Ex. Mark, Forst Bredow, in Coll. NERESHEIMER: Syntypen.

lunigera ANDREWES, 1926 (*Dolichoctis*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 18, 288–289)

Mehrere Ex. Sumatra, Gunong Singgalang, 6000 ft., leg. JACOBSON; 1 Ex. Medan, leg. MJÖBERG, im Museum Stockholm; Paratypen, Holotypus, im Britischen Museum.

DEI: 1 Paratypus, Sumatra's Westkust, Gunung Singgalang, 1800 m, 1925, leg. JACOBSON.

luntaka ANDREWES, 1924 (*Bembidium*)

(Miss. BABAUT, Prov. Centr. Inde, 75–76)

Mehrere Syntypen, Indien, occ. Himalaya, 1914: Ladack, Leh, Muhlbeck, Nuria; Cachemire, Baltal, Sonemarg; Kulu, Koty; Rukshu, Nima-Mud; Lahoul, Keiling, Sumdéo, Sisu, Zingzinbar.

DEI: 1 Syntypus, Ladack, Mulbeck (Fronte Thibet), Aout 1914, leg. BABAUT.

lutshnikianus BOGAČEV & KURNAKOV, 1958 (*Pterostichus*)

(Rev. d'Ent. de l'URSS, 37, 174, Fig. 4, 419, Taf. 1, 417)

♂ Holotypus, Berg Chalaca, leg. BOGAČEV, im Zool. Inst. Ad. W. der UdSSR; mehrere Paratypen dito., Roksker Pass/Osetien, leg. KURNAKOV.

DEI: 2 ♂♂, 1 ♀, Paratypen, jug. Rokskij, Ossetia, Cauc. centr., 11. VII. 1949, leg. KURNAKOV.

lutshnikianus ordinatoides KURNAKOV, 1958 (*Pterostichus*)

(l.c., 423, Taf. 1, 417)

Mehrere Syntypen: Mamisonsker Paß, leg. LUČNEK und KURNAKOV u. a.; Lechchumsker Kette (zwischen Dorf Glol und Osetinskier Heerstrasse), 1846, leg. CHAUDOIR; Paß Chal'madzara, leg. KURNAKOV.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen: Cauc. centr.; jug. Mamisson, 15. VII. 1949; 1 ♂, jug. Zchalmatsenara, mont Letschchumenses, 20. VII. 1949; leg. KURNAKOV.

maculatus STRANEO, 1949 (*Abacetus*)

(Bull. Inst. roy. Sc. nat. Belg. 25, nr. 21, 4)

♀ Holotypus, Cambodge, leg. VITALIS, im Istituto reale di Scienze naturali del Belgio; wahrscheinlich ist nach der Beschreibung 1 Paratypus im DEI.

DEI: 1 Paratypus, Kambodja.

maderensis WOLLASTON, 1854 (*Olisthopus*)

(Ins. Maderensis, 35, Tab. 1, Fig. 7)

Mehrere Syntypen, Madeira, unter Steinen im Gebirge, 2000' s. m., leg. WOLLASTON.

DEI: 5 Syntypen, Madeira, Coll. KRAATZ.

mahratta ANDREWES, 1929 (*Dyschirius*)

(Faun. Brit. Ind. Col. Carab., 392, 396)

Holotypus, Bombay, Belgaum, XII. 1886, leg. ANDREWES, in Coll. ANDREWES; 1 Ex. dito.; 2 Ex. Ceylon, Anuradhapura, 1899, leg. HORN, im DEI; Paratypen.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

mäklini POPPIUS, 1906 (*Cryobius*)(Acta Soc. Faun. Flora Fenn. 28 (1905–06), nr. 5, 22, 113–115; nom. praeocc. = *jenisseicus* CSIKI, 1930, in JUNE & SCHENKLING, Cat. Col. 2, 654)

Mehrere Syntypen, Nord-Sibirien, westl. vom Jenissej-Gebiet bis zum Lena-Gebiet, Fl. Jenissej: Sopotschnaja Korga!, (71° 40' n. Br.), (STUXBERG, im Mus. Helsingf.); Taimyr-Halbinsel!, (BIRULJA, Mus. P:burg); Fl. Olenek: Tundra am Flusse Kolymakala!, 16. VIII. 1876; Abhänge des Flusses Tschonkogor!, 31. VII.–1. VIII. 1876; am Flusse Alykan!, 4.–5. VIII. 1876; Tundra bei Tyria!, 6.–7. VIII. 1876; Alakitl, 4. VIII. 1876; Kolby!, 11.–12. VIII. 1876, (CZEKANOWSKI, Mus. P:burg); Fl. Lena: Insel Tit-ary!, (ca. 72° n. Br.), 4. IX. 1901, (ipse, Mus. Helsingf.); Ajakitl, 29.–30. VIII. 1876 (CZEKANOWSKI, Mus. P:burg); Kypsaraj!, 9. IX.; Bulun!, 2. IX.; Durnoj!, 12. IX.; Buru! 26. VIII.; südl. bei Nachim-haja!, (ca. 66° 40'), 3. VIII. 1901, (ipse, Mus. Helsingf.).
DEI: 1 Syntypus, Ust Aldan, Lena med., leg. POPPIUS, Coll. LEONHARD, Mus. Zool. H:fors.

makolskii ROUBAL, 1935 (*Agonum*)

(Fol. Zool. Hydrob. 8, 276–277, Fig. 2)

Mehrere Syntypen, Slovakia meridionalis, Rossia subcarpathica, leg. ROUBAL, in Coll. MAKÓLSKI-VARSOVIE und Coll. ROUBAL.

DEI: 1 Syntypus, Slov., Ipel, Kiarov, IV. 1928, leg. ROUBAL.

makolskii MÜLLER, 1934 (*Dyschirius*)

(Koleopter. Rundsch. 20, 54)

Mehrere Syntypen, Polen, Goclawek bei Warschau, VI., VIII. 1931, leg. MAKOLSKI.

DEI: 3 Syntypen, Warszawa, Goclawek, leg. MAKOLSKI.

mandarina BALIANI, 1932 (*Amara*)

(Mem. Soc. Ent. Ital. 11, 15–16, Taf. 2, Fig. 11)

17 ♂♂, 26 ♀♀, Syntypen, China centrale, Tatsienlu-Chiulung prov. dl Szechuan, durch REITTER.

DEI: 1 Syntypus, China, Tatsienlu Kiulung, durch REITTER.

mandli JEDLIČKA, 1933 (*Agonum*)

(Ent. Nachr. 7, 86–87)

Holotypus, Sibiria or., Sutsch'an-Ussuri, 1 Ex. Wladiwostok, 1 Ex. Sotkagora, in Coll. JEDLIČKA; 3 Ex. Nikolsk Ussurijsk, in Coll. MANDL; Paratypen.

DEI: 4 Paratypen, Ussurigeb., Nikolsk Ussurijsk, leg. MANDL.

mandli NETOLITZKY, 1932 (*Bembidium*)

(Coleopt. Centrabil. 6, 2–3)

Holotypus, Tschita, leg. FRIEB; mehrere Paratypen; Werchne-Udinsk, leg. MANDL, Nikolsk-Ussurigeb., leg. MANDL; Ussuri, Kassakewitsch, leg. KORB, Tipolti, Baikal, leg. MÜLLER, Sutsch'an, Ussuri, Coll. STAUDINGER, Krasnaja Rietschka bei Chabarowsk, leg. BABYI, Tibet, Kuku-Nor, 3200 m, Coll. HAUSER, Peking, 1898, Coll. PLASON.
DEI: 1 Paratypus, Trsbalkal, Werchne-Udinsk, leg. MANDL.

mandli JEDLIČKA, 1963 (*Graniger*)

(Sitzungsber. Österr. Akad. Wiss., Mathem.-naturw. Kl., Abt. 1, 172, Bd. 3, 173–174, Fig. 5)

Holotypus, 3 Paratypen, Iran, Uferwiesen der Dschas-Morian-Senke, durch LÖFFLER, Iran-Exped. 1949/50.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 31. III. 1950.

mandschuricus JEDLIČKA, 1942 (*Anisodactylus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 9, 11)

♂ Holotypus, Mandschukuo, Charbin; im DEI [Manshukuo, 15. VIII. 1939, leg. ALIN].

mařani JEDLIČKA, 1932 (*Tachys*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 29, 81)

Holotypus, Formosa, Kankau, Exped. SAUTER; im DEI [Koshun, 2. IX.]

margellanicus KRAATZ, 1884 (*Craspedonotus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 28, 1, 229)

Mehrere Syntypen, Turkestan, Margellan.

DEI: 4 Syntypen, Margelan, Coll. KRAATZ.

[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Margellan“ steht auf dem Etikett „Margelan“.]

marginalis SCHAUM, 1862 (*Trechus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 6, 264)

Mehrere Syntypen, Siebenbürgen, Banat, durch HAMPE und FRIVALDSKY.
DEI: 2 Syntypen, Banat, Coll. SCHAUM.

marginicollis REITTER, 1891 (*Acupalpus*)

(Wien. Ent. Ztg. 10, 221–222)

Mehrere Syntypen, Rußland, Syr-Daria, leg. WITTBERG.
DEI: 1 Syntypus, Turkestan, Coll. KRAATZ.

matchai JEDLIČKA, 1929 (*Duvalites*)

(Ent. Nachrichtenbl. 3, 14–15)

22 Syntypen, Karpathen, Hoverla, leg. MATCHA, in Coll. JEDLIČKA.
DEI: 1 Syntypus, Carp. orient., Hoverla, VII. 1922, leg. MATCHA.

melanostolus BROOKES, 1926 (*Pterostichus*)

(Trans. Proc. New Zealand Inst. 56, 443)

Holotypus, 5 Paratypen, New Zealand, Waitati, nahe Dunedin, in Coll. BROOKES.

DEI: 1 Paratypus, Waitati Hills, Dunedin, 12. IX. 1926, Coll. CLAAKE, Nr. 4326.

melanoticum WAGNER, 1915 (*Bembidium*)

(Ent. Mitt. 4, Nr. 10/12, 306—307)

Mehrere Syntypen, Mark Brandenburg, zwischen Finkenkrug und Nauen, Brieselang, leg. MÜLLER, DORMEYER, LÜDERS, NERESHEIMER und WAGNER.

DEI: 1 Ex. Umgeb. Berlin, Brieselang, leg. WAGNER; 1 Ex. Brieselang bei Nauen, IX. 1915; 2 Ex. Mark Umgeb. Brieselang, Coll. NERESHEIMER: Syntypen.

Syn. zu *littoralis* OLIVIER, 1791.***melzeri*** LIEBKE, 1934 (*Calleida*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 1, 279—280)

2 Syntypen, Brasilien, S. Paulo, leg. MUUS und MELZER; im DEI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

merditana APFELBECK, 1906 (*Nebria*)

(Sitz. Berl. Acad. Wiss. Wien 1, 115, 1664)

Mehrere Syntypen, Albanien, Merdita, in den Hochgebirgen bei Fandi: Munela und Zebia, 1905.

Lectotypenfestlegung durch MLYNÁČ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Merdita, Zebia, Coll. FRANKLIN MÜLLER, 1 Ex. Merdita, durch SCHEIT: Paralectotypen.

meuseli REITTER, 1910 (*Trechus*)

(Wien. Ent. Ztg. 29, 163)

Mehrere Syntypen, Südskroatien (Lika) bei Stirovača, Dundovici, 14., 20. VI. 1910, 1100 m Höhe, leg. MEUSEL.

DEI: 3 Syntypen, Croatia, Dundovici, 20. VI. 1910, 1412 m, leg. MEUSEL, Coll. FRANKLIN MÜLLER.

Syn. zu *priapus* DANIEL, 1902—03.***meyeri*** JEDLIČKA, 1935 (*Stenolophus*)

(Čas. Čs. Spol. Ent. 32, 114)

Holotypus, Yunnan, Valls flumin.-Solingho, in Coll. JEDLIČKA; 1 Ex. dto., in Coll. MEYER in Darmstadt; 13 Ex. Yunnan, in Coll. ANDREWES und im DEI: Paratypen.

DEI: 2 Paratypen, Yunnan fou.

micanus SCHAUM, 1860 (*Trechus*)(Nat. Ins. Deutschl. Col. 1, 1 (1956—60), 644; nom. praeocc. = *splendens* GEMMINGER & HAROLD, 1868, Cat. Col. 1, 394)

Mehrere Syntypen; bei Glatz, leg. ZEBE; Schlesien, leg. LETZNER; Steiermark, leg. MILLER.

DEI: 2 Ex. Silesia, Karlsbrunn; 1 Ex. Styria; Coll. SCHAUM: Syntypen.

micranguulus REITTER, 1913 (*Trechus*)

(Ent. Bl. 9, 174)

♀ Holotypus, Chinesisch Thian-Schan, leg. v. BODEMEYER; im DEI [Coll. LEONHARD].

micrautax ANDREWES, 1924 (*Tachys*)

(Rec. Ind. Mus. 26, 115—116)

15 Ex. Assam, Garo Hills, Siju Cave, 300—400 ft., leg. KEMP und CHOPRA, im Indischen Museum; mehrere Ex. Sikkim, Gopaldhara, leg. STEVENS; 1 Ex. Kumaon, Chakrata Dist., Chulli Khud, 6500 ft., leg. CHATTERJEE, im Forest Res. Ins.; Paratypen, Holotypus in Coll. ANDREWES.

DEI: 6 Paratypen, Br. Sikkim, Gopaldhara, leg. STEVENS.

micros SCHAUBERGER, 1938 (*Oxycentrus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 5, 37—38)

Holotypus, Celebes, Coll. KRAATZ, im DEI.

millieri kultti FASSATI, 1942 (*Bembidion*)

(Čas. Čs. Spol. Ent. 39, 121—123, Fig.)

Syntypen: mehrere Ex. Bohemia, Semily, loc. class.; 1 Ex. Nové Hrady, leg. BENDL; 1 Ex. Polonia, Kazimierz.

DEI: 1 Ex. Semily, 12. IX. 1942, 1 Ex. dto. Bohemia sept.: Syntypen.

mirabilis BATES, 1892 (*Catascopus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 409)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Asciuii Chebà, alt. 1200—1300 m; Karin Chebà, alt. 900—1100 m; leg. FEA.

DEI: 2 Ex. Carin, Asciuii Chebà, 1200—1300 m, I. 1888, 1 Ex. Carin Chebà, 900—1100 m, V. XII. 1888; leg. FEA: Syntypen.

mirandus DUPUIS, 1913 (*Tachys*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 57, 170—174)

Mehrere Syntypen, Formosa, Akau, leg. SAUTER.

DEI: 6 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, XII. 1907.

Syn. zu *ovatus* MOTSCHULSKY, 1851.***miridita jacupicensis*** JEDLIČKA, 1935 (*Tapinopterus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 2, 187)

♀ Holotypus, seb. Jacupica planina, leg. RAMBOUSEK, ex Coll. LEONHARD; im DEI (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).

***modestus* KRAATZ, 1876 (*Procerus*)**

(Bull. Soc. Nat. Moscou 51, 132, 137–138, Taf. 1, Fig. 10, 12)

Mehrere Syntypen, Amasia, leg. KINDERMANN und STAUDINGER, in Coll. KRAATZ, KINDERMANN und STAUDINGER.
 DEI: 2 Ex. Amasia, Coll. KRAATZ; 8 Ex. ohne Fundort, Coll. KRAATZ.
 Syn. zu *scabrosus* OLIVIER, 1795.

***modigliani* ANDREWES, 1929 (*Colpodes*)**

(Ann. Mus. Genova 53, 434–435)

Syntypen, Sumatra: 1 Ex. Lubu Selassi, 1878, leg. BECCARI; 4 Ex. Si-Rambé, XII. 1890–III. 1891, leg. MODIGLIANI; 1 Ex. Mount Dempo, 4000 ft., leg. BROOKS, im Britischen Museum; im Museum Genoa und im DEI.
 DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Si-Rambé, XII. 1890–III. 1891, leg. MODIGLIANI, Coll. KRAATZ.

***monastirensis* REITTER, 1913 (*Tapinopterus*)**

(Ent. Bl. 9, 26)

Mehrere Syntypen, Monastir, Mazedonisches Hochgebirge, leg. WERNER.
 DEI: 1 Syntypus (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).

***montanellus* POPPIUS, 1907 (*Pterostichus*)**

(Wien. Ent. Ztg. 26, 21–22)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Nord-Amerika, White Mountains, in Coll. v. HEYDEN.
 DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***montoroi* TREMOLERAS, 1931 (*Lachnophorus*)**

(Rev. Soc. Ent. Argent. 3, 247–248)

Holotypus und mehrere Ex. Uruguay, Flores, Costa del Yi, Estancia „La Criolla“, 20. I. 1929; mehrere Ex. Florida, Yi y Timote, 15. I. 1930; in Coll. TREMOLERAS, Paratypen.
 DEI: 2 Paratypen, Flores, Costa del Yi, 20. I. 1929, A. Montoro, durch GUARCH.

***morio serbicus* WINKLER, 1933 (*Omphreus*)**

(Koleopter. Rundsch. 19, 117)

Mehrere Syntypen, Südwest-Serbien, Murtenica-planina, VI. 1923, leg. JEANNEL, MAGDELAINE und WINKLER.
 DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Serbie occidentale, dép. d'Užice.

***multisetosus* BÄNNINGER, 1941 (*Scarites*)**

(Ent. Bl. 37, 67)

Holotypus, Espírito Santo, im DEI (Geschlecht nicht bestimmbar, da Abdominalinhalt zerstört); [X. 1920–II. 1921, Coll. HOFFMANN, Arp. dedic. 1921].

***munda* ANDREWES, 1923 (*Cymindoidea*)**

(Spol. Zeyl. 12, 247–248)

Holotypus, India, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES, in Coll. ANDREWES; 2 Paratypen, Ceylon, Bandarawela, leg. HORN; im DEI.
 DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1899.

***mus* ANDREWES, 1925 (*Tachys*)**

(Ann. Mus. Genova 51, 380–381)

2 Syntypen, Java, Batavia, im Buitenzorg Museum.
 DEI: 1 Syntypus, Batavia, III. 1921, ex Museo Buitenzorg.

***mustela* ANDREWES, 1923 (*Clivina*)**

(Spol. Zeyl. 12, 226–227)

Holotypus, 1 Paratypus, Ceylon, Anuradhapura, leg. HORN, in Coll. ANDREWES und im DEI.
 DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1899.

***nannodes* ANDREWES, 1925 (*Tachys*)**

(Ann. Mus. Genova 51, 406, 447)

Mehrere Syntypen, Bombay, Belgaum; Madras, Nilgiri Hills, 3500 ft., leg. ANDREWES.
 DEI: 1 Syntypus, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES.

***nepalensis* MANDL, 1965 (*Carabus*)**

(Erg. Forsch.-Untern. Nepal Himalaya, Lieg. 2, 79)

♂ Holotypus, Thodung, 3100 m, 25.–30. V. 1961, leg. EBERT; mehrere Ex. dto.; mehrere Ex. Ting-Sang-La, 3800 m, 6., 7. V. 1962, leg. EBERT; in der Zoologischen Sammlung des Bayerischen Staates und in Coll. MANDL; Paratypen.
 DEI: 2 Paratypen, Nepal, Ting-Sang-La, 3800 m, 6., 7. V. 1962, leg. EBERT.

***neresheimeri* MÜLLER, 1929 (*Bembidion*)**

(Coleopt. Centralbl. 4, 101–102, Fig. 2)

Mehrere Syntypen, Mark, Gr. Machnow, 1929, leg. NERESHEIMER.
 DEI: 1 Syntypus, Mark, Umgeb. Gr. Machnow, Coll. NERESHEIMER.

***neresheimeri* WAGNER, 1915 (*Dyschirius*)**

(Ent. Mitt. 4, 241, 301, Fig. 1b, 2b)

Mehrere Syntypen, Forsthaus Bredow bei Finkenkrug, Ziegelei bei Birkenwerder, leg. FREYMUTH, LÜDERS, NERESHEIMER und WAGNER; zwischen Nauen und Brieselang, leg. MÜLLER.
 DEI: 10 Ex. Umgeb. Berlin, Bredow, Brieselang; 1 Ex. Mark, Ziegeleien bei Birkenwerder; leg. WAGNER; 2 Ex. Mark, Forst Bredow, Coll. NERESHEIMER: Syntypen.

nevermanni LIEBKE, 1930 (*Calophaena*)

(Mitt. Zool. Mus. Berlin 15, 677, 714, Fig. 53)

Syntypen, Costarica: 1 Ex. Las Mercedes, Sta. Clara, 200–300 m, I. 1921; 6 Ex. Farm „Hamburg“ am Reventazon, Ebene Limon, 15. IX., 24. IV. 1924/6. XI. 1925/3. VI., 28. VII. 1926/26. III. 1928; leg. NEVERMANN, in Coll. NEVERMANN.
DEI: 1 Syntypus, Costa Rica, Hamburgfarm, Reventazon, Ebene Limon, 3. VI. 1926, leg. NEVERMANN.

nevermanni DARLINGTON, 1934 (*Tachys*)

(Occ. Pap. Boston Soc. Nat. Hist. 8, 160–161)

Holotypus, M.C.Z. no. 19.629 und 28 Ex., Costa Rica, Hamburg Farm, near Port Limon, 25. III. 1928; 3 Ex. dto. 9. II., 5. V., VII. 1925; leg. NEVERMANN, in M.C.Z. und Coll. NEVERMANN; Paratypen.
DEI: 5 Paratypen, Costa Rica, Hamburgfarm, Reventazon Ebene Limon, 25. III. 1928, leg. NEVERMANN.

nietneri SCHAUM, 1863 (*Tachys*)

(Berl. Ent. Ztschr. 7, 88)

Mehrere Syntypen, Ins. Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: Syntypen: 1 Ex. Ceylon, 1 Ex. Banda, Coll. GERMAR-SCHAUM.

Syn. zu *umbrosus* MOTSCHULSKY, 1851.*nigellus laticeps* EMDEN, 1936 (*Colpodes*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 273–275)

Holotypus, 9 Paratypen, Java, Nongkodjadjar, in Coll. v. EMDEN, Coll. ANDREWES und im DEI.

DEI: 1 Paratypus, O.-Java, Tengger, Nongkodjadjar, 1300 m, leg. WEGENER, Gesch. VII. 1935 von OVERBECK.

niger KRAATZ, 1886 (*Eutelocarabus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 30, 263)

Mehrere Syntypen, Suyfun-Mündung, leg. DÖRRIES, Amur, leg. CHRISTOPH; via STAUDINGER an KRAATZ.

DEI: 2 Ex. Suyfun, 1 Ex. Amur; Coll. KRAATZ: Syntypen.

Syn. zu *billbergi* MANNHEIMER, 1827.*nigriceps* STURM, 1824 (*Platysma*)

(Deutschl. Fauna, Insekta. 5, 84–85, Taf. 117, Fig. c, C)

Mehrere Syntypen, im Prater bei Wien, leg. MEGERLE VON MÜHLFELD.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. GERMAR-SCHAUM.

Syn. zu *strenuus* PANZER, 1797.*nigritulus* KRAATZ, 1876 (*Procerus*)

(Bull. Soc. Nat. Moscou 51, 139, 144)

2 Syntypen, Landenge von Arabad, via SCHMIDT an KRAATZ.

DEI: 1 Syntypus, Landenge Arabat (nicht Arabad!), Coll. KRAATZ.

nigrocyaneum WAGNER, 1916 (*Bembidium*)

(Ent. Mitt. 5, 223)

Mehrere Syntypen, Brieselang bei Finkenkrug, VII., VIII., leg. LÜDERS, MÜLLER, NERESHEIMER und WAGNER.

DEI: 2 Syntypen, Mark, Umgebung Brieselang, Coll. NERESHEIMER.

Syn. zu *varium* OLIVIER, 1795.*nita* ANDREWES, 1924 (*Amara*)

(Miss. BABault, Prov. Centr. Inde, 96, Taf. 3, Fig. 2)

Mehrere Ex. Indien, occ. Himalaya, Spiti, Manikarn, Tchary-Djoni, Pulga, Tsho-ti, Kulu, Kaadi, Koty, Bajaura, Kangra dist., leg. BABault; 1 Ex. Dehra Dun, Mundali, 9000 ft., leg. TYTLER, im Indischen Museum; 1 Ex. Chamba, leg. SOMERS-SMITH, 1914: Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, Indes, Angl., Spiti, Tchary-Djoni, VI. 1914, leg. BABault.

nilgiricus ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova (1923–25) 51, 446)

Mehrere Syntypen; Madras, Nilgiri Hills, Bhavani Valley, 1500 ft., Kallar, 1000 ft.; South Mysore, Teppukadu; leg. ANDREWES.

DEI: 1 Syntypus, South Mysore, Teppukadu, leg. ANDREWES.

nitescens SLOANE, 1907 (*Lesticus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 470–471)

♀ Holotypus, New Guinea, Simbang; mehrere Paratypen, Gazelle Peninsula, Herbertshöhe; leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN.

DEI: ♀ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. v. BENNIGSEN.

nitidus BATES, 1892 (*Sinurus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 407)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Chebà, alt. 900–1100 m; Asciuui Chebà, 1200–1300 m; Karin Ghecù, 1300–1400 m; leg. FEA.

DEI: 2 Syntypen, Carin Chebà, V. XII. 1888, 900–1100 m, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

noguchii BATES, 1873 (*Chlaenius*)

(Trans. Ent. Soc. London, 251–252)

Mehrere Syntypen, Japan, Kawachi, leg. LEWIS, in Coll. LEWIS.

DEI: 1 Syntypus, Japan, Kawachi, Coll. v. HEYDEN.

notatum ANDREWES, 1922 (*Bembidium*)
(Ent. Monthly Mag. (3) 8 (58), 175–176)

Holotypus, mehrere Paratypen, United Provinces, Kumaon, Upper Gumti Valley, W. Almora, leg. CHAMPION, Binsar, 7700 ft., leg. IMMS, im Britischen Museum und For. Res. Inst.; Bihar, Pusa, leg. CAMERON, im For. Res. Inst. und Agric. Res. Inst.
DEI: 1 Paratypus, India, H.G.C., W. Almora, Kumaon, U.P.

notulatus DEJEAN, 1826 (*Panageus*)

(Spec. gen. Col. 2, 291–292; nom. praeocc. = *tenuipunctatus* LAFERTÉ, 1851, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) 9, 221)

Mehrere Syntypen, Cap de Bonne-Espérance, durch SCHÜPPEL.
DEI: 1 Syntypus, Afr. austr.

nuristanicus JEDLIČKA, 1956 (*Chlaenius*)

(Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 30 (1955), Nr. 452, 194)

9 Ex. Afghanistan, Nuristan, Bashgultal, 2 Ex. Pagmangebirge, Exped. KLAPPERICH, 1952–1953, Holotypus und Paratypen, in Coll. KLAPPERICH und Coll. JEDLIČKA.
DEI: 1 Paratypus, Afghanistan, Bashgultal, 1100 m, Nuristan, 11. IV. 1953, leg. KLAPPERICH.

nuristanicus JEDLIČKA, 1956 (*Harpalus*)

(l.c., 195)

Afghanistan, Nuristan: 8 Ex. Bashgultal, 1 Ex. Asmar; Exped. KLAPPERICH, 1952–1953, Holotypus und Paratypen, in Coll. KLAPPERICH und Coll. JEDLIČKA.
DEI: 1 Paratypus, Afghanistan, Bashgultal, Nuristan, 1200 m, 3. V. 1953, leg. KLAPPERICH.

nyassicus bliningeri BASILEWSKY, 1932 (*Tefflus*)

(Ent. Bl. 28, 25)

♂ Holotypus, N.E. Congo, leg. GRAUER; im DEI.

nyassicus schaubergeri BASILEWSKY, 1932 (*Tefflus*)

(l.c., 24)

♂ Holotypus, Angola, Bengwella, leg. v. BENNIGSEN; im DEI.

obenbergeri JEDLIČKA, 1928 (*Harpalus*)

(Wien. Ent. Ztg. 45, 95)

♀ Holotypus, Baical; im DEI [Coll. FRANKLIN MÜLLER-Coll. WEISE].

oberthürri GESTRO, 1892 (*Omophron*)

(Ann. Mus. Genova (2) 10 (30), 962–963)

2 Syntypen, Pedong, nel Sikkim, a 45 miglia inglese a NNE di Dargiling, leg. DESGODINS, im Museum Civico.
DEI: 2 Syntypen, Pedong, leg. DESGODINS, Coll. BATES-Coll. v. HEYDEN.

obliquebasalis BREIT, 1914 (*Trechus*)

(Koleopter. Rundsch. 3, 165–166)

Mehrere Syntypen, Chinesisch-Turkestan, Aksu, durch STAUDINGER & BANG-HAAS.

DEI: 5 Ex. Chin. Turkest., Aksu Thal, Coll. LEONHARD; 2 Ex. Thianshan, Aksu Thal, Coll. STAUDINGER & BANG-HAAS;
Syntypen.

Syn. zu *dichrous* REITTER, 1911.

obtusangulus cabulensis MLYNAŘ (1975?) (*Molops*)

(soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden)

DEI: 1 ♂, 2 ♀, Cabulja, Reis. 1906, Coll. F. MÜLLER; 1 ♂, dto. Marzebrina, leg. HENSCH, Coll. v. HEYDEN; Paratypen.

obtusangulus mendax APPFELBECK, 1902 (*Molops*)

(Glaes. Zem. Muz. Bosn.-Herz. 14, 544–545)

Mehrere Syntypen, südwestl. Bosnien, Vranica pl., Vakufa Berge.

Lectotypenfestlegung durch MLYNAŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).

DEI: 1 ♂, Paralectotypus, Vranica pl., 1902, leg. APPFELBECK, Coll. FRANKLIN MÜLLER.

occultus SLOANE, 1907 (*Chlaenius*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 467)

Mehrere Syntypen, New Guinea, Herbertshöhe, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN.

DEI: 2 Syntypen, D.N. Guinea, Herbertshöhe, Coll. KRAATZ.

ochrias ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova 51, 376–377)

Mehrere Syntypen: Eastern Duars, leg. STEVENS; Kumaon, West Almora, Tanakpur, River Sarda Gorge, Haldwani-Nandhaur River; leg. CHAMPION; Mussoorie, 6500 ft., Dehra Dun, leg. CAMERON und CHATTERJEE, im For. Res. Inst.; Burma, Moulinmein, leg. FIEBER, im Vienna Mus.

DEI: 1 Syntypus, E. Dooars, leg. STEVENS.

[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Eastern Duars“ steht auf dem Etikett „E. Dooars“.]

oertzeni KRAATZ, 1886 (*Elasmopterus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 30, 431–432)

Holotypus, Griechenland, Parnassus, leg. v. OERTZEN; im DEI (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).

opacus SCHMIDT-GÖBEL, 1846 (*Orthogonius*)

(Faun. Col. Birmaniae, 60—61)

Holotypus, Birma; im DEI (Ex. wurde an LIEBKE, Hamburg verliehen und ist dort 1943 vernichtet worden).

opacus KRAATZ, 1895 (*Tropidocarabus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 367—368)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Südabhang des Himalaya, Rādjawar, leg. KLAEGER; im DEI [Kaschmir, Radjavar, Coll. KRAATZ].
Syn. zu *dardielius* BATES, 1889.

opalescens ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova (1923—25), 51, 342, 352)

Holotypus, mehrere Paratypen, Ceylon, Negombo, leg. HORN; in Coll. ANDREWES, im Museum Brüssel und DEI.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1899.

orientalis DANIEL, 1900 (*Lionychus*)

(Soc. ent. 15, 139)

Mehrere Syntypen, Taurus cilicus, leg. v. BODEMEYER.

DEI: 1 Syntypus, Asia minor, Bulghar Maaden, leg. v. BODEMEYER.

ottomanus APFELBECK, 1908 (*Pterostichus*)

(Akad. Anz. Wien 1, 2 (Separatabdruck))

Mehrere Syntypen, Ostalbanien, Schar-Dagh, 1906.

DEI: 1 Syntypus, Schar Dagh, Ljuboten, Coll. FRANKLIN MÜLLER.

ottonis REITTER, 1905 (*Anophthalmus*)

(Wien. Ent. Ztg. 24, 311)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Bosnien, in der trockenen Höhle zwischen Volujak Lebešnik, leg. LEONHARD.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Bosnien, Lebešnik, trockene Höhle, Coll. LEONHARD.

ovalipennis LIEBKE, 1934 (*Styphlomerus*)

(Mem. Soc. Ent. Belg. 24, 58—59)

Ost-Afrika: Holotypus, Ussandani bei Kwa (kathol. Missions-Anstalt), II. 1912, leg. OBST, Ost-Afrika-Expedition der Hamburgerischen Geographischen Gesellschaft, im Museum Hamburg; 1 Ex. Djibuti, Somaliland, 4 Ex. Deutsch-Ost-Afrika, ex Coll. LANGENHAN, im Museum Dresden; 10 Ex. Nordwest-Rhodesien, Mwenga, leg. DOLLMANN, 2 Ex. Nyassa-See, leg. NEAVE, 1 Ex. Nordost-Rhodesien, leg. NEAVE, 1 Ex. Deutsch-Ost-Afrika, leg. CARPENTIER; im Britischen Museum; 2 Ex. bez. Deutsch-Ost-Afrika, leg. METTLER, 2 Ex. Deutsch-Ost-Afrika, Kilwa, 9.—11. VI. 1908, leg. FROMM; im Museum Berlin; 1 Ex. Katanga, im Kongo-Museum, Tervueren, 1 Ex. Usambara; leg. WEISE, im DEI; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Usambara, leg. WEISE, Coll. KRAATZ.

overbecki EMDEN, 1936 (*Colpodes*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 269—270)

Java, Nongkodjadjar: 3 Ex. 25. XI. 1933, 5 Ex. 12. III. 1934, 1 Ex. 14. III. 1934, 28 Ex. 15. III. 1934, 1 Ex. Tengger, 19. IX. 1920, leg. H. D. V. L., im Museum Buitenzorg; Holotypus, in Coll. v. EMDEN, Paratypen, dto., in Coll. ANDREWES und im DEI.

DEI: 2 Paratypen, O.-Java, Tengger, Nongkodjadjar, 1300 m, 15. III. 1934, leg. WEGENER, Gesch. VII. 1934 von OVERBECK.

overbecki EMDEN, 1936 (*Lesticus*)

(l.c., 277—279)

Holotypus, mehrere Paratypen, Java, Nongkodjadjar, 12. III. 1935, in Coll. v. EMDEN, Coll. ANDREWES, Coll. OBERTHÜR, im Museum Dresden und DEI.
DEI: 4 Paratypen, O.-Java, Tengger, Nongkodjadjar, 1300 m, 12. III. 1934 (nicht 1935!), leg. WEGENER, Gesch. VII. 1935 von OVERBECK.

ovipennis latiusculus KRAATZ, 1879 (*Molops*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 23, 154)

2 ♀♀, Syntypen, Croatia, Svica, leg. v. HEYDEN.

Lectotypenfestlegung durch MLYNAŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).

DEI: ♀ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. KRAATZ, Coll. v. HEYDEN.

ovipennis pseudoplanipennis MLYNAŘ (1975?) (*Molops*)

(soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).

DEI: ♂ Holotypus, 4 ♂♂, 1 ♀, Paratypen, Croatia, Plitvice, 10. VIII. 1935, durch LIEBMANN, Coll. LIEBMANN, Coll. KRAATZ, Coll. v. HEYDEN.

oxygonus meridionalis EMDEN, 1949 (*Brachygynathus*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (12) 11, 868—869, Fig. 6)

Holotypus, 2 Paratypen, Paraguay, 1885, leg. DRAKE; im DEI [Coll. KRAATZ].

paganettii BREIT, 1923 (*Pterostichus*)

(Koleopter. Rundsch. 10, 144—146)

Mehrere Syntypen, Griechenland, Parnassos, leg. PAGANETTI-HUMMLER.

DEI: 1 Syntypus (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).

paganettii MÜLLER, 1911 (*Scotodiphus*)

(Soc. Ent. 29, 61)

Holotypus, Süd-Dalmatien, Krivošije, leg. PAGANETTI-HUMMLER, in Coll. MÜLLER.

(Laut Originalbeschreibung lag dem Autor nur 1 Ex. aus einer Serie vor.)

DEI: Holotypus, Krivošije, leg. PAGANETTI, Coll. LEONHARD.

pakistanus JEDLIČKA, 1963 (*Mastax*)

(Opusc. Zool., no. 68, 7, Fig. 10)

Holotypus, 31 Paratypen, West Pakistan, Umg. Rawalpindi, leg. LINDEMANN, in der Sammlung des Bayerischen Staates München und in Coll. JEDLIČKA.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 20 km, O., 15. XII. 1955.

pala LIEBKЕ, 1937 (*Agra*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 4, 157–158, Fig. 1)

2 ♂♂, Syntypen, Peru, Callanga, in Coll. HORN und im DEI.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Peru, Callanga, Coll. KRAATZ.

pallida LIEBKЕ, 1937 (*Agra*)

(l.c., 159–160, Fig. 3)

♂ Holotypus, 1 ♂, Brasilien, Sta. Catharina, aus Lages, I.–III. 1887, leg. FRUHSTORFER, im Hamburger Museum; 1 ♀, Sta. Catharina, im DEI; Paratypen.

DEI: 1 ♀, Paratypus, St. Catharina, Coll. KRAATZ.

pandora HOLDHAUS, 1924 (*Reicheia*)

(L'Abeille 32, 173, 208–209)

Mehrere Syntypen, Sardinien, Dorgali, leg. DODERO.

DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, V. 1910, Coll. LEONHARD.

paradoxus APFELBECK, 1908 (*Paradictomerus*)

(Akad. Anz. Wien 1, 1 (Separatabdruck))

Mehrere Syntypen, Ostalbanien, Schar-Dagh, 1906.

DEI: 1 Syntypus, Serb. Šar. pi. alpin, 7.–14., leg. RAMBOUSEK.

parnassicus BREIT, 1923 (*Scotodiphus*)

(Koleopter. Rundsch. 10, 143–144)

Mehrere Syntypen, Griechenland, Parnassos.

DEI: 4 Syntypen, Graecia, Parnassos, Coll. LEONHARD.

parreyssi KRAATZ, 1875 (*Molops*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 19, 373–374)

Mehrere Syntypen: Balkan, Rhilo Dagh; Montenegro, leg. ERBER; Dalmatien, leg. PARREYSS; in Coll. KRAATZ und Coll. V. HEYDEN. Lectotypenfestlegung durch MLYNÁŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, Nr. 39, veröffentlicht werden).

DEI: Lectotypus, Montenegro, leg. ERBER; 1 Ex. Dalmatien, leg. PARREYSS, 1 Ex. Dalmatien, Coll. KRAATZ: Paralectotypen.

parvicollis WINKLER, 1926 (*Neotrechus*)

(Koleopter. Rundsch. 12, 91)

Mehrere Syntypen, nordwestlich Trebinje, im Schacht bei Tukalska Bjelina, leg. WEIRATHER.

DEI: 1 Syntypus, Tukalska, Bjelina.

parvulus STRANEO, 1952 (*Metius*)

(Doriana 1, no. 28, 6)

Holotypus, 17 Paratypen, Bolivia, reg. Cochabamba, Massiccio di Tunari, 4000 m, leg. ZISCHKA, im Museum Genova.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, REITTER.

patruelis PUTZEY, 1847 (*Trechus*)

(Stett. Ent. Ztg. 8, 310)

♀ Holotypus, Carinthia, Mus. SCHAUM; im DEI.

Syn. zu *glacialis* HEER, 1837.

pearsoni ANDREWES, 1923 (*Gnophodes*)

(Spol. Zeyl. 12, 244–245)

1 ♂, Ceylon, Hakgala, im Colombo Museum, 2 ♂♂, 1 ♀, Horton Plains, leg. HORN, im DEI; 1 ♀, Ceylon, leg. THWAITES, im Oxford Museum; Paratypen, Holotypus, in Coll. ANDREWES.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, Ceylon, Horton Plains, 1899, leg. HORN.

peccata LIEBKЕ, 1940 (*Agra*)

(Fol. Zool. Hydrobiol. 10, 254, 257, Fig. 47, 88, 163–164)

Syntypen: 1 ♂, Paraguay, 1 ♀, Argentinien, Tucuman, leg. BRUCH, in Coll. LIEBKЕ; 2 ♀♀, Paraguay, Hohenau, leg. JACOB; im DEI.

DEI: 1 ♀, Syntypus, Paraguay, Hohenau, 17. XI. 1935, leg. JACOB.

peleum JEDLIČKA, 1933 (*Bembidion*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 30, 10 (Separatabdruck))

Holotypus, 57 Paratypen, China, Prov. Szetschuan-Tatsienlu, in Coll. JEDLIČKA, Coll. REITTER, Coll. ANDREWES und Coll. NETOLITZKY.

DEI: 4 Paratypen, China, Szechuan, Yülling Süd, Tatsienlu.

pentheri APFELBECK, 1918 (*Pterostichus*)

(Sitz. Akad. Wiss. Wien 127, 1, 166)

Mehrere Syntypen, nordalbanisch-montenegrinisches Grenzgebiet, Prokletijagebiet, in der Gegend von Vunšay, 1000–2000 m, 13.–16., 17.–22. VII. 1914, leg. PENTHER.

DEI: Syntypen: 1 Ex. Prokletija, Alban. montenegr. Grenze, 1 Ex. N-alban-alpen; leg. PENTHER, Coll. LEONHARD.

pantheri pseudonarentinus MLYNÁŘ (1975?) (*Molops*)

(Soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden)

DEI: 2 Ex. Herzegovina, Plassa, 1901, 1 Ex. dto., Coll. LEONHARD; 1 Ex. Panther, Plasa, GANGLER., Nr. 16358; Paratypen.

peridus JEDLIČKA, 1934 (*Colpodes*)

(Sborn. ent. Mus. Praze 12, Nr. 103, 184)

Holotypus, 10 Paratypen, Philippinen, Insel Luzon-Baguio, in Coll. JEDLIČKA, Coll. ANDREWES und im DEI.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.***peristericus*** APFELBECK, 1901 (*Tapinopterus*)

(Glasn. zem. muz. Sarajevo 13, 429)

Mehrere Syntypen, Berg Peristeri bei Janin (Epiros), leg. APFELBECK.
DEI: 1 Syntypus (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).***perpusillus*** ROTTENBERG, 1874 (*Microtyphlus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 18, 329—330)

Mehrere Syntypen, Griechenland, bei Saloniki, leg. RAYMOND.
DEI: 1 Syntypus, Saloniki, leg. RAYMOND, Coll. LETZNER-ROTTENBERG.***petersi kathleenae*** BALL, 1966 (*Scaphinotus*)

(Trans. Amer. Ent. Soc. 92, 714—716)

♂ Holotypus, Arizona, Santa Rita Mountains, Santa Cruz County, Osthang v. Mt. Wrightson, westlich zwischen Baldy und Florida Spring, ca. 1 Meile nördlich von Baldy Spring, 8400—8600', 16.—17. VIII. 1963; 6 ♂♂, 11 ♀♀, dto.; 3 ♂♂, Westhang v. Mt. Wrightson, 8400', nördlich vom oberen Bellows's Spring, 12.—13. VIII. 1963; 1 ♀, Florida Canyon, oberer Florida Spring, 7900', 15. VIII. 1963; leg. BALL; im Museum of Comparative Zoology, im American Museum of Natural History, in California Academy of Sciences, im DEI und in University of Arizona.

DEI: 1 Ex. Arizona, Sta. Cruz, Sta. Rita Mts., Florida Cn., 7000—8000', 15. VIII. 1963, 1 Ex. Sta. Cruz, Sta. Rita Mts., w. si. Mt. Wrightson on trail, 8400', 12.—13. VIII. 1963; leg. BALL; Paratypen.

pfeiffii DEJEAN, 1831 (*Bembidium*)

(Spec. Gen. Coleopt. 5, 128—129)

Mehrere Syntypen, il se trouve en Suède et en Laponie.

DEI: 1 Syntypus, Tschapoma, durch SAHLBERG.

Syn. zu *virens* Gyllenhal, 1827.***phaedrum*** ANDREWES, 1923 (*Bembidium*)

(Ent. Monthly Mag. 59, 97)

Kumaon, Central und West Almora, West Bhatkot, 4000 ft., Swal River Basin, Ranikhet, Garhwal, Siuni Gad, 4000 ft.; leg. CHAMPION; Paratypen, Holotypus, im Britischen Museum.

DEI: 1 Paratypus, W. Almora, Kumaon, leg. CHAMPION.

picea JEDLIČKA, 1956 (*Cymindis*)

(Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 30 (1955, Nr. 452, 203)

Afghanistan: 24 Ex. Sarekanda, 7 Ex. Bashgultal, 6 Ex. Faizabad, 1 Ex. Umg. Kabul; 1952—1953, Exped. KLAPPERICH: Holotypus, Paratypen, in Coll. KLAPPERICH und Coll. JEDLIČKA.

DEI: 1 Paratypus, NO-Afghanistan, Gebirge Badakshan, Sarekanda, 4200 m, 21. VII. 1953, leg. KLAPPERICH.

piceus ROTTENBERG, 1870 (*Stenolophus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 14, 16—17)

Mehrere Syntypen, Sicilien, Catania, 26. II. — 5. IV., 5.—9. V. 1869, Aderno, 26. III. 1869, Girgenti, 23. IV.—3. V. 1869; leg. ROTTENBERG.

DEI: 2 Syntypen, Catania, leg. ROTTENBERG.

piceus balcanicus MLYNÁŘ (1975?) (*Molops*)

(soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae No. 39 veröffentlicht werden)

DEI: 1 Paratypus, Herzegovina, Vlasulja, Coll. LEONHARD.

picipes CHAUDOIR, 1868 (*Feronia*)

(L'Abeille 5, 228—229)

Mehrere Syntypen, Norditalien, Apennien.

DEI: 1 Syntypus, Apen., Coll. KRAATZ.

Syn. zu *cristatus* DUFOUR, 1820.***pifflii*** JEDLIČKA, 1964 (*Cymindis*)

(Ent. Arb. Mus. FREY 15, 288—289, Fig. 4)

5 ♀♀, Holotypus, Paratypen, Pakistan, Satil, leg. PIFFL, Österr. Karakorum-Exp., in Coll. JEDLIČKA und Coll. MANDL.
DEI: 1 ♀, Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1958.***pileolata*** BATES, 1892 (*Clivina*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 278)

Mehrere Syntypen, Burma, Rangoon, Katha, Palon in Pegu; leg. FEA.

DEI: 1 Ex. Birmania, Rangoon, Coll. KRAATZ; 1 Ex. dto. X. 1887, leg. FEA; Syntypen.

pilosus BATES, 1892 (*Lynnastis*)

(l.c. 296—297)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamo, Katha, Palon, Pegu; leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Palon, Pegu, VIII. IX. 1887, leg. FEA.

pinkeri GANGLBAUER, 1892 (*Trechus*)

(Käf. Mitteleur. 1, 197)

Mehrere Syntypen, Pyhriggass in den Haller Mauern, leg. PINKER, Gesäusealpen, Buchstein- und Hochthorgruppe, Grünauer Alpen, Kassingberg, leg. GANGLBAUER.

DEI: 1 Syntypus, Phrygass, Gesäuse Alp, 4. VIII. 1907, leg. PINKER.

[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Pyhriggass“, steht auf dem Etikett „Phrygass“.]

planifrons SLOANE, 1907 (*Clivina*)

(Proc. Linn. Soc. N.S. Wales 32, 347–348)

Mehrere Syntypen, Queensland, Brisbane, leg. HACKER, in Coll. HACKER und Coll. SLOANE.

DEI: 1 Syntypus, Brisbane, Coll. HACKER.

plaumannii LIEBKE, 1940 (*Agra*)

(Fol. Zool. Hydrobiol. 10, 244–245, Fig. 21, 82, 144, 145)

Syntypen: 8 Ex. Brasilien, Nova Teutonia, Sta. Catharina, 26–27 Grad s. Br. 52–53 Grad w. L. leg. PLAUMANN; 2 Ex. Argentinien, Misiones, leg. BRUCH; 5 Ex. Paraguay, Hohenau, leg. JACOB; in Coll. PLAUMANN, DEI, Museum Argent., Buenos Aires und Coll. LIEBKE.

DEI: 1 Syntypus, Paraguay, Hohenau, 11. XI. 1934, leg. JACOB.

plicicolle NICOLAI, 1822 (*Anchomenus*)

(Dissert. Col. spec. agri Halensis, 19)

Holotypus, Halle, leg. NICOLAI; im DEI [Coll. GERMAR-SCHAUM].

Syn. zu *müllerii* HERBST, 1785.***pluto*** ANDREWES, 1924 (*Bembidium*)

(Miss. BABAUT, Prov. Centr. Inde, 72, Taf. 1, Fig. 3)

Mehrere Syntypen, Indien, occ. Himalaya; Nima-Mud, Tsho-Moravi und Lac Salé; Ladack, Leh; 1914.

DEI: 1 Syntypus, Rukshu, Nima Mud, (Fronte Thibet), VII. 1914, leg. BABAUT.

polita MOTSCHULSKY, 1851 (*Tachys*)

(Bull. Soc. Nat. Moscou 24, 509)

Mehrere Syntypen, Ind. or.

DEI: 1 Syntypus, Ind. or. (Mndrstrn.), Coll. v. HEYDEN.

polyglyptus SCHAUM, 1862 (*Harpalus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 6, 110)

Mehrere Syntypen, Griechenland, auf Corfu, leg. KRUEPER.

DEI: 2 Syntypen, Graecia, Coll. KRAATZ.

ponticus APFELBECK, 1904 (*Aptinus*)

(Käfer. Balkanh. 1, 355–356)

Mehrere Syntypen: Türkei, Beligrader Wald bei Konstantinopel, leg. APFELBECK, 1900, leg. MERKL; Kleinasien, Smyrna, leg. KRÜGER, Alem Dagh, Sabandja, leg. v. BODEMEYER.

DEI: 2 Syntypen, Asia-minor, Goeck-Dagh, Alem-Dagh, leg. v. BODEMEYER.

pradieri darlingtoni BÄNNINGER, 1940 (*Pamborus*)

(Novit. Zool. 42, 205)

ca. 60 Ex. (Holotypus, Paratypen), Australia, Barrington Tops Plateau, 5000 ft., leg. DARLINGTON, im Museum Comparative Zoology, Cambridge, Mass., in Coll. DARLINGTON und Coll. BÄNNINGER.

DEI: 1 Paratypus, Australia, Barrington Tops, 5000 ft., N.S.W., 8. II. 1932, Harvard Exp., leg. DARLINGTON.

praedator ANDREWES, 1930 (*Anchomenus*)

(Trans. Ent. Soc. London 78, 38–39)

1 Ex. Tibet, Yatang; 2 Ex. Sikkim, Darjeeling, 7 Ex. Karponang, 16 Ex. Gopaldhara, 3500 ft., Mirik, via STEVENS an ANDREWES; 1 Ex., „Sikkim“, leg. NEWTON, im Museum Prag, 5 Ex. dto., im DEI; 1 Ex. Sureil, leg. ALCOCK, 5000 ft.; 2 Ex. Ghoom, 7000 ft., leg. KEMP; 1 Ex. Pashok, 5000 ft., leg. GRAVELY; 1 Ex. Sitong Ridge, 4700 ft., leg. GRAVELY; 3 Ex. Kalimpong, 5500 ft., leg. MANN; im Museum Indian, Calcutta; 1 Ex. wahrscheinlich Sikkim, im Museum Madrid; 2 Ex. Assam, Shillong, via FLETCHER an ANDREWES, in Coll. PUSA; Syntypen.
DEI: 1 Ex. Sikkim, Coll. KRAATZ; 1 Ex. dto. Himalaya: Syntypen.

privatus BATES, 1892 (*Chlaenius*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 315)

Mehrere Syntypen, Burrana, Asciuui Chebà, alt. 1200–1300 m, leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Carin, Asciuui Chebà, 1200–1300 m, I. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

problematicus nicolasi VENET, 1932 (*Carabus*)

(Bull. Soc. Ent. Fr. 37, 171–172)

Mehrere Syntypen, forêts des environs du Bosc (Ariège), leg. NICOLAS.

DEI: 1 Syntypus, Forêt du Bosc, Ariège, durch VENET.

procerus SCHAUM, 1858 (*Stenolophus*)

(Wien. Ent. Monatschr. 2, 274)

Mehrere Syntypen, Syrien.

DEI: 1 Syntypus, Syria.

promissus HEYDEN, 1875 (*Molops*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 19, 380—381)

1 Ex. Dalmatien, ex Coll. ZIEGLER; 1 Ex. von WALTL; Syntypen.

Lectotypenfestlegung durch MLYNÁČ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).

DEI: Lectotypus, Dalmatien, WALTL, Coll. v. HEYDEN; 1 Paralectotypus, Dalmatien, ex Coll. ZIEGLER-Coll. KRAATZ.

propagator REITTER, 1901 (*Odontocarabus*)

(Wien. Ent. Ztg. 20, 112—113)

Mehrere Syntypen, Buchara.

DEI: 3 Ex. Ost-Buchara, Tschitschantan, 2 Ex. Karatag, 916 m, 1 Ex. Turkestan, Mts. Ghissar; 1898, leg. HAUSER; Syntypen.

protensa SCHAUM, 1857 (*Feronia*)(Berl. Ent. Ztschr. 1, 139; nom. praeocc. = *zezeae* CSIKI, 1930, Col. Catal. 112, 709)

Mehrere Syntypen; Griechenland, Parnass, leg. HELDREICH; Parnes bei Athen.

DEI: 1 Syntypus (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).

pseudonothus KRAATZ, 1878 (*Carabus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 22, 144)

1 Ex. ohne Fundort, leg. BIRNBAUMER, via SCHMIDT an KRAATZ; 1 Ex. als *Carniolia*, seltene var. !!! bezettelt; Syntypen; im DEI [Coll. KRAATZ].***pseudopedioides*** REITTER, 1887 (*Pterostichus*)

(d.c. 31, 247—248)

Mehrere Syntypen, Westcaucasus, Utsch-Dere, leg. STARCK.

DEI: 1 Syntypus, Caucas. occ., Circassien, LEDER-REITTER, Coll. KRAATZ.

pseudoserripes REITTER, 1900 (*Harpalus*)

(Verh. Nat. Ver. Brünn 38 (1899), 121)

Mehrere Syntypen, Turkestan, Margelan, Samarkand, Alai, Kokand.

DEI: 1 Syntypus, Karagaitau, Coll. KRAATZ (Fundort ist nicht aufzufinden und stimmt mit der Originalbeschreibung nicht überein).

pulcher extrarius SCHAUBERGER, 1935 (*Gnathaphanus*)

(Ent. Anz. 15, 33—34)

Mehrere Syntypen, austral.-melanes., Saumlaki, Tenimber Ins.

DEI: 2 Syntypen, Saumlaki, Tenimber Ins.

pulvinatus MÉNÉTRIÉS, 1847 (*Harpalus*)

(Sc. nat. Acad. St. Petersburg 6, 40—41)

2 Syntypen, Bakali-tau avril.

DEI: 1 Syntypus, Baku, Nr. 4, Coll. KRAATZ.

pumilio KOLBE, 1889 (*Chlaenius*)

(Stett. Ent. Ztg. 50, 118)

Mehrere Syntypen, Kongo, im Gebiet des unteren Quango, Kwako bis Kimpoko, leg. BÜTTNER.

DEI: 1 Syntypus, Kongo, Kimpoko, leg. BÜTTNER, Coll. KRAATZ.

pumilus KRAATZ, 1886 (*Eutelocarabus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 30, 263)

Mehrere Syntypen, am Fluß Suyfun, leg. DÖRRIES, Amur, leg. CHRISTOPH; via STAUDINGER an KRAATZ.

DEI: 1 Ex. ohne Fundort, 1 Ex. Suyfun; Coll. KRAATZ; 1 Ex. Suifun, Mdg., durch KRAATZ, Nr. 576; 1 Ex. ohne Fundort; Coll. KÖLTZE: Syntypen.

Syn. zu *bilbergi* MANNHEIMER, 1827.***punctata*** DEJEAN, 1825 (*Clivina*)

(Spec. Gen. Coleopt. 1, 424—425)

Mehrere Ex. Umg. Paris, Südfrankreich, Spanien; 1 Ex. Kaukasus, durch STEVENS; Coll. DEJEAN: Syntypen.

DEI: 3 Syntypen, Nizza (SCHAUM), Coll. GERMAR-SCHAUM.

punctatissima BALIANI, 1932 (*Amara*)

(Mem. Soc. Ent. Ital. 11, 13—14, Taf. 2, Fig. 9)

2 ♂♂, 4 ♀♀, Syntypen, China centrale, Tatsienlu-confine Tibet orientale, durch REITTER.

DEI: 1 ♀, Syntypus, China, Szechuan, Tatsienlu, durch REITTER.

punctatus REITTER, 1885 (*Leistus*)

(Wien. Ent. Ztg. 4, 214)

Mehrere Syntypen, Attica, Euboea, Montenegro.

DEI: 1 Syntypus, Attica, Coll. BRENSKE-Coll. REITTER-Coll. FRANKLIN MÜLLER.

Syn. zu *spinibarbis* FABRICIUS, 1775.***punctipennis*** REITTER, 1901 (*Cychrus*)

(I.c. 20, 141)

♀ Holotypus, Herzegowina, auf der Cerstnica, leg. HILF, via LEONHARD an REITTER; im DEI.

Syn. zu *hampei* GESTRO, 1874.

punctisternus STRANEO, 1938 (*Caelostomus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 5, 244–245)

Holotypus, mehrere Paratypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ, in Coll. STRANEO und im DEI.
DEI: Holotypus, 5 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.**punctiventris** SCHAUM, 1864 (*Zabrus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 8, 179–180)

Mehrere Syntypen, Griechenland, leg. KRUEPER.
DEI: 2 Syntypen, Athen, Coll. SCHAUM.**punctulicollis** BATES, 1892 (*Colpodes*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 375)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Asciuii Gheciu, alt. 1400–1500 m; Karin Chebà, alt. 900–1100 m; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin, Asciuii Gheciu, 1400–1500 m, III.–IV. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.**purpureorutilans** BARTHE, 1908 (*Carabus*)

(Misc. Ent. 16, 3)

Mehrere Syntypen, prov. d. forêts de la Montagne Noire.

DEI: 3 Syntypen, Montagne Noire, Forêt de Moutard, erhalten 1910 von KRAUSE, Coll. FRANKLIN MÜLLER.
Syn. zu *auronitens* FABRICIUS, 1792.**purpureus** KRAATZ, 1876 (*Procerus*)

(Bull. Soc. Nat. Moscou 51, 139, 143–144)

♀ Holotypus, Krim, via SCHNEIDER an KRAATZ; im DEI [Taur., Coll. KRAATZ].
Syn. zu *scabrosus* OLIVIER, 1795.**pyrenaeus** KRAATZ, 1863 (*Leistus*)

(In GRENIER, Cat. Coleopt. France, 126)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, sur le Canigou, 1862, leg. NAU.
DEI: 1 Syntypus, Pyrenaeen Canigou, Coll. KRAATZ.**pyroclopus** KRAATZ, 1878 (*Coptolabrus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 22, 252)

Holotypus, Amur, leg. RADDE, Coll. KRAATZ; im DEI [Nr. 126].

Syn. zu *smaragdinus* FISCHER VON WALDHEIM, 1824.[*pyroclopus* KRAATZ wurde in der l.c. 30, 241–242; 1886 als *pyrophorus* KRAATZ berichtigt (Druckfehler).]**quadrifasciatus** DEJEAN, 1929 (*Harpalus*)

(Spec. Gen. Coleopt. 4, 326–327)

Mehrere Syntypen, Schweden, Frankreich, Dept. Basses-Alpes, Moskau, Steiermark, leg. DEJEAN; Coll. DEJEAN.

DEI: 1 Syntypus, V. Pellina, Coll. STIERLIN.

[Fundort ist nicht aufzufinden und stimmt mit der Originalbeschreibung nicht überein.]

quadrispinosa SLOANE, 1907 (*Loxocara*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 180)

Holotypus, New Guinea, Kaiser Wilhelm Land, Simbang, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN; im DEI [D. N. Guinea, Simbang, Coll. v. BENNIGSEN].

Syn. zu *quadrispinosa* CHAUDOIR, 1869.**radiana** ANDREWES, 1922 (*Bembidium*)

(Ent. Monthly Mag. (3) 8 (58), 177–178)

Holotypus, Sikkim, Gopaldhara, 10000 ft., leg. STEVENS, in Coll. ANDREWES, mehrere Paratypen: Lachung, Karponang und Tonglu, 10000 ft., leg. STEVENS; United Provinces: Kumaon, West Almora, Sunderdhunga, 8000–12000 ft.; Pindar Valley, 8000–11000 ft.; Nainital, Ranikhet, Bhatkot, leg. CHAMPION; Punjab: Simla Hills, Baghi, 8500 ft., Kufri, 8500 ft., Narkanda, 9000 ft., leg. KEMP, im Indischen Museum.

DEI: 2 Paratypen, Br. Sikkim, Gopaldhara, leg. STEVENS.

rambouseki JEDLIČKA, 1931 (*Bedeliolus*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 28, 133)

2 Ex. Persia, Prov. Faristan, Kaserun; 1 Ex. Transcaspia, Tedschen; in Coll. HAUSER und Coll. JEDLIČKA: Syntypen.
DEI: 1 Syntypus, Persia, Pr. Fariatan, Umg. Kaserun.**rectificatus** BATES, 1891 (*Rhembus*)

(Compt. rend. Soc. Ent. Belg. sér. 4, Nr. 22, 329)

Syntypen: 1 Ex. Tetara und mehrere Ex. Burma.

DEI: 1 Syntypus, Birmanie, Rangoon, Coll. KRAATZ.

reflexus SCHAUM, 1862 (*Zabrus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 6, 108–109)

7 Syntypen, nördl. Griechenland, leg. KRUEPER.

DEI: 1 Ex. Graecia, Coll. SCHAUM, 1 Ex. ohne Fundort, Coll. KRAATZ: Syntypen.

reichei KRAATZ, 1858 (*Percus*)

(Wien. Ent. Monatsschr. 2, 163)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Insel Corsica, ex Coll. REICHE; im DEI. [Coll. KRAATZ].

rektorički KULT, 1953 (*Amara*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 50, 119—121, Fig.)

Holotypus, South Slovakia, Kamenica nad Hronom! 20. V. 1950, in Coll. KULT; 21 Ex. dto.; 15 Ex. dto. 15 V. 1951; 1 Ex. Hegyfárok! prope Parkan (= Stúrovo), 10. V. 1952; 2 Ex. Chlaba! (= Helemba), 15. V. 1952; im Britischen Museum, Nemzeti Museum Budapest, Museum Warszawa, Museum Prag, DEI, in Coll. LINDROTH, Coll. JEDLIČKA, Coll. PUCHOLT, Coll. HAVELKA, Coll. REKTORÍK, Coll. DVORAK, Coll. KULT, etc.: Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Slovakia, Stúrovo, leg. REKTORÍK.

retowskii REITTER, 1887 (*Harpalus*)(Dtsch. Ent. Ztschr. 31, 246; nom. praeocc. = *retowskianus* REITTER, 1887, l. c., 500)

Mehrere Syntypen, Circassien, Theodosia, Berg Atschischcho, X. 1884, leg. RETOWSKI und STARCK.
DEI: 1 Syntypus, Caucas. occid., Atschischcho, leg. STARCK, Coll. STIERLIN.

retospinosa HEYDEN, 1885 (*Nebrisia*)

(Wien. Ent. Ztg. 4, 186—187)

♀ Holotypus, tscherkessischen Kaukasus, Atschischcho, leg. STARCK, in Coll. v. HEYDEN; im DEI [Caucasus occ., Circassien, durch LEDER-REITTER].

rhodopensis APFELBECK, 1904 (*Molops*)

(Käferf. Balkanh. I, 217—228, 224)

Mehrere Ex. Bulgarien, West-Rhodope, am Musallâ, 1 Ex. Bellova, in Coll. v. HEYDEN: Syntypen.
Lectotypenfestlegung durch MLYNÁŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).
DEI: 1 Paralectotypus, Balkan, Bellova, durch HOPFFGARTNER.

rhodopensis APFELBECK, 1904 (*Zabrus*)

(l.c., 315)

Mehrere Syntypen: Bulgarien, West-Rhodope bei Samakov und Demir Kapú, 1892, leg. APFELBECK, Rhilo Dagh, leg. MERKL, südlichen Serben, Surdulica, 1899, leg. REITTER.
DEI: 2 Syntypen, W. Rhodope, Musala, Coll. FRANKLIN MÜLLER.

rhodopus BATES, 1892 (*Oodes*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 324)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamo, Karin Chebâ, alt. 900—1100 m, Malewoon, Tenasserim, Palon, Pegu; leg. FEA.
DEI: 2 Ex. Palon, Pegu, 1887/VIII. IX. 1887, leg. FEA; 1 Ex. Carin Chebâ, 900—1100 m, V. XII. 1888; leg. FEA, Coll. KRAATZ: Syntypen.

rhombocephorus ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(l.c. 51, 390—391)

Mehrere Syntypen: Eastern Duars; Sikkim: Gopaldhara, Namsoo, Gielle Khola, Tarkhola in the Tista Valley; leg. STEVENS; Kumaon: West Almora, Ranikhet, Tanakpur, River Sarda Gorge, Haldwani-Nandhaur River, Hardwar-River Ganges, 200 ft., leg. CHAMPION; Dehra Dun, Lachiwala, Siwalik Hills, leg. CAMERON; River Song, leg. CHATTERJEE; im Forest Res. Inst.

DEI: 1 Syntypus, E.-Dooars, leg. STEVENS.

[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Eastern Duars“, steht auf dem Etikett „E.-Dooars“.]

rivalis GERMAR, 1924 (*Molops*)

(Ins. Spec. Nov., 21—22)

Mehrere Syntypen, Brasilia.

DEI: 1 Syntypus, Buenos Ayr., Coll. SCHAUM.

riversi DYKE, 1925 (*Nebrisia*)

(Pan-Pacific 1, 115—116)

♂ Holotypus (No. 1619), 1 ♀ (No. 1620, im Museum Calif. Acad. Sci.) und mehrere Ex. California, Mt. Lyell, Lyell Glacier, 11.500 ft., 13. VII. 1921, leg. V. DYKE und LAMBERT, via RIVERS an ROESCHKE; im DEI und in Coll. v. DYKE: Paratypen.
DEI: 1 ♀, Paratypus, Snow Mt. Lyell, Coll. v. DYKE.

roborowski SEMENOV, 1889 (*Nebrisia*)

(Horae Soc. Ent. Ross. 23, 350—351)

Mehrere Syntypen, Thibet sept.-orient., montes Burchanbudda, VI. 1884, leg. PRZEWAŁSKY.

DEI: 1 Syntypus, Amdo, 1884, leg. PRZEWAŁSKY.

[Fundort ist nicht aufzufinden und stimmt mit der Originalbeschreibung nicht überein.]

robusta BALIANI, 1932 (*Amara*)

(Mem. Soc. Ent. Ital. 11, 6—7, Taf. 1, Fig. 2)

5 ♂♂, 4 ♀♀, Syntypen, China centrale, Tatsienlu-Chiulung, prov. di Szechuan, durch REITTER.
DEI: 2 Syntypen, China, Tatsienlu-Kiulung, durch REITTER.

robustus SLOANE, 1907 (*Stenolopus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 469)

2 ♀♀, Syntypen, New Guinea, Gazelle Peninsula, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN.

DEI: 1 ♀, Syntypus, Gazelle, H. Insel, Coll. v. BENNIGSEN.

Syn. zu *vestigialis* ERICHSON, 1842.**robustus parallelus MLYNÁŘ (1975?) (*Molops*)**

(soll in Acta Ent. Mus. Prague, Nr. 39, veröffentlicht werden)

DEI: 5 Paratypen, Bulg. Tschaikorija, Samakov, 1911, durch HILF, Coll. LEONHARD.

roubali JEANNEL, 1927 (*Duvalius*)

(Bull. Soc. Sc. Cluj, 3, 14)

Mehrere Syntypen; Carpathen, Czorna Hora, leg. ROUBAL, Diener, mont Hoverla, Süd-Czorna Hora, leg. STOBIECKI; im Museum Vienne.
DEI: 2 Syntypen, Carpat. or., Hoverla, Col. MAKOLSKI.

rubellus BATES, 1892 (*Pristomachaerurus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 305)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Chebà, alt. 900–1100 m, Naga Hills, alt. 1300 m; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Karin Cheba, V. XII. 1888, 900–1100 m, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

rubidus ANDREWES, 1922 (*Aephnidius*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 10, 169)

Mehrere Syntypen; Central Provinces, Nagpur, leg. D'ABREU; Bombay, Khandesh, leg. BELL; Belgaum, 1886–1887, leg. ANDREWES; Madras, Madura, leg. SOMERS-SMITH; in Coll. ANDREWES.
DEI: 1 Syntypus, Belgaum.

rudolphi GANGLBAUER, 1891 (*Trechus*)

(Wien. Ent. Ztg. 10, 122–123)

Mehrere Syntypen, Koralpe an der Grenze von Steiermark und Kärnten, leg. GANGLBAUER und STARKE.
DEI: 1 Syntypus, Koralpe, 1890, GGLB., Coll. KRAATZ.

ruficollis MOTSCHULSKY, 1851 (*Nestra*)

(Bull. Soc. Nat. Mosc. 24, 506–507)

Mehrere Syntypen, Ind. or.

DEI: 1 Syntypus, India or. (Mndrstrn.), Coll. v. HEYDEN.

rufipes klisuranus APFELBECK, 1902 (*Molops*)

(Glasn. Muz. Bosn. Herc. 14, 545)

Mehrere Syntypen, Bulgarien, Stava planina, Klisura, leg. MERKL.

Lectotypenfestlegung durch MLYNAŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).

DEI: 1 ♂, ♀, Paralectotypen, Bulgaria, Klisura, leg. MERKL.

rugiceps ANDREWES, 1929 (*Oxylobus*)

(Faun. Brit. Ind. Coleopt. Carab. 1, 296, 310–311, Taf. 8, Fig. 5)

Bombay, Belgaum, leg. ANDREWES und KINNEAR; Kanara, leg. BELL; Holotypus, in Coll. ANDREWES, 2 Ex. im Britischen Museum, 1 Ex. in der Coll. Bombay Natural History Society: Paratypen.
DEI: 1 ♂, ♀, Paratypen, Belgaum.

rugulipennis BATES, 1892 (*Brachichila*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 406)

Mehrere Syntypen, Burma, Thagata, Tenasserim, Palon, Pegu; leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Tenasserim, Thagata, IV. 1887, leg. FEA.

rutilipennis BATES, 1892 (*Dolichoctis*)

(l.c., 412–413)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Chebà, alt. 900–1100 m, Karin Asciuii Chebà, alt. 1300–1400 m; leg. FEA.
DEI: 3 Syntypen, Karin Chebà, V. XII. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

sachtlebeni BASILEWSKY, 1942 (*Lobodontus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 9, 164–165, Fig. 8)

Holotypus, Caméroun, leg. CONRADT; im DEI [Coll. KRAATZ].

sagittaria BATES, 1892 (*Clivina*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 275–276)

Mehrere Syntypen, Burma, Rangoon, leg. FEA.

DEI: 3 Syntypen, Birmania, Rangoon, VI. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

sauteri ROESCHKE, 1912 (*Carabus*)

(Suppl. Ent. 1, 4–6)

♀ Holotypus, Formosa, Suisharyo, 11. XII. 1911; im DEI [durch SAUTER].

sauteri DUPUIS, 1914 (*Catascopus*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 57, 419)

Mehrere Syntypen, Formosa, Hoozan, leg. SAUTER, im Museum Berlin und DEI.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 22. VII., leg. SAUTER.

sauteri DUPUIS, 1912 (*Hexagonia*)

(l.c., 56, 308–312)

10 Syntypen, Formosa, Kankau, leg. SAUTER.

DEI: 4 Syntypen, Formosa, Kankau, IV. 1909, leg. SAUTER.

scapularis SCHAUM, 1860 (*Cymindis*)

(In ERICHSON, Naturg. Ins. Deutschl. (1857) 1, 1, 299–300)

Mehrere Syntypen, Österreich, bei Wien und bei München; im Süden von Europa, von Spanien bis in die Krim, in den transcaucasischen russischen Provinzen.

DEI: 1 Syntypus, Austria, Coll. SCHAUM.

schaubergeri JEDLIČKA, 1931 (*Chydaeus*)
(Acta Soc. Ent. Čechosl. 28, 22–23)

ca. 70 Syntypen, China mer., Prov. Szetschuan-Chung-king, V.–VI. 1929, in Coll. SCHAUBERGER, Coll. ANDREWES, Coll. BECKER, Coll. JEDLIČKA und im DEI.
DEI: 1 Ex. Chung-king, Szetschuan, Coll. BECKER; 1 Ex. Szechuan, Giufu-Shan, leg. REITTER; 2 Ex. China, Szechuan, Tatsienlu, leg. REITTER. Syntypen.

scheibeii EIDAM, 1937 (*Carabus*)
(Arb. morph. taxon. Ent. 4, 177–178)

♀ Holotypus, Hindukusch-Exped. 1935, Grama-Tal bei Paprok, 4. VIII. 1935; im DEI [Afghan, Nuristan, 1935, Exped. SCHEIBE].

scheidleri styriacus KRAATZ, 1887 (*Carabus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 31, 343)

Mehrere Syntypen, Styria, leg. KAHR.
Lectotypenfestlegung durch MANDL, 1965; Abh. Staatl. Mus. Tierk. Dresden. 31/13, 431–433.
DEI: 2 Paralectotypen, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.

schmidtii ANDREWES, 1927 (*Brachinus*)
(Ent. Mitt. 16, Nr. 2, 147–148)

Holotypus, Arabia, El Hedjaz, leg. MILLINGEN, im Britischen Museum, 1 Ex. dto.; 1 ♂, Irak, Basra, 13. VI. 1926, leg. SCHMIDT, im DEI: Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Basra, 13. VI. 1926, leg. SCHMIDT.

sectifrons BATES, 1892 (*Clivina*)
(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 276)

Mehrere Syntypen, Burma, Palon in Pegu, Rangoon, Tikekee, Shenmaga; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Birmanie, Rangoon, V.–VII. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

segnis SCHAUM, 1864 (*Zabrus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 8, 185)

Mehrere Syntypen, Kleinasiens, bei Brussa.
DEI: 1 Syntypus, Anatolia, Brussa, Coll. SCHAUM.

seidlitzii SCHAUM, 1864 (*Zabrus*)
(d.c., 177–178)

Mehrere Syntypen, Guadarrama, leg. SEIDLITZ.
DEI: 1 Syntypus, Spanien, Coll. STIERLIN.
[*seidlitzii* ist offenbar ein Druckfehler; es muß heißen *seidlitzi*, wie aus der Originalbeschreibung p. 178, Zeile 9 hervorgeht.]

semilunum muchei JEDLIČKA, 1965 (*Bembidion*)
(Ent. Abh. Mus. Tierk. Dresden 32, 122)

5 Syntypen, oberer Amur, in Coll. JEDLIČKA.
DEI: 1 Syntypus, oberer Amur.

semirubra ANDREWES, 1926 (*Coryza*)
(Ent. Monthly Mag. 62, 71–72)

Kumaon-Tibetan Frontier: 1 Ex. Sarju Valley, 5,000', leg. CHAMPION; mehrere Ex.; Upper Gumti Valley, Ranikhet, Swal River basin, Almora, Tanakpur, Nandhaur River bis Haldwani, leg. CHAMPION; Dehra Dun, Dwarahat, 5,000', Kanarichina, 4,000', Almora, leg. PARKER; Saia, 3,600', leg. CAMERON; Binal Gad, 3,500', leg. CHATTERJEE; Chakrata, Kali Gad, nahe Dehra Dun; Kohlu Khet Gad bis Mussoorie; Aglar River, Tehri Garhwal; leg. CAMERON; in Forest Research Institute und Coll. CHAMPION; Syntypen.
DEI: 1 Syntypus, India, Kumaon, W. Almora, H.G.C.

semisuturalis DUPUIS, 1912 (*Pentagonica*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 56, 314–316)

Holotypus, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER; im DEI [VIII. 1903].

semiviridis HAUSER, 1914 (*Coptolabrus*)
(Stett. Ent. Ztg. 75, 187)

Mehrere Syntypen, China prov. Hunan, Siantang, Tao huaping, vallis Lokiang.
DEI: 1 Syntypus, China, Hunan.
Syn. zu *augustus* BATES, 1888.

serbiculus HOPFGARTEN, 1878 (*Carabus*)
(Ent. Nachr. 4, Nr. 8, 97)

Mehrere Syntypen, Serbien.
DEI: 1 Syntypus, Serbien, Coll. STIERLIN.
Syn. zu *scheidleri* PANZER, 1799.

seriatoporus SCHAUM, 1864 (*Zabrus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 8, 181–182)

Mehrere Syntypen, Armenien, via CHAUDET und FAIRMAIRE an SCHAUM.
DEI: 2 Syntypen, Armenien, Coll. SCHAUM.
Syn. zu *spectabilis* HAMPE, 1852.

sericea MOTSCHULSKY, 1851 (*Tachys*)

(Bull. Soc. Nat. Mosc. 24, 507)

Mehrere Syntypen, Ind. or.

DEI: 1 Syntypus, Ind. or. (Mndrstrna.), Coll. v. HEYDEN.

sexmaculata LIEBKÉ, 1930 (*Calophaena*)

(Mitt. Zool. Mus. Berlin 15, 672, 719, Fig. 59)

10 Syntypen, Costarica; Siquirres, 11. I. 1922, Farm „Hamburg“ am Reventazón, Ebene Limon, 15. X. 1922/22. VII., 3. XII. 1925/8., 25. III. 1928; leg. NEVERMANN, in Coll. NEVERMANN.

DEI: 1 Syntypus, Costarica, Hamburgfarm, Reventazon, Ebene Limon, 3. XII. 1925, leg. NEVERMANN.

silvanoides DIECK, 1869 (*Typhlocharis*)

(Diagn. neuer blind. Käfer, 6)

Mehrere Syntypen, Nordküste Marocco bei Tanger, leg. DIECK.

DEI: 1 Syntypus, Tanger, leg. DIECK, Coll. SCHNEIDER-KELCH.

similis KRAATZ-KOSCHLAU, 1885 (*Ceroglossus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 29, 435–436)

3 Syntypen, Chile, Arauco.

DEI: 2 Syntypen, ohne Fundort, Coll. KRAATZ, Nr. 11.

simplex breviformis MLYNÁŘ (1975?) (*Molops*)

(soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden)

DEI: 3 Paratypen, Herzegovina, Tisovica, leg. ZOUFAL, Coll. FRANKLIN MÜLLER (2 ♂♂, 1 ♀).

sinecum ANDREWES, 1938 (*Cillenus*)

(Proc. Roy. Ent. Soc. London, Ser. B, 7, 191)

Holotypus, China, Foochow, leg. YANG, im Britischen Museum; mehrere Paratypen, dto.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1935–36.

sjoestedti ANDREWES, 1926 (*Anisodactylus*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 18, 276–277)

Holotypus, Sumatra, Fort de Kock, leg. JACOBSON, im Britischen Museum; 20 Ex. dto.; 4 Ex. Medan, leg. MJÖBERG, im Museum Stockholm; 34 Ex. Holland. Indien, ? Java, im Museum Buitenzorg; 1 Ex. Philippine Is., Los Baños, leg. BAKER; Paratypen.

DEI: 1 Paratypus, Sumatra, Fort de Kock, 920 M, XII. 1921, leg. JACOBSON.

socialis SCHAUM, 1864 (*Zabrus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 8, 187)

Mehrere Syntypen, Kleinasien, bei Brussa.

DEI: 1 Syntypus, Brussa, Coll. SCHAUM.

sodalis LAPOUGE, 1925 (*Carabus*)

(Misc. Ent. 29, 193–194)

Mehrere Syntypen, Juldus, im Thian Chan Gebirge.

DEI: 1 Syntypus, Juldus, Coll. v. BENNINGSEN.

solinfectum JÄNICHEN, 1914 (*Calosoma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 298)

Holotypus, Mark Brandenburg, Bärwalde (Neumark), 1869 oder 1870, leg. JÄNICHEN; im DEI.

Syn. zu *sycophanta* LINNÉ, 1758.***spartanus*** SCHAUM, 1862 (*Pterostichus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 6, 106–107)

Mehrere Syntypen, Süden von Morea, leg. KRUEPER.

Lectotypenfestlegung durch MLYNÁŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).

DEI: ♂ Lectotypus, Morea, Coll. KRAATZ, 1 ♂, 2 ♀♀, Paralectotypen, ex Coll. SCHAUM.

spartanus chelmosensis MAŘAN, 1940 (*Molops*)

(Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze, 18, 193)

Mehrere Syntypen, Morea septentrionalis, mons Chelmos ad oppidum Kalavrita, leg. 15.–25. IV. 1936.

DEI: 2 Syntypen, Chelmos Pelop., Maf. et Tab., IV. 1936, Coll. BARTON.

spartanus parnassicola KRAATZ, 1875 (*Molops*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 19, 372)

2 Syntypen, Parnassus, leg. ZEBE, in Coll. KRAATZ und Coll. v. KIESENWETTER.

Lectotypenfestlegung durch MLYNÁŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).

DEI: ♂ Lectotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

speciente JEDLIČKA, 1932 (*Bembidion*)

(Wien. Ent. Ztg. 49, 325)

Holotypus, 6 Paratypen, China, Prov. Szetschuan-Tatsienlu, in Coll. JEDLIČKA und Coll. REITTER.

DEI: 1 Paratypus, China, Szechuan, Tatsienlu, leg. REITTER.

spectabilis SCHAUM, 1856–60 (*Amara*)
(Naturg. Ins. Deutschl. Col. 1, 1 (1958), 510)

Mehrere Syntypen, in den Alpen von Krain und Kroatien.
DEI: 5 Syntypen, Croatiens, Carniol, Coll. GERMAR-SCHAUM.

spectans JEDLIČKA, 1933 (*Bembidion*)
(Acta Soc. Ent. Čechosl. 30, 9–10 (Separat))

Holotypus, 3 Paratypen, China, Prov. Szetschuan-Tatsienlu, in Coll. JEDLIČKA und in Coll. REITTER.
DEI: 1 Paratypus, China, Szechuan, Nitou Tatsienlu, leg. REITTER.

spinicollis BREIT, 1913 (*Anophthalmus*)
(Ent. Mitt. 2, Nr. 11, 351–352)

Mehrere Syntypen, Bosnien, Jahorina-planina, leg. SETNIK, in Coll. LEONHARD.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Bosnien, Jahorina, Coll. LEONHARD.
Syn. zu *pfeifferi* AFFELBECK, 1908.

spinulifer BATES, 1892 (*Colpodes*)
(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 377)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Asciuii Ghecu, alt. 1400–1500 m; Karin Cheba, alt. 900–1100 m; leg. FEA.
DEI: 2 Syntypen, Karin Asciuii Ghecu, 1400–1500 m, III.–IV. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

stenoderus CHAUDOIR, 1850 (*Agonum*)
(Bull. Soc. Nat. Mosc. 23, 3, 118–119)

Mehrere Syntypen, Umgebung von Tiflis; „partie inférieure du cours du Volga“.
DEI: 1 Syntypus, Kaukasus, Coll. GERMAR-SCHAUM.

Syn. zu *extensus* MENETRIES, 1849.

sterbai JEDLIČKA, 1964 (*Bembidion*)
(Ent. Abh. Mus. Tierk. Dresden 32, 138, Fig. 29)

Holotypus, China, Yunnan, Solingho; im DEI [Vallis flumin.].

sterbai RAMBOUSEK, 1909 (*Penetretus*)
(Acta Soc. Ent. Bohemia, 6, 116, Fig.)

2 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Macedonien, Gebirge Perister, Bitolia (Monastére), 2000 m, leg. RAMBOUSEK.
DEI: 3 Syntypen, Macedonien, Perister alpin, 14. VII., leg. RAMBOUSEK, Coll. FRANKLIN MÜLLER-Coll. LEONHARD.

sternbergi ROESCHKE, 1898 (*Carabus*)
(Ent. Nachr. 24, 121–122)

Mehrere Syntypen, Gensan, leg. STAUDINGER.
DEI: 1 Syntypus, Gensan, Coll. V. BENNIGSEN.

stevensi ANDREWES, 1925 (*Tachys*)
(Ann. Mus. Genova, 51, 406, 445–446)

Mehrere Syntypen, Sikkim, Gopaldhara; Eastern Duars; leg. STEVENS; Kumaon, West Almora, Nainital, Swal River basin, Haldwani-Nandhaur River, Kaulha, 4500 ft.; leg. CHAMPION; Bhim Tal, 4500 ft.; Punjab, Simla Hills-Barogh, 5000 ft.; leg. ANNANDALE, im Indischen Museum; Bajaura-Kanya district, leg. BABAUT; Chota Nagpur, Barway, leg. CARDON, im Museum BRÜSSEL; 2 Ex. Karen Hills, durch FEA, im Britischen Museum.
DEI: 2 Syntypen, Br. Sikkim, Gopaldhara, leg. STEVENS.

stictus ANDREWES, 1933 (*Omophron*)
(Ann. Mag. Nat. Hist. (10) 11, 99–100)

Mehrere Syntypen, Tonkin, Hoa-Binh, leg. DE COOMAN; Laos, Hat Tiang, leg. VITALIS DE SALVAZA; in Coll. ANDREWES, Coll. BÄNNINGER, Coll. FLEUTIAUX und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Tonkin, Lac Thô, Hoa-Binh, leg. DE COOMAN, ex Coll. FLEUTIAUX.

striata DARLINGTON, 1934 (*Tachys*)
(Psyche 41, 82)

Cuba: ♂ Holotypus, no. 19502, 19 Ex. Soledad, nahe Cienfuegos, IV., 17., 20. X., 7. XI., im Museum Comparative Zoölogy; 1 Ex. Cayamas, Sta. Clara, 6. VI., leg. SCHWARZ, im United States National Museum; 1 Ex. Poey Collection no. 27, in Philadelphia Academy of Sciences; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Cuba, Soledad, Cienfuegos, 7. XI. 1926, leg. DARLINGTON, M.C.Z.

stricticeps BALIANI, 1932 (*Amara*)
(Mem. Soc. Ent. Ital. 11, 7–8, Taf. 1, Fig. 3)

2 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, China centrale, Tatsienlu-Chiulung, prov. di Szechuan, durch REITTER.
DEI: 1 ♀, Syntypus, China, Tatsienlu-Kiulung, durch REITTER.

stricticollis BAUDI, 1864 (*Blechrus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 8, 203)

10 Syntypen, Cypern.
DEI: 2 Syntypen, Cypern, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *infuscatus* MOTSCHULSKY, 1859.

strigatarsis STRANEO, 1939 (*Nebrioferonia*)
(Mem. Soc. Ent. Ital. 18, 119–121, Figs.)

Holotypus, mehrere Paratypen, Nova Guinea, Haveri, leg. LORIA, im Museum Genova, DEI, in Coll. STRANEO und Coll. ANDREWES.

DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, VII.–XI. 1893.

***stübele* EMDEN, 1953 (*Anisotarsus*)**

(Ann. Mag. Nat. Hist (12) 6, 533–534)

♀ Holotypus (Lo.), Ecuador, Quito, leg. BOWRING; 1 ♂, Paratypus (Da.), dto., Coll. GERMAR-SCHAUM; im Britischen Museum.
DEI: 1 ♂, Paratypus, Quito, Coll. GERMAR-SCHAUM.

***sturmi* KRAATZ, 1875 (*Molops*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr. 19, 375)

2 Syntypen, Banat, leg. ZIEGLER, Wallachei, leg. STENTZ, in Coll. v. HEYDEN und Coll. KRAATZ.

Lectotypenfestlegung durch MLYNÁČ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).

DEI: ♂ Lectotypus, Banat, leg. ZIEGLER, Coll. KRAATZ; 1 ♂, Paralectotypus, Wallachia, leg. STENTZ, Coll. v. HEYDEN.
Syn. zu *piceus orthognathus* CHAUDOIR, 1868.

***subaenea* CHAUDOIR, 1850 (*Feronia*)**

(Bull. Soc. Nat. Mosc. 23, 144–145)

Mehrere Syntypen, Berg Kuznetsk, leg. GEBLER.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. KRAATZ, Nr. 11.

***sublaevigatus* TSCHITSCHERIN, 1898 (*Harpalus*)**

(Ann. Soc. Ent. Fr. 67, 180–181)

Mehrere Syntypen, Province Transcaspienne, Dort-kuju, 5. V. 1888, leg. SÉMENOW; Turkestan russe occ., désert Kisilkum mér., 1892, leg. GLASUNOW; Turkestan russe mér., vallée du Zerawchan, V. 1893, leg. KOMAROW, montagnes d'Alaj, 5. VI. 1890, leg. GROMBCZEWSKI; in Coll. SÉMENOW und Coll. TSCHITSCHERIN.

DEI: 2 Syntypen, Margelan, Coll. KRAATZ.

***subpurpureus* REITTER, 1901 (*Chlaenites*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 65)

Mehrere Syntypen, Turkestan, Umgebung von Aulie-Ata.

DEI: 1 Syntypus, Aulie-Ata, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *spoliatus* ROSSI, 1790.***subrobustus* SCHAUBERGER, 1938 (*Acupalpus*)**

(Arb. morph. taxon. Ent. 5, 47–48)

Java: Holotypus, M. Gede, in Coll. SCHAUBERGER, 8 Ex. dto., 2 Ex. Sukabumi, 1 Ex. ohne nähere Angabe; Sumatra: 4 Ex. Tebing-tinggi, 6 Ex. ohne nähere Angabe; 1 Ex. Borneo; Celebes: 1 Ex. Samanga, 1 Ex. Makassar, 2 Ex. ohne nähere Angabe; in Coll. SCHAUBERGER und im DEI: Paratypen.
DEI: 1 Ex. Java; 1 Ex. Borneo; 2 Ex. Celebes; 1 Ex. Makassar; 4 Ex. N.O. Sumatra, Tebing-tinggi, leg. SCHULTHEISS; Coll. KRAATZ; 1 Ex. Java occident., Mons Gede, 4000', VIII. 1892, leg. FRUHSTORFER: Paratypen.

***subrugosus* SCHAUBERGER, 1938 (*Platymetopus*)**

(l.c., 39–40)

Holotypus, 3 Paratypen, Celebes, Makassar, Coll. GERMAR-SCHAUM, in Coll. SCHAUBERGER und im DEI.

DEI: Holotypus, Celebes, Makassar, Nr. 66, 1 Paratypus, Celebes; Coll. GERMAR-SCHAUM.

***subtilis* BATES, 1892 (*Hypolithus*)**

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 338)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamo, leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamo, VI. 1885, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

***subtilis* BATES, 1892 (*Siagona*)**

(l.c., 284)

6 ♀, Syntypen, Burma, Rangoon, Semmigion; Palon, Pegu; leg. FEA.

DEI: 3 Syntypen, Birmania, Rangoon, 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *obscuripes* CHAUDOIR, 1876.***successor* REITTER, 1896 (*Araecarabus*)**

(Verh. Nat. Ver. Brünn 34 (1895), 172)

Mehrere Syntypen, Thian-Schan, via HAUSER an REITTER.

DEI: 3 Syntypen, Thian-Schan, Musart, VI. 1894, Coll. HAUSER.

***suensonii* LINDROTH, 1956 (*Synuchus*)**

(Trans. R. ent. Soc. Lond. 108, 525)

China, Prov. Fukien, Buong kā, N. Foochow, 28.–29. IV. 1935, ♂ Holotypus, 25 Ex. (many more or less teneral), leg. SUENSON; Kuatun, 1930, 1 ♀, leg. KLAPPERICH, MNP, 2300 m, 18. IV. 1938, 4 Ex. (all teneral), leg. KLAPPERICH; Prov. Chekiang, Hangchow, 23. IV. 1921, mehrere Ex. (teneral); Chekiang, 27. IV. 1920, 1 ♂, (teneral), 4. VI. 1920, 1 ♂; leg. SUENSON; Prov. Hupeh, Mts. Wushan, 2 ♂♂, Coll. HAUSER, BMNH: Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, China, Fukien, Buong kā, 28. IV. 1935, leg. SUENSON.

***sulcata* MOTSCHULSKY, 1851 (*Tachys*)**

(Bull. Soc. Nat. Mosc. 24, 509)

Mehrere Syntypen, Ind. or.

DEI: 1 Syntypus, Ind. or. (Mndrstrn.), Coll. v. HEYDEN.

***suturalis* MOTSCHULSKY, 1851 (*Tachys*)**

(l. c., 508)

Mehrere Syntypen, Ind. or.

DEI: 1 Syntypus, India or. (Mndrstrn.), Coll. v. HEYDEN.

szetschuanus JEDLIČKA, 1932 (*Andrewesius*)

(Ent. Nachrichtenbl. 6, 76)

Holotypus, 54 Paratypen, China, Prov. Szetschuan, Tatsienlu, in Coll. JEDLIČKA, Coll. ANDREWES, Coll. REITTER und im DEI.
DEI: 3 Ex. China, Tatsienlu-Kiulung, 2 Ex. Szechuan, Giufu-Shan; leg. REITTER, Paratypen.

szetschuanus JEDLIČKA, 1932 (*Diplopus*)

(I.c., 107)

Holotypus, 10 Paratypen, China, Prov. Szetschuan-Tatsienlu, in Coll. JEDLIČKA und Coll. REITTER.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

szetschuanus JEDLIČKA, 1932 (*Eucalathus*)

(I.c., 73—74)

Holotypus, 55 Paratypen, China, Prov. Szetschuan, Tatsienlu, in Coll. JEDLIČKA und Coll. REITTER.
DEI: 4 Paratypen, China, Tatsienlu-Kiulung, durch REITTER.

tabularis STRANEO, 1941 (*Abacetodes*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 8, 14—15)

♂ Holotypus, Africa meridion., Kapstadt, 25. VI. 1916, leg. ANDREAE, im DEI; 1 ♀, Paratypus, dto., in Coll. STRANEO.
DEI: ♂ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

tachypoda TSCHITSCHERIN, 1898 (*Amara*)

(Horae Soc. Ent. Ross. 32, 209)

♀ Holotypus, Transcaspienne, „Turmenien, Leder“, ex Coll. REITTER; in Coll. v. HEYDEN, im DEI.

tagax ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova 51, 444—445)

Mehrere Syntypen, Kumaon, West Almora, Nainital, Ranikhet, Haldwani-Nandhaur River, Upper Gumti Valley, leg. CHAMPION, Dehra Dun-Kaligad, Siwalik Hills, Mussoorie-Mossy Falls, Kemti Falls, Arni Gad, Tehri Garhwal-Aggar River; leg. CAMERON, im Forest Res. Inst.; Chaudhatty, 6000—7000 ft., leg. ARCHER, im Britischen Museum; Sikkim, Tista Valley, Tarkhola, Rangit River, leg. STEVENS.
DEI: 2 Syntypen, W. Almora, Kumaon, leg. CHAMPION.

talysschensis REITTER, 1887 (*Platyderus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 31, 253)

2 ♂♂, Syntypen, Talysschengebirge bei Hamarat, leg. LEDER.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Caspi-M. Gebiet, Hamarat, leg. LEDER-REITTER, Coll. KRAATZ (Ex. sehr schlecht erhalten).

taprobanae ANDREWES, 1923 (*Oodes*)

(Spol. Zeyl. 12, 231—232)

♂ Holotypus, Ceylon, Vavuniya, im Britischen Museum; 1 ♀, Paratypus, Anuradhapura, leg. HORN, im DEI.
DEI: 1 ♀, Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, Ceylon, 1899.

tagetana ROTTENBERG, 1874 (*Nebria*)

(Berl. Ent. Ztschr. 18, 325—326)

Mehrere Syntypen, Griechenland, Taygetos, leg. RAYMOND.
DEI: 3 Syntypen, Taygetos, leg. RAYMOND, Coll. LETZNER-ROTTENBERG.

tagetanus HEYDEN, 1883 (*Zabrus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 27, 306—307)

♂ Holotypus, Griechenland, Taygeto, leg. RAYMOND; im DEI [Coll. v. HEYDEN].

taxianus BREIT, 1912 (*Anopthalmus*)

(Ent. Bl. 8, 210—211)

Mehrere Syntypen, Südgarn, obere Waldregion, Munte Sarco, leg. BREIT, KNIRSCH, TAX.
DEI: 3 Syntypen, Ungarn merid., Mt. Sarco, leg. BREIT.
Syn. zu *dacicus* FRIVALDSKY VON FRIVALD, 1883.

tenebrosus DEJEAN, 1929 (*Harpalus*)

(Spec. Gen. Coleopt. 4, 358—359)

Mehrere Syntypen, Frankreich, Spanien, Deutschland, Österreich, Dalmatien und Barbarie, Coll. DEJEAN.
DEI: 1 Syntypus, Jura, Coll. STIERLIN (Fundort ist nicht aufzufinden und stimmt mit der Originalbeschreibung nicht überein).

teodoroi GRIDELLI, 1930 (*Microdaccus*)

(Boll. Soc. Ent. Ital. 62, 63—65, Fig. 1—3)

Holotypus, Paratypen (ca. 30 Ex.); Insel Rodi, Broussali, 2 km v. d. Stadt Rodi entfernt, Sommer 1927, leg. TEODORO, im Museum Triest.

DEI: 1 Paratypus, Rodi, 1927, leg. TEODORO.

tetrastigma BATES, 1892 (*Amblystomus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 334)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamo, Teinzò, Rangoon, Palon in Pegu; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Palon, Pegu, VIII. IX. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

theanus REITTER, 1895 (*Carabus*)

(Wien. Ent. Ztg. 14, 110)

Mehrere Syntypen, Turkestan, Kulab, durch STAUDINGER & BANG-HAAS.

DEI: 4 Ex. ÖST-Buchara, Tschitschantan; 1 Ex. Prov. Kuliab, Ak-sou-Thal; Coll. HAUSER, 1898—Coll. LEONHARD: Syntypen.

[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Kulab“ steht auf dem Etikett „Kuliab“.]

thomae SCHAUM, 1853 (*Panagaeus*)

(Ann. Soc. Ent. Fr. (3) 1, 441)

Mehrere Syntypen, Insel Saint-Thomas, leg. MORITZ.

DEI: 1 Syntypus, St. Thomas, Coll. SCHAUM.

Syn. zu *quadrisignatus* CHEVROLAT, 1835.***thoracicus*** GERMAR, 1824 (*Carabus*)

(Ins. Spec. Nov., 8)

Mehrere Syntypen, Sibiria.

DEI: 1 Syntypus, Sibiria, Nr. 247.

Syn. zu *cribellatus* ADAMS, 1812.***thulensis*** SAHLBERG, 1885 (*Feronia*)

(Vega-Exped. Vetensk. Arb., 18)

Mehrere Syntypen, Tschuktsch-Hälfte, Vega-Exped. von Hälfte Norra und Östra Kust: Jrkajpi, 68° 55', 179° 25', 12. IX. 1878; Pitlekaj, 66° 30'—67° 10', 174° 20'—173°, 28. IX. 1878/3. VII. 1879; Jinretien, 66° 30'—67° 10', 174° 20'—21° 22', 25. VI., 5.—7., 7., 12. VII. 1879.

DEI: 1 Syntypus, Terra Tschuchtschorum, Pitlekaj, Vega-Exped., Nr. 261, Coll. KRAATZ.

tibeticus hispanicus SCHAUBERGER, 1932 (*Harpalus*)

(Wien. Ent. Ztg. 49, 32—34)

Szetschuan: Holotypus, Kwanshien, mehrere Paratypen, Omisien, Sumpanting, Tatsienlu und Wassekou; leg. STÖTZNER, im Museum Dresden und in Coll. SCHAUBERGER.

DEI: Szetschuan: 1 Ex. Tatsienlu, Exp. STÖTZNER, 3 Ex. Wassoland, Chung-hwa, 1 Ex. Nitou Tatsienlu; durch REITTER, Paratypen.

tieffenbachii SCHAUM, 1862 (*Pterostichus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 6, 106—107)

Mehrere Syntypen, Morea, leg. KRUEPER.

DEI: 1 Syntypus (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).

Syn. zu *rebeli* REICHE, 1855.***tigrinus*** ANDREWES, 1927 (*Anchomenus*)

(Ent. Mitt. 16, Nr. 2, 146—147)

♂ Holotypus, Irak, Qualat, Saleh Amara, 20. III. 1917, leg. BEESON, im Britischen Museum, 1 ♀, Paratypus, Basra, 14. IV. 1926, leg. SCHMIDT, im DEI.

DEI: 1 ♀, Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

tinctus STRANEO, 1940 (*Abacetus*)

(Mem. Soc. Ent. Ital. 19, 171)

7 Ex. Alto Senegal, Badoumbé, leg. NODIER, via CLERMONT an STRANEO; mehrere Ex. Costa, d'Avorio, Leraba, leg. ALLU-AUD: Paratypen, Holotypus, in Coll. STRANEO.

DEI: 1 Paratypus, Ht. Senegal, Badoumbé, leg. NODIER, Coll. CLERMONT-Coll. STRANEO.

torquata ANDREWES, 1930 (*Dolichocheilus*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (10) 6, 667)

Holotypus, 2 Paratypen, Sumatra, im DEI.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Sumatra, Coll. KRAATZ.

trachys ANDREWES, 1929 (*Auchmerus*)

(Ann. Mus. Genova 53 (3) 13, 439—440)

Syntypen: 8 Ex. Sumatra, Si-Rambé, XII. 1890—III. 1891, leg. MODIGLIANI (2 Ex. im DEI); 1 Ex. Singapore, X. 1875, leg. D'ALBERTIS, im Museum Genoa.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Si-Rambé, XII. 1890—III. 1891, leg. MODIGLIANI.

trachys ANDREWES, 1930 (*Clivina*)

(Ark. Zool. 21A, 1—2)

Holotypus, 2 Ex. Sumatra, Medan und Tjinta Radja, leg. MJÖBERG, im Museum Stockholm; 1 Ex. Soekaranda, im Museum Stettin; 1 Ex. Sumatra, im DEI: Paratypen.

DEI: 1 ♀, Paratypus, Sumatra, Coll. KRAATZ.

transversalis SCHAUM, 1862 (*Stenolophus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 6, 111)

Mehrere Syntypen, nördl. Griechenland, leg. KRUEPER.

DEI: 1 Syntypus, Graecia.

trimaculata LIEBKÉ, 1930 (*Colliuris*)

(Mitt. Zool. Mus. Berl. 15, 694—695)

Holotypus, Brasilien, St. Catharina, Joinville, leg. SCHMALZ, im Museum Berlin, 1 Ex. St. Catharina, Coll. FELSCHÉ, im Museum Dresden, 2 Ex. Rio de Janeiro, Iry, leg. BESCHKE, im Britischen Museum, 1 Ex. Brasilien, in Coll. ANDREWES, 1 Ex. Provinz Buenos Aires, leg. BRUCH, in Coll. BRUCH, Olivos, 4 Ex. Brasilien, Coll. KRAATZ, im DEI, 1 Ex. St. Catharina, im Museum Stettin: Paratypen.

DEI: 3 Paratypen, Brasilien, Coll. KRAATZ.

tropica LIEBKE, 1934 (*Lebia*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 1, 276—277)

2 Syntypen, Brasilien, Coll. SCHAUM, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Coll. SCHAUM.

truncatum NIETNER, 1858 (*Bembidium*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 2, 421)

Mehrere Syntypen, Ceylon, prov. occid. varius.

DEI: 1 Syntypus Ceylon, Coll. GERMAR-SCHAUM. (Das 1 Ex. hat einen 2. Fundortzettel mit „Celebes“.)

trybomi SAHLBERG, 1880 (*Amara*)

(Svensk. Vet. Acad. Handl. (2) 17, nr. 4, 34, Taf. 1, Fig. 11)

Mehrere Syntypen, nordwest. Sibirien, Tolstoinos, 27. VIII.—7. IX., leg. TRYBOM und SAHLBERG, zwischen Verschininsk und Dudinka, 27. VII., leg. TRYBOM; Exped. 1876—1877, im Museum Holm., Museum Helsingf., in Coll. HAGLUND, Coll. KRAATZ, Coll. SAHLBERG, etc.

DEI: 4 Syntypen, Tolstoinos, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *glacialis* MANNHEIMER, 1853.*undulipennis* BATES, 1892 (*Colpodes*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 375)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamo, Katha; leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamo, IX. 1886, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

unicolor EMDEN, 1937 (*Dolichoctis*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 4, 121—123)

Java: ♂ Holotypus, 1 ♂, 1 ♀, Kamodjan, V. 1935/IX. 1936, in Coll. v. EMDEN und im DEI; mehrere Ex. Preanger, G. Tangkoeban Prahoe, 4000—5000 ft., 7. VIII., XI. 1929; 2 ♂♂, Batoerraden, G. Slamat, 1.—12. IX. 1927/8. VII. 1929; leg. DRESCHER; in Coll. ANDREWES und Coll. DRESCHER: Paratypen.

DEI: 1 ♂, Paratypus, Preanger, Garoet Kamodjan, IX. 1936, leg. OVERBECK, Gesch. II. 1936 von OVERBECK.

urengaiicus JUREČEK, 1924 (*Pterostichus*)

(Jub. Sborn. Čechosl. ent. Spol. 144, Figs.)

Mehrere Syntypen, Rußland, Ural merid., Gebirge Urengai, Prov. Orenburgensis, Katav-Ivanovskij Zavod.
DEI: 1 Syntypus, Ural Katav, Urengai Mont.*urophthalmoidea* KULT, 1947 (*Clivina*)

(Čas. Čsl. Spol. Ent. 44, 34—35)

Brasilien, Matto Grosso, Corumba, ca. 30 Ex.; Holotypus, Paratypen, in Coll. KULT, Coll. BÄNNINGER, im Museum Paris, Museum Brüssel, DEI, etc.
DEI: 1 Paratypus, Corumba, Matt. Grosso.*usambaranus* BASILEWSKY, 1948 (*Anchomenus*)

(Mem. Soc. Ent. Belg. 25, 63—64)

7 (♂♂, ♀♀) Syntypen, Zentrogaly Territory, Usambara, ex Coll. KRAATZ, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Usambara, Coll. KRAATZ.

uzokensis OBENBERGER, 1922 (*Nebria*)

(Arch. Naturg. 82, A 4, 9)

Mehrere Syntypen, Zentralkarpathen, Dorf Sugó, am Rande eines Karpathenbaches, V. 1915, leg. OBENBERGER.

DEI: 1 Syntypus, Užok, Carpathes o., Guerre, 1915, leg. OBENBERGER.

Syn. zu *brevicollis* FABRICIUS, 1792.*vagamaculata* BREIT, 1914 (*Cymindis*)

(Koleopter. Rundsch. 3, 57—58)

Mehrere Syntypen, Krim, Jalla-Gebirge, Anfang VI., leg. WINKLER und MOCZARSKI.

DEI: 1 Syntypus, Krim, Jalla-Gebirge, leg. MOCZARSKI, Coll. LEONHARD.

validus SCHAUM, 1862 (*Zabrus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 6, 107—108)

Mehrere Syntypen, nördl. Griechenland, leg. KRUEPER.

DEI: 3 Syntypen, Graecia bor., Coll. SCHAUM.

vandykei DARLINGTON, 1930 (*Nebria*)

(Psyche, 37, 104—105)

♂ Holotypus und 1 Ex., Mount Rainier, Washington, nahe Paradise Valley, 6000 ft., 13., 18. VII. 1927, leg. DARLINGTON, in Coll. DARLINGTON; mehrere Ex. dito., 13.—20. VII. 1927: Paratypen.

DEI: 2 Paratypen, Mount Rainier, Washington, 13. VII. 1927, leg. DARLINGTON.

van emdeni SCHAUBERGER, 1932 (*Harpalus*)

(Wien. Ent. Ztg. 49, 34—36)

Holotypus, mehrere Paratypen, China, Peking, leg. STÖTZNER, im Museum Dresden, in Coll. STAUDINGER & BANG-HAAS, Coll. SCHAUBERGER, Coll. ANDREWES und Coll. JEDLIČKA.

DEI: 1 Ex. China, Peking, 2 Ex. Peking, Westberg, Exp. STÖTZNER: Paratypen.

variabilis ANDREWES, 1929 (*Dyschirius*)

(Faun. Brit. Ind. Coleopt. Carab. 1, 393, 405)

Bengal: Calcutta, leg. GRAVELY, im Indischen Museum; Sardah, leg. CHAMPION; United Provinces: West Almora, Ranikhet, Haldwani, Sitapur, leg. CHAMPION; Dehra Dun, leg. CAMERON; mehrere Paratypen, Holotypus, im Britischen Museum.

DEI: 1 Paratypus, India, Haldwani Dist., Kumaon, leg. CHAMPION.

vegetus ANDREWES, 1924 (*Mastax*)

(Miss. Babault, Prov. Centr. Inde, Carab. 110—111, Taf. 4, Fig. 5)

Indien, occ. Himalaya, 1914, Syntypen: mehrere Ex. Bajaura, Kangra distr., leg. BABAUT; mehrere Ex. Provinces Unies, Kumaon, W. Almora, leg. CHAMPION, 1 Ex. Nainital distr. Jalaban, im Indischen Museum, 2 Ex. Kumaon, Khairna und Phanduwalla, im Forest Res. Inst. Dehra Dun; mehrere Ex. Sikkim, Great Raajit Valley, Badantam, 2500 ft., Tista Bridge, 710 ft., Tista Valley, Birik, 625 ft., am Fluß Tista, leg. STEVENS.

DEI: 3 Syntypen, Br. Sikkim, Gopaldhara, leg. STEVENS (1 Ex. sehr schlecht erhalten).

vilcanota LIEBEK, 1934 (*Lebia*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 1, 276)

2 Syntypen, Peru, Vilcanota, Coll. KRAATZ, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

vilcanotanus BÄNNINGER, 1931 (*Taeniolobus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 4, 198—199)

♂ Holotypus, Peru, Vilcanota, 1 ♀, 1 Ex. dto., 1 ♂, ex Coll. BOILEAU, ohne Fundort, wahrscheinlich von STAUDINGER; im DEI, und in Coll. BÄNNINGER; Paratypen.

DEI: ♂ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

villae KRAATZ, 1858 (*Percus*)

(Wien. Ent. Monatsch. 2, 164)

Mehrere Syntypen; Piemont; Colomboel, leg. KRAATZ; an den Quellen der Trebia, leg. SPINOLA, im Museum Berlin.

DEI: 1 Syntypus, Pedemont, Coll. KRAATZ.

[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Piemont“, steht auf dem Etikett „Pedemont“.]

violacea SLOANE, 1907 (*Loxocara*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 181)

Holotypus, New Guinea, Kaiser Wilhelm Land, Sattelberg, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN; im DEI.

viridanus staudingerianus SCHAUERBERGER, 1932 (*Harpalus*)

(Wien. Ent. Ztg. 49, 42—44)

50 Syntypen, Westchina, Min-tschou, ex Coll. STAUDINGER & BANG-HAAS.

DEI: 1 Syntypus, China, Minchow.

[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Min-tschou“ steht auf dem Etikett „Min-chow“.]

viridescens REITTER, 1887 (*Agonum*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 31, 256)

Mehrere Syntypen, Attica, leg. EMGE.

DEI: 3 Syntypen, Attica, leg. EMGE, Coll. BRENSKE-Coll. FRANKLIN MÜLLER.

Syn. zu *extensem* MENETRIES, 1849.*viridicollis* KRAATZ, 1886 (*Eutelocarabus*)

(l.c. 30, 263)

Mehrere Syntypen, Suyfun-Mündung, leg. DÖRRIES, Amur, leg. CHRISTOPH; via STAUDINGER an KRAATZ.

DEI: 1 Ex. ohne Fundort, 2 Ex. Suyfun; Coll. KRAATZ, Syntypen.

Syn. zu *billbergi* MANNHEIMER, 1827.*viridipennis* BLEUZE, 1896 (*Carabus*)

(Misc. Ent. 4, 19)

Mehrere Syntypen, forêts des Côtes du Nord und du Finistère.

DEI: 1 Syntypus, Forêt de Lorges, Côtes du Nord, durch BLEUZE, Coll. LEONHARD.

Syn. zu *auronitens* FABRICIUS, 1792.*viridis* ANDREWES, 1933 (*Stiboma*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (10) 11, 410)

♂ Holotypus, Sumatra; im DEI [Coll. KRAATZ].

viridissimus KRAATZ, 1876 (*Procerus*)

(Bull. Soc. Nat. Mosc. 51, 139, 143)

3 Syntypen, Krim, via KRETSCHMAR an KRAATZ mitgeteilt; im DEI [Coll. KRAATZ].

Syn. zu *scabrosus* OLIVIER, 1795.*viriditinctus* SCHAUERBERGER, 1938 (*Acupalpus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 5, 49—50)

Holotypus, Java, Semarang, in Coll. SCHAUERBERGER, 2 Ex. dto., 2 Ex. Tjilatjap; 1 Ex. Vorderindien, Calcutta; 1 Ex. Hinterindien, Kambodja, leg. FRIEDERICHS; 1 Ex. Sumatra, ohne nähere Angabe: Paratypen, in Coll. SCHAUERBERGER und im DEI.

DEI: 1 Ex. Semarang, leg. DRESCHER, 1 Ex. Kambodja, leg. FRIEDERICHS: Paratypen.

vittatus BAUDI, 1864 (*Blechrus*)(Berl. Ent. Ztschr. 8, 203; nom. praeocc. = *baudi* FAIRMAIRE, 1892, Rev. d'Ent. 84)

Mehrere Syntypen, Cypern.

DEI: 1 Syntypus, Cypern, Coll. KRAATZ.

vranensis BREIT, 1904 (*Trechus*)

(Münch. K. Ztschr. 2, 28—29)

4 Syntypen, Herzegovina, Höhle des Vran-Gebirges, via v. BACHOFEN an BREIT.

DEI: 1 Syntypus, Herzegovina, Vran-plania, Coll. LEONHARD.

vulcanicum DARLINGTON, 1934 (*Bembidion*)

(Occ. Pap. Boston, Soc. Nat. Hist. 8, 157—158)

♂ Holotypus, M.C.Z. no. 19.625, Südabhang, Vulkan, Irazú, 2800—3000 m, 15. I. 1926, leg. NEVERMANN, 12 Paratypen
dto., in M.C.Z. und Coll. NEVERMANN.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

walteri REITTER, 1883 (*Pterostichus*)

(Wien. Ent. Ztg. 2, 224)

5 ♂♂, Syntypen, Montenegro, unfern der dalmatinischen Grenze, leg. WALTER.
DEI: 1 Syntypus, Dalmatien, Coll. FRANKLIN MÜLLER.

waltheri BASILEWSKY, 1932 (*Stictotefflus*)

(Ent. Bl. 28, 22)

D.O. Afrika: ♀ Holotypus, Songea, leg. v. BENNIGSEN; mehrere Paratypen, Upangwa, Lukuledi, Barikiwa (Donde-Gebiet); Zambezie; im Museum Stockholm, Museum Hamburg und in Coll. BASILEWSKY.
DEI: ♀ Holotypus, D.O. Afrika, Songea, leg. v. BENNIGSEN, Coll. v. BENNIGSEN.

whithillii HOPE, 1938 (*Catascopus*)

(The Coleopt. Manual, 164—165, Taf. 3, Fig. 2)

Mehrere Syntypen, Darpouille.

DEI: 1 Syntypus, Ind. bor., Coll. SCHAUM.

[Der Fundort Darpouille ist nicht aufzufinden!]

xanthochiton ANDREWES, 1922 (*Bembidium*)

(Ent. Monthly Mag. (3) 8 (58), 176—177)

Sikkim: Holotypus, Gopaldhara, in Coll. ANDREWES; Rangit Valley; leg. STEVENS; United Provinces: Kumaon, Upper Gumti Valley, Ranikhet, W. Almora, leg. CHAMPION; Mussoorie, Mossy Falls, Kemti Falls, leg. CAMERON, im For. Res. Inst.; Punjab: Simla Hills, Theog, 7600 ft., leg. CHATTERJEE, im For. Res. Inst.; mehrere Ex.; 1 Ex. Yunnan-fou, in Coll. ANDREWES; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Kumaon, Ranikhet, leg. CHAMPION.

zebii SCHAUM, 1857 (*Feronia*)

(Berl. Ent. Ztschr. 1, 140)

Mehrere Syntypen, Creta, leg. ZEBE.

DEI: 1 Syntypus (Ex. verliehen, konnicht überprüft werden).

Syn. zu *creticus* FRIVALDSZKY, 1845.**ziegleri** KRAATZ, 1883 (*Carabus*)

(Cat. Col. Europ., 5)

Mehrere Syntypen, Italia borealis.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. KRAATZ, ex Mus. Vien.

Syn. zu *cancellatus* ILLIGER, 1798.**zimmermanni** PUTZEY, 1875 (*Amara*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 18, Compt. rendus, 51)

Mehrere Syntypen, Japan, Nagasaki, 20. IV. 1874, Kioto, 7. V.—11. VI. 1874; leg. v. VOLXEM.

DEI: 2 Syntypen, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *chalcites* DEJEAN, 1828.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten:

alexanderi HEYDEN (*Callisthenes*)

DEI: 1 Type, Alexander-Gebirge, Coll. KRAATZ.

alpestris pedemontanus SCHWEIGER (*Trichotichnus*)

DEI: 5 Typen; Brenta, Coll. KRAATZ; Ct. Tessin Val Canaria, Coll. WAGNER.

andrewesi VAN EMDEN (*Taridina*)

DEI: 1 Type, O Java, Tengger, Nonkedjadjar.

biguttatus MOTSCHULSKY (*Lachriophorus*)

DEI: 1 Type, Columbia (Mndrstrn?), Coll. v. HEYDEN.

bodoanus REITTER (*Amara*)

DEI: 1 Type, Ost-Sibirien, Schilka-Gebirge, leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

caesius BREIT (*Brachynus*)

DEI: 2 Typen, S. W. Thibet, Po-o, Coll. LEONHARD.

chalcopterus SCHAUM (*Catascopus*)

DEI: 1 Type, Penang, Coll. SCHAUM.

conradti ALLUAUD (*Coptoderina*)

DEI: 1 Type, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

conradti ALLUAUD (*Tachys*)

DEI: 2 Typen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

corrusca DEJEAN (*Callida*)

DEI: 1 Type, Nov. Gran.

***dalmatinus grebcensis* WINKLER (*Neotrechus*)**

DEI: 1 Type, Kali pečina bei Grebčí.

***darlingtoni* JEDLIČKA (*Clivina*)**

DEI: 1 Type, Nose, Osaka, Coll. KULT.

***dives guadaramensis* WAGNER (*Chlaenius*)**

DEI: 3 Ex. Hispania, Coll. KRAATZ; 1 Ex. La Granja, leg. BRUCK, Coll. v. HEYDEN: Typen.

***dives kricheldorfii* WAGNER (*Chlaenius*)**

DEI: Asturien, Typen: 1 Ex. Puerto Pajares, leg. KRICHeldorf, Coll. KRAATZ; 1 Ex. Getschmn., 1879, Coll. v. HEYDEN.

***dyscolus* ALLUAUD (*Thyreopterinus*)**

DEI: 1 Type, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

***expansus* REITTER (*Pterostichus*)**

DEI: 1 Type, Jildus, Kulascha, Coll. KRAATZ.

***fasciolatum meridianum* APFELBECK (*Bembidion*)**

DEI: 2 Typen, Alb., Oroši.

***favanus* SCHAUM (*Rembus*)**

DEI: 1 Type, Java.

***flavipalpis* SAHLBERG (*Pterostichus*)**

DEI: 2 Typen, Dudinska, Tolstoinas, durch SAHLBERG, Coll. KRAATZ.

***guttatus* SCHAUFUSS (*Abacetus*)**

DEI: 1 Type, Afrika, Habab, Coll. KRAATZ.

***hyalinus* ANDREWES, (*Tachys*)**

DEI: 5 Typen, Ceylon, Nalanda, 1899, leg. HORN.

***incertus* SCHAUM? (*Pericalus*)**

DEI: 1 Type, Sing., Coll. KRAATZ.

***iridescentis* POPP (*Pterostichus*)**

DEI: 1 Type, Schigansk, Lena inter., durch POPPIUS, Coll. LEONHARD, Mus. Zool. H: fors.

***irregularis ottomanus* APFELBECK (*Pseudeochechenus*)**

DEI: 2 Typen, Bosnien, Vereš, durch APFELBECK.

***juldussana* REITTER (*Amara*)**

DEI: 1 Type, Seminitschye, Pryewaski, durch v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

***kodymi* KULT (*Clivina*)**

DEI: 1 Type, La Caja, 8 km w. San José, C.R., 1934, leg. SCHMIDT.

***koltzei* REITTER (*Sphodrus*)**

DEI: 2 Typen, Lappland, Tokmats, Coll. KOLTZE.

***laevicollis transalpinus* SCHWEIGER (*Harpaliscus*)**

DEI: 1 Type, Bosnien, Kosienica, Coll. LEONHARD.

***laevigatus venetus* GRIDELLI (*Scarites?*)**

DEI: 2 Typen, Lit. Albeconi, 15. VII. 1933, Venecia, durch GRIDELLI.

***mandti* JEDLIČKA (*Graniger*)**

DEI: 1 Type, Uferwiesen der Dschaz Morian-Senke, 31. III. 1950, leg. LÖFFLER, Iran-Exped.

***mesotincta* LIEBKE (*Callida*)**

DEI: 2 Typen, Paraguay, Hohenau, 5., 23. IX. 1937, leg. JACOB, Nr. 1752.

***minima* JEDLIČKA (*Rembus*)**

DEI: 2 Typen, China, Szechuan, Nitou Tatsienlu, durch REITTER.

***minor* ALLUAUD (*Parastrigia*)**

DEI: 1 Type, Moa, Coll. v. BENNIGSEN.

***nebrioides* POPP (*Pterostichus*)**

DEI: 1 Type, Lena arct., Bulun, durch POPPIUS, Coll. LEONHARD, Mus. Zool. H: fors.

***netolitzkyi* DUPUIS (*Tachys*)**

DEI: 13 Typen, Formosa, Akau, XII. 1907, leg. SAUTER.

***nigrina* KRAATZ (*Siagona*)**

DEI: 2 Typen, Aegypten, Coll. KRAATZ.

partita LECORDIER (*Siagona*)

DEI: 1 Type, Rhodesia, leg. BODONG, Coll. KRAATZ.

parvispinus REITTER (*Pseudotophoxenus*)

DEI: 1 Type, Jıldus, Kuldscha.

phila KOLBE (*Eccoptoptera*)

DEI: 1 Type, N.-Nyassa-See, Usafua, Beya-Berg, Sangwe-Fl., 9. VI. 1899, leg. GOETZE, Coll. KRAATZ.

platensis KULT (*Reicheia*)

DEI: 1 Type, ARG-La Plata, Rio Santiago, durch WEISER.

politus pseudinitidus WAGNER (*Dyschirius*)

DEI: 1 Type, Transcaspien, Merw, V. 1900, Coll. HAUSER.

polonicum MAKOLSKY (*Bembidion*)

DEI: 1 Type, Warszawa, Baniocha.

plaumannii LIEBKE (*Callida*)

DEI: 1 Typus, Paraguay, Hohenau, 29. IX. 1935, leg. JACOB, Nr. 1907.

priapus bulgaricus MEIXNER (*Trechus*)

DEI: 1 Ex. Bulgaria, Sofia, Vksosa pl., 30. V. 1908, leg. RAMBOUSEK, 1 Ex. Rila Geb., 15. VII. 1911, Coll. LEONHARD, Typen.

priapus rhodopensis MEIXNER (*Trechus*)

DEI: 2 Ex. Bulg. Rhodope Geb., 27. VIII. 1911, 2 Ex. dto. Xuchia Tschan, 8. VIII. 1911, 2 Ex. Bulg. Rila Kloster, 10. VII. 1911, 1 Ex. Bulg. Tschamkorija, 13. VI. 1911; leg. HILF, Coll. LEONHARD, Typen.

pseudarchangelicum REITTER (*Agonum*)

DEI: 1 Type, Karagatan.

pusillus DANIEL (*Aptinus*)

DEI: 1 Type, Asia-minor, Goek-Dagh, leg. v. BODEMEYER.

rugatifrons banningeri KULT (*Mesus*)

DEI: 1 Type, Paraguay, S. Antonio, Staz. Ent. Fabre.

sauteri LIEBKE (*Colliuris*)

DEI: 1 Type, Chikutobi, V. 1911, leg. SAUTER.

simplex SCHAUM (*Tachys*)

DEI: 1 Type, Celebes, Coll. GERMAR-SCHAUM.

superba ZOLOTAREW (*Nebria*)

DEI: 1 Type, Kaukasus centr. bor., Kluchov, 1912.

suturalis ALLUAUD (*Polyaulacus*)

DEI: 1 Type, Usambara, leg. WEISE, Coll. KRAATZ.

tardiformis REITTER (*Harpalus*)

DEI: 1 Type, Quellgebiet des Irkut, Nr. 586, Coll. KOLTZE.

violaceus salisburgensis KRAATZ (*Megadontus*)

DEI: 2 Typen, Salzburg, Coll. KRAATZ.

virgulifera CHAUDOIR (*Lebia*)

DEI: 1 Type, Brasil, Coll. SCHAUM.

weiratherianus SCHAU BERGER (*Harpalus*)

DEI: 1 Type, Galatiens-Phrygien, Emir-Dagh-Gbg. Asm. c. leg. WEIRATHER, Innsbruck.

yunnanus SEMENOW (*Broscus*)

DEI: 2 Typen, China, Prov. Szechuan, Gbg. b. Ningyuenfu.

Zusammenfassung

Für die in den Sammlungen des ehemaligen Deutschen Entomologischen Instituts befindlichen Typenexemplare der Käferfamilie Carabidae wird ein Katalog veröffentlicht.

Summary

A catalogue of the type specimens of the family Carabidae in the collections of the former Deutsches Entomologisches Institut is published.

Резюме

Публикуется каталог типовых экземпляров семейства Carabidae, находящихся в коллекциях бывшего Германского Энтомологического Института.