

Institut für Pflanzenschutzforschung
der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR zu Berlin
Bereich Eberswalde
Abteilung Taxonomie der Insekten
Eberswalde-Finow (DDR)

HELGA DÖBLER

Katalog der in den Sammlungen
der Abteilung Taxonomie der Insekten
des Institutes für Pflanzenschutzforschung,
Bereich Eberswalde
(ehemals Deutsches Entomologisches Institut),
aufbewahrten Typen — XX

(Coleoptera: Lycidae, Lampyridae, Cantharidae, Phengodidae, Drilidae,
Malachiidae, Karumiidae, Dasytidae, Melyridae, Cleridae, Lymexylonidae,
Derodontidae)

Lycidae

abjectus KLEINE, 1926 (*Dihammatus*)

(Philipp. Journ. Sc. 31, Nr. 1, 69–70, Taf. 2, Fig. 54, 55)

Mehrere Ex.: Luzon, Provinz Laguna, Mount Banahao, 2000 ft., leg. BAKER und BÖTTCHER; Mount Maquiling, leg. BAKER;
San Miguel, Provinz Samar; Mindoro, Calapan; leg. BÖTTCHER; Holotypus, Paratypen, im Museum Dresden und in Coll.
KLEINE.

DEI: 1 Paratypus, Luzon, Mt. Banahao.

abnormis KLEINE, 1926 (*Dilophotes*)

(l.c., 75–76, Taf. 3, Fig. 12–14)

42 ♂♂, 20 ♀♀, Syntypen, Luzon, Mount Banahao, Provinz Bataan, Mount Limay, Subprovinz Benguet, Baguio; leg. BAKER;
Subprovinz Amburayan, Butac, 1400 m, leg. BÖTTCHER; Mindanao, Provinz Surigao, Surigao, Provinz Lanao, Kolambugan,
leg. BAKER; Momongan, leg. BÖTTCHER; Sibuyan; Negros, Cuernos Gebirge; leg. BAKER; in Coll. KLEINE.
DEI: Syntypen, Luzon; 2 Ex. Surigao, 1 Ex. Amburayan.

absonus KLEINE, 1926 (*Trichalus*)

(l.c., 108, Taf. 4, Fig. 45, 46)

20 Syntypen: Luzon, Provinz Laguna, Mount Maquiling, Los Baños, leg. BAKER; Provinz Bataan, Lamao, leg. SCHULTZE
und BÖTTCHER; Provinz Nueva Vizcaya, Imugan, 4000 ft.; Mindoro, Calapan, Masbate, Aroroy; leg. BÖTTCHER; Sibuyan;
Panay; Negros, Cuernos Gebirge; leg. BAKER; in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Syntypus, Luzon, Mt. Makiline, leg. BAKER.

Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Mount Maquiling“ steht auf dem Etikett
„Mt. Makiline“.

acerbus KLEINE, 1925 (*Leptotrichalus*)

(l.c. 28, Nr. 2, 303–304, Taf. 1, Fig. 9, 11, 12)

Philippinen, Imugan, Provinz Nueva Vizcaya, Luzon, leg. BAKER; ♂ Holotypus, im Museum Dresden, 27 Paratypen, in
Coll. KLEINE und Coll. BAKER.

DEI: Paratypen, Luzon: 2 Ex. Mt. Banabas, 1 Ex. Imugan, 1 Ex. Lubwagan.

acutus KLEINE, 1925 (*Leptotrichalus*)

(l.c., 302–303, Taf. 1, Fig. 10, Taf. 2, Fig. 9)

1 ♂, 3 ♀♀, Philippinen, Los Baños, Mount Maquiling, Provinz Laguna, Luzon, Mount Banahao, leg. BAKER; Holotypus,
Paratypen, im Museum Dresden und in Coll. KLEINE.

DEI: 1 ♀, Paratypus, Luzon, Mt. Banahao.

adjunctus KLEINE, 1925 (*Leptotrichalus*)

(l.c., 307–308, Taf. 1, Fig. 18, Taf. 2, Fig. 17)

10 Syntypen, Philippinen, Mount Banahao, Luzon, Baguio, Provinz Benguet, Sibuyan, leg. BAKER, im Museum Dresden.
DEI: 1 Syntypus, Luzon, Imugan.

adventicius KLEINE, 1926 (*Bulenides*)
(l.c. 31, Nr. 1, 84—85, Taf. 3, Fig. 36)

24 ♂♂, 18 ♀♀, Syntypen: Mindanao, Provinz Surigao, Surigao, leg. BAKER, BÖTTCHER, Provinz Lanao, Kolambungan, Iligan, leg. BAKER, Momungan, leg. BÖTTCHER; Panaon, leg. BÖTTCHER: in Coll. KLEINE.
DEI: 2 Syntypen, Mindanao, Momungan.

adversarius KLEINE, 1925 (*Leptotrichalus*)
(l.c. 28, Nr. 2, 299, 301—302, Taf. 2, Fig. 5, 6)

Holotypus, Sumatra, im DEI [Coll. KRAATZ].¹

afflictus KLEINE, 1926 (*Ditoneces*)
(l.c. 31, Nr. 1, 61—62, Taf. 2, Fig. 21)

ca. 100 Syntypen: Luzon, Provinz Laguna, Mount Maquiling; Mindanao, Provinz Davao, Davao, Provinz Surigao, Surigao, Provinz Bukidnon, Tangkulan, Provinz Agusan, Butuan, Provinz Lanao, Kolambungan, Iligan, Provinz Zamboangan Dapitan; Negros, Cuernos Gebirge; Samar, leg. BAKER; Mindoro, Calapan; Mindanao, Momungan; leg. BÖTTCHER: in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Syntypus, Luzon, Mt. Bulawan.

amicus KLEINE, 1929 (*Trichalus*)
(Treubia 10, 477, Fig. 9, 68)

Syntypen, Nord-Queensland: 1 ♂, Cairns, leg. HACKER, im DEI, 1 ♀, Kuranda, leg. BRYANT, im Britischen Museum.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Cairns, leg. HACKER, Coll. HACKER.

amoenus KLEINE, 1929 (*Trichalus*)
(l.c., 479, Fig. 10)

1 ♂, 4 ♀♀, Syntypen, Nord-Queensland, Kuranda, leg. BRYANT, im Britischen Museum und DEI.
DEI: 1 ♀, Syntypus, Kuranda, leg. HACKER, Coll. HACKER.

angustus KLEINE, 1929 (*Trichalus*)
(l.c., 480, Fig. 17, 32)

Mehrere Syntypen, Queensland.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. HACKER.

animosus KLEINE, 1929 (*Trichalus*)
(l.c., 477, Fig. 31, 66, 71)

Mehrere Syntypen, Australien, ex Coll. KRAATZ, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Australien, Coll. KRAATZ.

apparatus KLEINE, 1929 (*Trichalus*)
(l.c., 481, Fig. 19, 20, 28, 77)

Mehrere Syntypen, Queensland, Coen Distr., Cape York, Cooktown, leg. HACKER, im DEI.
DEI: 2 Ex. Cooktown, 8 Ex. Queensland, Coen Distr., Cape York; leg. HACKER, Coll. HACKER, Syntypen.

atricollis KRAATZ, 1879 (*Dictyoptera*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 23, 125)

♀ Holotypus, Amur.

DEI: Der Holotypus ist verloren gegangen!

atricollis PIC, 1926 (*Dilophotes*)
(Ent. Mitt. 15, 68)

Holotypus, Formosa, leg. SAUTER, im DEI [Kosempo, 22. V. 1912].

bakeri KLEINE, 1926 (*Metanoeus*)
(Philipp. Journ. Sc. 31, Nr. 1, 99—100, Taf. 4, Fig. 38, 39)

70 ♂♂, 18 ♀♀, Luzon: Provinz Laguna, Mount Maquiling, Los Baños; Subprovinz Benguet, Baguio; leg. BAKER; Subprovinz Bontoc, Mount Polis, 2400 ft.; Subprovinz Kalinga, Balbalasan, 4000—5000 ft.; Provinz Sorsogon, Mount Bulusan; leg. BÖTTCHER; Mindanao: Provinz Agusan, Butuan; Iligan; Provinz Zamboanga, Zamboanga; Dapitan; Provinz Davao, Davao; leg. BAKER; Provinz Lanao, Kolambungan; Provinz Surigao, Surigao; leg. BAKER, BÖTTCHER; Momungan, Port Banga, leg. BÖTTCHER; Negros: Cuernos Gebirge, leg. BAKER; Basilan, leg. BAKER, BÖTTCHER; Dinagat, Leyte, Burauen, Santa Cruz, leg. BÖTTCHER: in Coll. KLEINE, Syntypen.
DEI: 2 Syntypen, Surigao.

bardus KLEINE, 1926 (*Libnetis*)
(l.c. 72—73, Taf. 3, Fig. 1—3)

2 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen: Luzon, Subprovinz Benguet, Baguio, leg. BAKER; Pauai, Haight's Place, leg. BÖTTCHER: in Coll. KLEINE.
DEI: 1 Syntypus, Luzon, Haightplace.

böttcheri KLEINE, 1926 (*Metriorrhynchus*)
(l.c., 80—81, Taf. 3, Fig. 25, 26)

18 ♂♂, 11 ♀♀, Syntypen, Luzon, Provinz Nueva Vizcaya, Imugan, 4000 ft., leg. BÖTTCHER, in Coll. KLEINE.
DEI: 1 Syntypus, Luzon, Imugan.

brevis KLEINE, 1926 (*Xylobanus*)
(l.c., 91—92, Taf. 4, Fig. 6—8)

21 Syntypen: Luzon, Provinz Laguna, Mount Maquiling, leg. BAKER; Los Baños, leg. VILLEGRAS; Mindanao, Provinz Lanao, Kolambungan; Iligan, Provinz Surigao, Surigao; leg. BAKER; Provinz Zamboanga, Port Banga, leg. BÖTTCHER; Negros, Cuernos Gebirge; Samar; leg. BAKER: in Coll. KLEINE.
DEI: 1 Syntypus, Mindanao, Momungan.

¹ In [] wurden die Angaben gesetzt, die sich auf den Etiketten befanden, in der Originalbeschreibung aber fehlten.

camerunus KLEINE, 1930 (*Xylobanus*)
(Rev. Zool. Bot. Afr. 19, 175–176, Fig. 7–10)

Mehrere Syntypen, Kamerun: Mundame, leg. ROHDE; Joh. Albrechtshöhe, leg. CONRADT; Sierra Leone, Njala, X. 1926, leg. HARGREAVES; Gold Coast, Aburi, 1912–13, leg. PATTERSON; Belg. Congo: Ituri, La Moto, Madyu, leg. BURGEON; Kindu, leg. BURGEON; Kibombo, 2.–11. X., leg. BEQUAERT; Seke, 26. VI. 1911, Eala, IX. 1912, leg. MAYNE; Kasai, Ngombe, 14. XI. 1921, leg. SCHOUTEDEN; Stanleyville à Kilo, leg. BURGEON; Kikwit, XI. 1920, Kisantu, leg. VANDERIJST; Mayumba, Tshela, 30. III. 1924, Tsenge-Kwimba, 4. X. 1924, leg. COLLART; Région de Sassa, leg. SAGONA; Beni, leg. BONNEVILLE; Bas-Uélé, Koteli, I. 1925, Arebi, Mondo-Mahé, 25.–28. VII. 1925, leg. SCHOUTEDEN; Congo da Lemba, leg. MAYNE; Ualka-Mawambili, leg. GRAUER; Ituri, Medje, IV. 1914, leg. CHRISTY; Mayumba, Makala N'Tete-Tuevo, 25. XI. 1915, Ganda-Sundi, VII. 1911, leg. MAYNE; Kasai, Ipamu, leg. VANDERIJST; Sandoa, 1. XI. 1920, leg. OVERLAET; Haut-Uélé, Moto, II.–III. 1923, leg. BURGEON.

DEI: Syntypen, Kamerun, Coll. KRAATZ: 11 Ex. Mundame, leg. ROHDE, 4 Ex. Johann.-Albrechtshöhe, 1896, leg. CONRADT.

captiosus KLEINE, 1927 (*Xylobanus*)
(Treubia 9, 303–304)

♀ Holotypus, Java, G. Papandajan, leg. DRESCHER und FRUHSTORFER, im DEI [Coll. KRAATZ].

castigatus KLEINE, 1927 (*Xylobanus*)
(I.c., 304–305)

♀ Holotypus, Sumatra, Coll. KRAATZ, im DEI.

cereus KLEINE, 1925 (*Leptotrichalus*)

(Philipp. Journ. Sc. 28, Nr. 2, 301, Taf. 2, Fig. 4)

4 ♂♂, Syntypen, Philippinen, Mindanao, Butuan, Surigao, Kolambungan, leg. BAKER.

DEI: 1 Syntypus, Mindanao, Momungan.

circumscriptus KLEINE, 1925 (*Leptotrichalus*)

(I.c., 307, Taf. 1, Fig. 17, Taf. 2, Fig. 15)

1 ♂, 5 ♀♀, Syntypen, Philippinen, Surigao, Mindanao, Butuan, leg. BAKER, in Coll. KLEINE.

DEI: 2 ♀♀, Syntypen, Surigao.

cognatus KLEINE, 1926 (*Metanoeus*)

(I.c. 31, Nr. 1, 100, Taf. 4, Fig. 40)

14 ♂♂, 14 ♀♀, Syntypen: Mindanao, Provinz Lanao, Kolambungan; Sibuyan; Negros, Cuernos Gebirge; Nordwest Panay; leg. BAKER, in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Syntypus, Island Sibuyan, leg. BAKER.

commendabilis KLEINE, 1926 (*Libnetis*)

(I.c., 71–72, Taf. 2, Fig. 58–60)

ca. 200 Syntypen: Luzon; Mount Banahao, 2000 ft., Provinz Camarines Sur, Mount Isarog, 4000 ft., Provinz Sorsogon, Mount Bulusan, Provinz Nueva Vizcaya, Imugan, 4000 ft., Subprovinz Kalina, Lubuagan; leg. BÖTTCHER; Provinz Laguna, Mount Maquiling, Los Baños; Mindanao; Provinz Lanao, Iligan, Provinz Zamboanga, Zamboanga; leg. BAKER, in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Syntypus, Luzon, Imugan.

confertus KLEINE, 1926 (*Protaphes*)

(Sarawak Museum Journ. 3, 364, Fig. 1–3)

3 ♂♂, 3 ♀♀, Syntypen, Philippines, Surigao, Mindanao, Butuan, Iligan, Coll. BAKER, in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Syntypus, Mindoro.

conradti KLEINE, 1926 (*Cautires*)

(Arch. Naturg. 92, A 12, 132, Taf. 2, Fig. 56, 57)

1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, Kamerun, Mundame, leg. ROHDE, CONRADT, im DEI.

DEI: 2 Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

consociatus KLEINE, 1926 (*Xylobanus*)

(Philipp. Journ. Sc. 31, Nr. 1, 97, Taf. 4, Fig. 33, 34)

Mehrere ♀♀, Syntypen: Luzon, Provinz Bataan, Lamao, leg. BÖTTCHER; Mindanao, Provinz Agusan, Butuan, leg. BAKER; Mindoro, Calapan, leg. BÖTTCHER; in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Syntypus, Luzon, Lubwagan.

conveniens KLEINE, 1926 (*Calochromus*)

(I.c., 41–42, Taf. 1, Fig. 3–8)

ca. 100 Syntypen: Luzon: Provinz Laguna, Mount Maquiling; Mount Banahao; Provinz Rizal, Montalban; Provinz Nueva Vizcaya, Imugan, 4000 ft.; Bayombong, 1000 ft.; Provinz Camarines Sur, Mount Isarog, 4000 ft.; Provinz Bataan, Limay; leg. BÖTTCHER; Sibuyan; leg. BÖTTCHER; Panaon, leg. BÖTTCHER; Negros, leg. BÖTTCHER; Cuernos Gebirge, leg. BAKER; Nakalang, leg. BANKS; Mindanao: Provinz Surigao, Surigao, leg. BAKER, BÖTTCHER; Provinz Lanao, Iligan, leg. BAKER; Kolambungan, leg. BAKER, BÖTTCHER; Momungan, leg. BÖTTCHER; Provinz Zamboanga, Dapitan, leg. BAKER; Port Banga, leg. BÖTTCHER; Provinz Agusan, Butuan, leg. BAKER; San Miguel, Provinz Samar, leg. BÖTTCHER; in Coll. KLEINE.

DEI: 2 Syntypen, Cuernos Mts., Negros, leg. BAKER.

croceus KLEINE, 1926 (*Metriorrhynchus*)

(I.c., 79, Taf. 3, Fig. 21–23)

20 Syntypen: Mindanao, Provinz Agusan, Butuan, Provinz Lanao, Kolambungan, leg. BAKER; Momungan, leg. BÖTTCHER; Provinz Surigao, Surigao, leg. BAKER, BÖTTCHER; Provinz Zamboanga, Dapitan, leg. BAKER; in Coll. KLEINE.

DEI: 2 Syntypen, Surigao.

debilis KLEINE, 1926 (*Libnetis*)

(I.c., 74, Taf. 3, Fig. 11)

27 Syntypen, Luzon: Provinz Laguna, Paete; Mindanao: Provinz Lanao, Momungan; leg. BÖTTCHER; Provinz Surigao, Surigao; Samar; leg. BAKER; in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Syntypus, Luzon, Anoburayan.

diffusimaculatus KLEINE, 1928 (*Metriorrhynchus*)
(Ent. Mitt. 17, 122, Fig. 10—14)

♀ Holotypus, Australien, Tam Mts., leg. HACKER, im DEI; 1 ♀, Paratypus, dto., in Coll. KLEINE.
DEI: ♀ Holotypus, Tam Mts., I. 1907, Coll. HACKER.

discolor KLEINE, 1926 (*Metriorrhynchus*)
(Nova Guinea 15, 112, Fig. 60)

♂ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, Neu-Guinea, Coll. KRAATZ, im DEI.

dolosus KLEINE, 1936 (*Plateros*)

(Arb. morph. tax. Ent. 3, 135—136, Fig. 11, 12)

Mehrere Syntypen, Java, K. O. Blawan, Idjen Plateau, 900—1500 m, III. 1934, leg. LUCHT, in Coll. KLEINE und im DEI.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 7. XII. 1933 (Datum nicht erwähnt).

dubitabilis KLEINE, 1925 (*Leptotrichalus*)

(Philipp. Journ. Sc. 28, Nr. 2, 302, Taf. 1, Fig. 6, Taf. 2, Fig. 7)

19 Syntypen, Philippinen: Sibulan, Mount Macquilaing; Luzon, Cuernos Gebirge; Negros, Polillo; leg. BAKER; Iligan, Butuan, Kolambungan, Zamboanga, Surigao, Dapitan; Mindanao, Nordwestliches Panay, Nueva Vizcaya; Basilan, Baguio, Benguet; in Coll. KLEINE.
DEI: 2 Syntypen, Luzon, Mt. Banahao.

elutus KLEINE, 1926 (*Metriorrhynchus*)

(Nova Guinea 15, 100, Fig. 14, 15)

Mehrere Syntypen: Neu-Guinea, Pauwi, leg. MOSZKOWSKI; Deutsch Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland, Hatzfeldhafen, leg. GRABOWSKY, Mänderberg, 21.—30. VIII. 1913, Lager am Lehmfluß, IV.—V. 1913, Hauptlager bei Malu, 2. II. 1913; leg. BÜRGERS; Holl. Neu-Guinea, Kapaur, leg. FRUHSTORFER, Bivak Eiland, 1. X., leg. LORENTZ; Roon, leg. FRUHSTORFER, Aru-Inseln, Ureinung, leg. RIBBE; im Museum Natura Artis Magistra und im DEI.
DEI: Syntypen, Coll. KRAATZ: 1 Ex. Neu-Guinea, 1 Ex. Roon, ex Coll. FRUHSTORFER; 2 Ex. Holl. N. Guinea, Kapaur, leg. FRUHSTORFER.

enganicus KLEINE, 1939 (*Metriorrhynchus*)

(Treubia 17, 5)

15 ♀♀, Enggano, V.—VII. 1936, leg. DE JONG; Holotypus, im Museum Leiden, Paratypen, in Coll. KLEINE.
DEI: 1 ♀, Paratypus, Enggano I., alt V.—VII. 1936, Meok, leg. DE JONG.

exornatus KLEINE, 1926 (*Metriorrhynchus*)

(Nova Guinea 15, 105, Fig. 32, 33)

1 ♂, 2 ♀♀, Holotypus, Paratypen, Neu-Guinea, Coll. KRAATZ, im DEI und in Coll. KLEINE.
DEI: ♂ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, Neu-Guinea, Coll. KRAATZ.

explicatus KLEINE, 1926 (*Hemiconderis*)

(l.c., 162—163, Fig. 224)

♂ Holotypus, Neu-Guinea, Coll. KRAATZ, im DEI.

exploratus KLEINE, 1926 (*Cautires*)

(Philipp. Journ. Sc. 31, Nr. 1, 82—83, Taf. 3, Fig. 30, 31)

10 ♂♂, 3 ♀♀, Syntypen: Luzon, Subprovinz Bontoc, Mount Polis, 2400 ft., Subprovinz Kalinga, Balbalasan, 5000 ft., leg. BÖTTCHER; Provinz Nueva Vizcaya, Imugan, 4000 ft.; Mindanao, Provinz Surigao, Surigao; leg. BAKER, BÖTTCHER; Samar, leg. BAKER; in Coll. KLEINE.
DEI: 1 Syntypus, N. Luzon, Bontoc.

femoralis KLEINE, 1925 (*Leptotrichalus*)

(l.c. 28, Nr. 2, 309, Taf. 1, Fig. 22—24)

29 ♂♂, 3 ♀♀, Syntypen, Philippinen; Mindanao, Surigao, Kolambungan, Iligan, Butuan, leg. BAKER, in Coll. KLEINE.
DEI: Syntypen: 2 Ex. Mindanao, Momungan, Surigao; 1 Ex. Fundort nicht lesbar.

formosanus PIC, 1926 (*Melanurus*)

(Ent. Mitt. 15, 67—68)

♂ Holotypus, Formosa, leg. SAUTER, im DEI [Taihorin, 22. VII.].

formosanus PIC, 1921 (*Plateros*)

(Echange, Nr. 405, hors texte 7)

Mehrere Syntypen, Formosa.
DEI: Syntypen, Formosa, leg. SAUTER: 3 Ex. Banshoryo-Distr., Sokutsu, 7. VII., 7. VIII. 1912; 3 Ex. Kankau, Koshun, V., VII. 1912.

fragilis KLEINE, 1926 (*Cladophorus*)

(Philipp. Journ. Sc. 31, Nr. 1, 81—82, Taf. 3, Fig. 27, 28)

25 ♂♂, 20 ♀♀, Syntypen: Mindanao, Provinz Lanao, Iligan, Provinz Zamboanga, Dapitan, Provinz Bukidnon, Provinz Zamboanga, Zamboanga; leg. BAKER; Kolambungan, Provinz Surigao, Surigao, leg. BAKER, BÖTTCHER; Provinz Agusan Cababagan, leg. WEBER; Port Banga, leg. BÖTTCHER; Basilan, leg. BAKER; Samar, Catbalogan, leg. BAKER, BÖTTCHER; Negros, Cuernos Gebirge, leg. BAKER; in Coll. KLEINE.
DEI: 1 Syntypus, Surigao.

fragilis KLEINE, 1936 (*Plateros*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 136, Fig. 14, 15)

Mehrere Syntypen, Java, K. O. Blawan, Idjen Plateau, 900—1500 m, V. 1934, leg. LUCHT, in Coll. KLEINE und im DEI.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 20.—26. V. 1934.

franklinmülleri KLEINE, 1928 (*Metriorrhynchus*)
(Ent. Mitt. 17, 121, Fig. 1–4)

♂ Holotypus, 3 ♀, Paratypen, Queensland, ex Coll. F. MÜLLER, im DEI und in Coll. KLEINE.
DEI: ♂ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, Queensland, Coll. F. MÜLLER.

frivolus KLEINE, 1926 (*Lycostomus*)
(Philipp. Journ. Sc. 31, Nr. 1, 48–44, Taf. 1, Fig. 10–12)

210 ♂♂, 126 ♀♀, Syntypen: Luzon, Provinz Camarines Sur, Mount Isarog, 4000 ft., Provinz Nueva Vizcaya, Bayombong, 1000 ft., leg. BÖTTCHER; Provinz Laguna, Los Baños, Mount Maquiling, leg. BAKER; Mindanao, Provinz Davao, Davao, Provinz Surigao, Surigao, leg. BAKER; Provinz Lanao, Momungan, leg. BÖTTCHER; Samar, leg. BAKER; San Miguel, Provinz Samar, leg. BÖTTCHER; in Coll. KLEINE.
DEI: 2 Syntypen, San Miguel.

jumosus KLEINE, 1926 (*Eniclasses*)
(Nova Guinea 15, 182, Fig. 271)

Mehrere Syntypen, Neu-Guinea, Taura, 4.–17. VII. 1910, leg. MOCZKOWSKY, Kapaur, leg. FRUHSTORFER.
DEI: 1 Syntypus, Holl. N. Guinea, Kapaur, leg. FRUHSTORFER, Coll. KRAATZ.

hackeri KLEINE, 1928 (*Metriorrhynchus*)
(Ent. Mitt. 17, 121, Fig. 5–9)

1 ♂, 8 ♀♀, Australien, Tam. Mts., leg. HACKER; Holotypus, Paratypen, im DEI und in Coll. KLEINE.
DEI: ♂ Holotypus, 5 ♀♀, Paratypen, Tam. Mts., II. 1906, Coll. HACKER.

hackeri KLEINE, 1933 (*Xylobanus*)
(Stett. Ent. Ztg. 94, 11, Fig. 76–79)

♂ Holotypus, Australien, Tam. Mts., Blackall, leg. RANGE, im DEI; 1 ♂, Paratypus, dto.
DEI: ♂ Holotypus, Tam. Mts., XI. 1906, Nr. 491, Coll. HACKER.

hirsutus KLEINE, 1926 (*Trichalus*)
(Nova Guinea 15, 173, Fig. 247)

Holotypus, mehrere Paratypen; Neu-Guinea, Coll. KRAATZ; Südost Neu-Guinea, Fiume Purari, I. 1914, leg. LORIA.
DEI: 1 Paratypus, Neu-Guinea, Coll. KRAATZ.

hogei PIC, 1930 (*Calopioner*)
(Ann. Soc. Ent. Fr. 99, 323)

Mehrere Syntypen, Mexico, leg. HOGE, Coll. KRAATZ, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Mexico, leg. HOGE, Coll. KRAATZ.

humeralis KLEINE, 1926 (*Cladophorus*)
(Nova Guinea 15, 130–131, Fig. 123–126)

Mehrere Syntypen, Holl. Neu-Guinea, Kapaur, leg. FRUHSTORFER.
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

ignotus KLEINE, 1936 (*Trichalus*)
(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 133–135)

Mehrere Syntypen, Java, G. Tangkoeban Prahoe, 4000–5000', Preanger, leg. DRESCHER, in Coll. KLEINE und im DEI.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 24. IV.–9. V. 1933.

impressicollis KLEINE, 1926 (*Cautires*)
(Arch. Naturg. 92, A 12, 140, Taf. 3, Fig. 85, 86)

1 ♂, 3 ♀♀, Syntypen, Usambara, im DEI.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Usambara, Coll. KRAATZ.

irregularis KLEINE, 1926 (*Cautires*)
(Arch. Naturg. 92, A 12, 132–133, Taf. 2, Fig. 58–60)

5 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Kamerun, Mundame, leg. ROHDE, CONRADT, im DEI.
DEI: 3 Ex. Kamerun, leg. CONRADT, 5 Ex. Kamerun, Mundame, leg. ROHDE; Coll. KRAATZ (nur 2 Ex. wurden vom Autor als Typen gekennzeichnet); Syntypen.

jaranus KLEINE, 1926 (*Leptotrichalus*)
(Treubia 9, Nr. 4, 313, Taf. 7, Fig. 70)

2 ♂♂; 4 ♀♀, Syntypen; Java, Tjibodas, 1400–1500 m, im Museum Buitenzorg, Preanger, leg. SJITHOFF, im Museum Leiden.
DEI: Tjibodas, 1400 m, VIII. 1921, No. 270, ex Museum Buitenzorg, 1 Syntypus.

lateapicale PIC, 1932 (*Mesopteron*)
(Rev. Soc. Ent. Argent. 7, Nr. 21, 3)

Holotypus, Bolivie, Yungas, durch GERMAIN, Coll. KRAATZ, im DEI.

longepilosus KLEINE, 1928 (*Metriorrhynchus*)
(Ent. Mitt. 17, 122–123, Fig. 15–18)

1 ♂, 5 ♀♀, Queensland, Coen Distr., Cape York, leg. HACKER; Holotypus, Paratypen, im DEI und in Coll. KLEINE.
DEI: ♂ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. HACKER.

longissimum PIC, 1931 (*Mesopteron*)
(Echange 56, Nr. 443, hors texte 95)

Holotypus, Bolivien, Yungas, durch GERMAIN, Coll. KRAATZ; im DEI.

longithorax KLEINE, 1926 (*Cautires*)
(Arch. Naturg. 92, A 12, 140, Taf. 3, Fig. 81, 82)

♂ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI; 1 ♂, Paratypus, dto.
DEI: ♂ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

malignus KLEINE, 1936 (*Calochromus*)
(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 139–140, Fig. 31)

Mehrere Syntypen, Java, G. Tangkoeban Prahoe, 4000–5000', Preanger, IV. 1934, leg. DRESCHER, in Coll. KLEINE und im DEI.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, IV. 1936 (nicht 1934!).

marcidus KLEINE, 1926 (*Trichalus*)
(Nova Guinea 15, 175, Fig. 252, 253)

2 ♂♂, 6 ♀♀, Holotypus, Paratypen, Neu-Guinea, Dilo, VI.–VII., leg. LORIA, im Museum Genua, in Coll. KLEINE und Coll. KRAATZ.
DEI: 4 Paratypen, Neu-Guinea, Coll. KRAATZ.

metzleri PIC, 1935 (*Haplobothis*)
(Mél. Exot. Ent. 66, 6)

Mehrere Syntypen, Brésil, São Paulo, via MELZER an KLEINE.
DEI: 1 Syntypus, Bras., São Paulo, durch MUUS und MELZER.

micans KLEINE, 1926 (*Cladophorus*)
(Nova Guinea 15, 136–137, Fig. 150)

Holotypus, 1 Paratypus, Neu-Guinea, Astrolabe Bay, Roon, leg. FRUHSTORFER, im Museum Berlin.
DEI: ♀ Holotypus, N. Guinea, Astrolabe-B., durch ROHDE.

minutus PIC, 1932 (*Emplectus*)
(Rev. Soc. Ent. Argent. 7, 5)

Holotypus, Bolivie, Yungas, durch GERMAIN, Coll. KRAATZ, im DEI.

nanus KLEINE, 1933 (*Cladophorus*)
(Stett. Ent. Ztg. 94, 7, Fig. 42–44)

♂ Holotypus, 2 ♂♂, Paratypen, Kamerun, leg. CONRADT, in Coll. KLEINE.
DEI: 1 Paratypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

nigricauda KLEINE, 1928 (*Metriorrhynchus*)
(Ent. Mitt. 17, 123–124, Fig. 24–27)

2 ♀♀, Holotypus, Paratypus, Queensland, Cape York, Coen District, leg. HACKER, im DEI und in Coll. KLEINE.
DEI: ♀ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

nigricolle PIC, 1932 (*Cyptopteron*)
(Rev. Soc. Ent. Argent. 7, Nr. 21, 2)

Holotypus, Bolivie, Yungas, durch GERMAIN, Coll. KRAATZ, im DEI.

nigrimembris PIC, 1922 (*Xylobanus*)
(Echange, Nr. 407, hors texte 16)

Mehrere Syntypen, Formosa.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Taihorin, leg. SAUTER.

nigroapicalis PIC, 1935 (*Haplobothis*)
(Mél. Exot. Ent. 66, 7)

Mehrere Syntypen, Brésil, São Paulo, ex MELZER, via KLEINE an PIC.
DEI: 1 Syntypus, Bras., São Paulo, leg. MUUS und MELZER.

nigrostriatus KLEINE, 1926 (*Ditoneces*)
(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 136–137, Fig. 16, 17, 19)

Mehrere Syntypen, Java, G. Tangkoeban Prahoe, 4000–5000', Preanger, III.–IV. 1934, leg. DRESCHER, in Coll. KLEINE und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, VI. 1934 (Datum nicht erwähnt!).

nigrostriatus KLEINE, 1926 (*Parapyropterus*)
(Stett. Ent. Ztg. 87, 104)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Formosa, Hoozan, III. 1910, Kosempo, VII. 1909, leg. SAUTER.
DEI: 1 ♀, Syntypus, Formosa, Kosempo, VII. 1909, leg. SAUTER.

opacus PIC, 1921 (*Litmetis*)
(Mél. Exot. Ent. 33, 14)

Mehrere Syntypen, Formosa.

DEI: 13 Syntypen, Sokutsu, Banshoryo Distr., 7. VI. 1912, leg. SAUTER.

ordinarius KLEINE, 1926 (*Plateros*)
(Philipp. Journ. Sc. 31, Nr. 1, 47, Taf. 1, Fig. 18–19)

18 Ex., Luzon; Provinz Laguna, Mount Maquiling, leg. BAKER; Mindanao; Provinz Davao, Davao, leg. BAKER; Provinz Surigao, Surigao, leg. BAKER; BÖTTCHER; Provinz Lanao, Kolambungan, Provinz Agusan, Butuan, leg. BÖTTCHER; Leyte, Santa Cruz; leg. BÖTTCHER; Holotypus, Paratypen, in Coll. KLEINE.
DEI: 1 Paratypus, Mindanao, Surigao.

pallens KLEINE, 1926 (*Cautires*)
(Arch. Naturg. 92, A 12, 128, Taf. 1, Fig. 36)

3 ♀♀, Kamerun, leg. CONRADT; Paratypen, Holotypus, im DEI.

DEI: ♀ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

paradoxa MJÖBERG, 1925 (*Duliticola*)
(Psyche 32, 134–135, Fig. 1, Taf. 3, Fig. 2a, 2b, Taf. 4)

Mehrere Syntypen, Sarawak, Mt. Batu Gading near Lundu, 1500–3000 ft., 1924, leg. MJÖBERG.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Sarawak, Mt. Batu Gading near Lundu, 1500–3000 ft.

paululus KLEINE, 1926 (*Xylobanus*)

(Philipp. Journ. Sc. 31, Nr. 1, 93–94, Taf. 4, Fig. 15–18)

Mehrere Ex.; Luzon, Provinz Laguna, Paete, leg. BÖTTCHER; Mount Maquiling, leg. BAKER; Mindanao, Provinz Lanao, Momungan, leg. BÖTTCHER; Negros, Canlaon Volkam, leg. BANKS; Paratypen, Holotypus, in Coll. des Bureau of Science zu Manila und in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Paratypus, Luzon, Mt. Banahao.

pectinicornis KRAATZ, 1879 (*Cerceros*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 23, 127, Taf. 2, Fig. 2b)

Mehrere ♂♂, Syntypen, Amur.

DEI: 2 ♂♂, Syntypen, Amur, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *flabellatus* MOTSCHULSKY, 1860.*pilosus* KLEINE, 1926 (*Stereotrichalus*)

(Nova Guinea 15, 185, Fig. 277, 278)

♂ Holotypus, Holl. Neu-Guinea, Kapaur, leg. FRUHSTORFER, im DEI [Coll. KRAATZ].

pinguis KLEINE, 1937 (*Merolyces*)

(Ann. Mus. Congo 3, sect. 2, fasc. 6, 97, Fig. 232, 233)

Holotypus, Congo, Albertville, XII. 1918, leg. MAYNÉ, im Musée du Congo; mehrere Paratypen, Eala, leg. CORBISIER, Poko, leg. FLORIDON, Kwesi à Kilo, leg. BAYER, Lusuku, leg. QUARRÉ, Kaniamba, leg. MASSART.

DEI: 1 Paratypus, Kwesi à Kilo, 10.–19. IV. 1911, leg. BAYER, Musée du Congo, Nr. 2425.

pusillus KLEINE, 1926 (*Cautires*)

(Arch. Naturg. 92, A 12, 133, Taf. 2, Fig. 62, 63)

8 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, Kamerun, Togo, leg. CONRADT, Usambara, Nguelo.

DEI: Syntypen: 1 Ex. Kamerun, 1 Ex. Togo, leg. CONRADT; 7 Ex. Usambara, Nguelo; Coll. KRAATZ.

pusillus KLEINE, 1928 (*Metriorrhynchus*)

(Ent. Mitt. 17, 124–125, Fig. 28–31)

5 ♂♂, Queensland, Coen District, Cape York, leg. HACKER; Holotypus, Paratypen, im DEI und in Coll. KLEINE.

DEI: ♂ Holotypus, 3 ♂♂, Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

queenslandicus KLEINE, 1928 (*Metriorrhynchus*)

(l.c., 123, Fig. 19–23)

Holotypus, 1 Paratypus, Süd-Queensland, Blackal, im DEI und in Coll. KLEINE.

DEI: Holotypus, Blackal, Range, Nr. 495, Coll. HACKER.

rarus KLEINE, 1936 (*Dihammatus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 138, Fig. 26)

Mehrere Syntypen, Java, G. Tangkoeban Prahoe, 4000–5000', III.–XI. 1933, Preanger, leg. DRESCHER, in Coll. KLEINE und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

redundans KLEINE, 1936 (*Plateros*)

(l.c., 135, Fig. 7, 8)

Mehrere Syntypen, Java, K. O. Blawan, Idjen Plateau, 900–1500, I. 1934, leg. LUCHT, in Coll. KLEINE und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 8. I. 1934.

reticulatus KLEINE, 1926 (*Cladophorus*)

(Nova Guinea 15, 143, Fig. 172, 173)

♀ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, Batjan, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

DEI: ♀ Holotypus, Batjan, VIII.–IX., ex Coll. FRUHSTORFER, Coll. KRAATZ.

rufiventris KRAATZ, 1879 (*Dictyoptera*)(Dtsch. Ent. Ztschr. 23, 125; nom. praeocc. = *kraatzi* BOURGEOIS, 1882, Abeille 20, 117)

Mehrere Syntypen, Amur, Külek, leg. CHRISTOPH, durch LEDER.

DEI: 1 Syntypus, Külek, Coll. KRAATZ.

rusticus KLEINE, 1936 (*Plateros*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 135)

Mehrere Syntypen, Java, K. O. Blawan Idjen Plateau, 900–1500 m, 20.–26. V. 1934, leg. LUCHT, in Coll. KLEINE und im DEI.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

sanguinosus KLEINE, 1951 (*Calochromus*)

(Ent. Bl. 45–46 (1949–50), 24)

Holotypus, mehrere Paratypen, China, Provinz Fukien, 27, 40° n. Br., 117, 40° s. L., 2300 m Seehöhe, Kuatun, 22. III., 15. IV. 1938, leg. KLAPPERICH, im Museum KOENIG, Bonn und im DEI.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 22. III. 1938.

siccus KLEINE, 1936 (*Xylobanus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 133)

Mehrere Syntypen, Java, G. Raoeng „Bajoekidoel“, 450–700 m, I.–II. 1933, leg. LUCHT, in Coll. KLEINE und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1.–20. II. 1932.

similis KLEINE, 1926 (*Cautires*)

(Arch. Naturg. 92, A 12, 137, Taf. 3, Fig. 71)

1 ♂, 7 ♀♀, Kamerun, Mundame, leg. ROHDE, CONRADT; Usambara; im DEI, Syntypen.

DEI: Syntypen, Coll. KRAATZ: 3 Ex. Kamerun, leg. CONRADT, 2 Ex. Kamerun, Mundame, leg. ROHDE, 1 Ex. Usambara.

strambeanus KLEINE, 1933 (*Ditoneces*)
(Stett. Ent. Ztg. 94, 16—17, Fig. 127—129)

1 ♂, 2 ♀, Sumatra, Si Rambé, leg. MODIGLIANI; Paratypen, Holotypus, in Coll. KLEINE und im DEI.
DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, XII. 1890—III. 1891, Coll. KRAATZ.

sondaicus KLEINE, 1927 (*Calochromus*)
(Treubia 9, 293, Taf. 6, Fig. 2, 6, 7, 9)

♂ Holotypus, 2 ♀, Paratypen, Sunda-Inseln, in Coll. KLEINE und im Museum Buitenzorg.
DEI: 1 Paratypus, Java, ex Museum Buitenzorg.

suturalis KLEINE, 1926 (*Procautires*)
(Nova Guinea 15, 159, Fig. 213—215)

♂ Holotypus, 2 ♂ Paratypen, Neu-Guinea, Astrolabe-Bay, leg. ROHDE, Coll. KRAATZ, in Coll. KLEINE und im DEI.
DEI: Paratypen, Coll. KRAATZ: 1 ♂, Neu-Guinea, 1 ♂, N. Guinea, Astrolabe-B., leg. ROHDE.

tenebricosus KLEINE, 1928 (*Metriorrhynchus*)
(Ent. Mitt. 17, 125, Fig. 32—34)

♀ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, Queensland, Coen District, Cape York, leg. HACKER, im DEI und in Coll. KLEINE.
DEI: ♀ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

tenuis KLEINE, 1936 (*Xylobanus*)
(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 133)

Mehrere Syntypen; Java, Kendeng Geb., VI. 1932; K. O. Blawan, Idjen Plateau, 900—1500 m, VI. 1933; leg. LUCHT, in Coll. KLEINE und im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Java, K. O. Blawan, Idjen Plateau, 900—1500 m, VI. 1933, leg. LUCHT.

transversithorax KLEINE, 1936 (*Libnetis*)
(l.c., 137, Fig. 21)

Mehrere Syntypen, Java, G. Raoeng, „Bajoekidoel“, 450—700 m, leg. DRESCHER, in Coll. KLEINE und im DEI.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 15. I. 1933.

versicolor KLEINE, 1928 (*Eniclasses*)
(Nova Guinea 15, 182, Fig. 270)

♂ Holotypus, Neu-Guinea; im DEI, Coll. KRAATZ.

wittei KLEINE, 1937 (*Acantholyucus*)
(Expl. Parc Nat. Albert, Miss. DE WITTE, 8, 7, Fig. 10, 11)

Holotypus, 32 Paratypen, Congo, Rutshuru, 1.285 m, 22. V.—1. VI., 12.—16., 20.—24. VI. 1934/1.—15. I., 7.—24. VI.
1935, Miss. DE WITTE, im Museum Congo und in Coll. KLEINE.
DEI: 1 Paratypus, Rutshuru, 17.—20. VI. 1934, leg. DE WITTE, Parc Nat. Albert, ex Musée du Congo, Nr. 438.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten

absurdus KLEINE (*Trichalus*)
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Typen, Sumatra, Siboga, X. 1890—III. 1891, leg. MODIGLIANI, Coll. KRAATZ.

atrithorax PIC (*Lycus*)
DEI: 1 Typus, Mexico, Coll. KRAATZ.

bilineaticollis PIC (*Metapleron*)
DEI: 1 Typus, Amazon, Coll. KRAATZ.

flavus PIC (*Lycus*)
DEI: 1 Typus, Mexico, Coll. KRAATZ.

kraatzi PIC (*Emplectus*)
DEI: 1 Typus, Peru, Vilcanota, Coll. KRAATZ.

longepectinalis PIC (*Calleros*)
DEI: 1 Typus, Bolivien, Yungas, durch GERMAIN, Coll. KRAATZ.

Lampyridae

consors OLIVIER, 1909 (*Lucidota*)
(Bull. Soc. Ent. Fr., 35)

Mehrere Syntypen, Peru, Marcapata, Brasilien, Espírito Santo.
DEI: 2 Syntypen, Peru, Marcapata, Coll. KRAATZ.

filiformis OLIVIER, 1913 (*Luciola*)
(Ent. Mitt. 2, 271)

Mehrere Syntypen, Formosa, Kosempo, Kankau, leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 7. VI. 1912, leg. SAUTER.

impolita OLIVIER, 1913 (*Luciola*)
(l.c., 271)

Mehrere Syntypen, Formosa, Koshun, leg. SAUTER.
DEI: 4 Syntypen, Formosa, Kankau, Koshun, VII. 1912, leg. SAUTER.

mundula OLIVIER, 1913 (*Luciola*)
(I.c., 271)

Holotypus, Formosa, Kankau, leg. SAUTER; im DEI [Koshun, VII. 1912].

tristicolor OLIVIER, 1909 (*Lucidola*)
(Bull. Soc. Ent. Fr., 36)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Espirito Santo.
DEI: 1 Syntypus, Espirito Santo, Coll. KRAATZ.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten

nanus SCHAUFUSS (*Photinus*)
DEI: 3 Typen, N. Granada, Coll. SCHAUFUSS.

reitteri HICKER (*Pyrocaelia*)
DEI: 3 Typen, N. W. China, Tienmuschan, RTT.

Cantharidae

albithorax PIC, 1915 (*Chauliognathus*)
(Bull. Soc. Zool. Fr. 40, 95)

Mehrere Syntypen, Nouvelle-Guinée.
DEI: 1 Syntypus, D. N. Guinea, Deutsch-holländ. Grenze.

albocincticolle PIC, 1936 (*Discodon*)
(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 131)

Mehrere Syntypen, Costa Rica, La Caja, bei San José, leg. H. SCHMIDT, im DEI und in Coll. PIC.
DEI: 1 Syntypus, C. R., La Caja, San José, 8 k/w, 1934.

anatolica BOURGEOIS, 1900 (*Cantharis*)
(In: BODEMEYER, E. V.: Quer durch Kleinasiens in den Bulghar Dagh, 152–153)

Mehrere Syntypen, Biledjek, Eski-Chéhir.
DEI: 1 ♂, Asia minor, Biledjek, 1 Ex. Eski-Chéhir; leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD, Syntypen.

anatolica DAHLGREN, 1968 (*Rhagonycha*)
(Ent. Bl. Biol. Syst. Käf. 64, 110–111, Fig. 8 A, B)

Holotypus, Kleinasiens, Amasia, 1888, leg. KORB, Coll. KRAATZ, im DEI.

apicorne PIC, 1911 (*Plectonotum*)
(Echange 27, Nr. 323, 179–180)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.
DEI: 2 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, Coll. KRAATZ.

astur HEYDEN, 1880 (*Cantharis*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 24, 298)

5 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, Arvas Asturia, 1879, leg. GETSCHMANN, in Coll. v. HEYDEN.
DEI: 3 Syntypen, Asturia, 1879, leg. GETSCHMANN.

atripennis PIC, 1922 (*Malthinus*)
(Méli. Exot. Ent. 36, 30; nom. praeocc. = *nigripennis* PIC, 1938, Bull. Soc. Ent. Fr., 121)

Mehrere Syntypen, Formosa.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Hokuto, III. 1912, leg. SAUTER.

atropacus PIC, 1937 (*Athemus*)
(Ent. Bl. 33, 62–63)

Holotypus, Formosa, Chosokei, leg. SAUTER, im DEI [1914].

bifurcatus KIESENWETTER, 1852 (*Malthodes*)
(Lin. Ent. 7, 297–298, Taf. 2, Fig. 17)

Mehrere Syntypen, Sizilien, leg. SCHIÖDTE und ZELLER.
DEI: Syntypen, Coll. STIERLIN: 2 Ex. Sizilien, 1 Ex. ohne Fundort.

bilateralis PIC, 1927 (*Polemius*)
(Ent. Mitt. 16, 250)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.
DEI: 1 Syntypus, Bolivien, leg. GERMAIN.

bodemeyeri BOURGEOIS, 1900 (*Cantharis*)
(In: BODEMEYER, E. V.: Quer durch Kleinasiens in den Bulghar Dagh, 152–153)

Mehrere Syntypen, Burna, Bulghar-Dagh.
DEI: 1 ♀, Syntypus, Asia minor, Bulghar-Dagh, leg. v. BODEMEYER.

bodemeyeri DAHLGREN, 1968 (*Rhagonycha*)
(Ent. Bl. Syst. Käf. 64, 115, Fig. 14 C, D)

Holotypus, Asia minor, Burna, Taurus, 1899, leg. v. BODEMEYER, im DEI.

bocicus KIESENWETTER, 1863 (*Malthodes*)

(In: ERICHSON: Nat. Gesch. Ins. Dtschl. Abt. 1, 4, 723—724)

Mehrere Syntypen, um Kreuth, bayerische Alpen, leg. v. KIESENWETTER.
DEI: 1 Syntypus, Kreuth, Coll. STIERLIN.***bolivianus*** PIC, 1927 (*Polemius*)

(Ent. Mitt. 16, 250)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.
DEI: 2 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN.***boliviensis*** PIC, 1927 (*Malthodes*)

(l.c., 253)

Holotypus, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI.

boliviensis PIC, 1927 (*Oonotelus*)

(l.c., 252—253)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.
DEI: 5 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN.***bourgeoisii*** REITTER, 1888 (*Malchinus*)

(Wien. Ent. Ztg. 7, 210)

Mehrere Syntypen, Circassien, 1887, durch LEDER.

DEI: Caucas. occ., Circassien, REITTER, 1 Paralectotypus; von BRANCUCCI designiert.

brachypterus KIESENWETTER, 1863 (*Malthodes*)

(Nat. Gesch. Ins. Dtschl. Abt. 1, 4, 725—726)

Mehrere Syntypen, Südtirol, um Bozen, leg. v. KIESENWETTER.

DEI: 1 ♀, Syntypus, Botzen, Coll. STIERLIN.

Syn. zu *lobatus* KIESENWETTER, 1852.***brunneipennis*** HEYDEN, 1889 (*Cantharis*)

(Horae Soc. Ent. Ross. 23, 673—674)

2 Syntypen, Shan-si, 9. VI. 1884, Kan-ssu, 5. VII. 1885, leg. POTANIN.

DEI: 1 Syntypus, Shan-si, 1884, leg. POTANIN.

chosokeiensis PIC, 1937 (*Athemus*)

(Ent. Bl. 33, 63)

Holotypus, Formosa, Chosokei, leg. SAUTER, im DEI [1914].

cilicicus PIC, 1904 (*Cantharis*)

(Echange 20, Nr. 230, 9)

Mehrere Syntypen, Cilicischer Taurus, Coll. PIC.

DEI: 1 Syntypus, Asia-Minor, Bozanti-Thal, leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

claricollis PIC, 1927 (*Discodon*)

(Ent. Mitt. 16, 252)

♀ Holotypus, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI.

consociata HEYDEN, 1883 (*Rhagonycha*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 27, 311—312)

Holotypus, auf dem Asiatischen Olymp, leg. MERKL; im DEI.

costatipennis PIC, 1937 (*Malthodes*)

(Ent. Bl. 33, 65)

Holotypus, occ. Java, Tjibodas, im DEI [1400 m, 1923, leg. KARNY, No. 9, ex Museum Buitenzorg].

cruciatus BAUDI, 1859 (*Malthodes*)

(Berl. Ent. Ztschr. 3, 301)

Mehrere Syntypen, Sardinia, im Museum Turin.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypus, Sardinia, leg. BAUDI, Coll. STIERLIN.

csikii STILLER, 1926 (*Cantharis*)

(Rovart. Lap. 26, 136—137)

Mehrere Syntypen, Croatiaen, Bahnhofstion Plase und Zlobin, M. V., leg. STILLER.

DEI: 1 Syntypus, Croatiaen, Plase, V. 1916, leg. STILLER, Nr. 22.

cypnorurus KIESENWETTER, 1861 (*Malthinus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 5, 383)

Mehrere Syntypen, Monte Rosa, Macugnaga, Sommer 1861, leg. v. KIESENWETTER.

DEI: 1 Syntypus, Macugnaga, Coll. STIERLIN.

denticollis SCHUMMEL, 1844 (*Cantharis*)

(Übers. Arb. Veränd. Schles. Ges. (1843), 194—195)

2 Ex. Schlesien, Gesenke oder Altvater, an der Hungerlehne, A. VIII. 1843, leg. SCHUMMEL; 1 Ex. Gesenke, in Coll. LETZNER: Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, leg. SCHUMMEL, Coll. KRAATZ.

denticornis WITTMER, 1952 (*Podabrus*)

(Ent. Bl. 47 (1951), 96—97, Fig. 2)

Holotypus, mehrere Paratypen, China-Fukien, Kuautun, 2300 m, 8. V.—30. V. 1938, leg. KLAPPERICH, im Museum A. KÖNIG, Bonn und in Coll. KLAPPERICH.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 10. V. 1938.

deserticola WITTMER, 1969 (*Boveycantharis*)
(Verh. Nat. Ges. Basel 80, 83, Fig. 34, 35)

Holotypus, Paratypen: Jordanien, Dehbeen b/Jerash, 29. III. 1964, Wadi Scheib, 10. III. 1967; leg. KLAPPERICH; Palestina, Jerusalem, 10. III. 1933, leg. SCHATZMAYR; in Coll. WITTMER.
DEI: 3 Paratypen, Jordan, Dehbeen b. Jerash, 29. IV. 1964, leg. KLAPPERICH (nicht 29. III. 1964!).

dimidiatus malatiensis HEYDEN, 1886 (*Cantharis*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 30, 279)

Mehrere Syntypen, im südlichen Kleinasiens, Malatia.

DEI: Lectotypus, (Nr. 711), 5 Paralectotypen, Malatia, Mesopotam., 1885; leg. STAUDINGER, Coll. v. HEYDEN; von WITTMER designiert.

divisa DAHLGREN, 1972 (*Rhagonycha*)
(Ent. Bl. 68, 144)

♂ Holotypus, Palencia, leg. PAGANETTI; 1 ♂, dto.; 1 ♂, Cuenca, 22. IV. 1896, leg. KORB; 1 ♂, Jaen, leg. KRAATZ; 1 ♂, Hispania, Coll. v. SEIDLITZ; Paratypen.
DEI: 3 Holotypus, Palencia, leg. PAGANETTI, Coll. LEONHARD.

dryocoetes ROTTENBERG, 1870 (*Malthinus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 14, 242–243)

Mehrere Syntypen, Sizilien, Catania.

DEI: 5 Syntypen, Catania, leg. v. ROTTENBERG.

ensifer KIESENWETTER, 1871 (*Malthodes*)
(I.c. 15, 80)

Mehrere Syntypen, Sardinia, leg. RAYMOND.

DEI: 3 ♂♂, Syntypen, Sardinia, Coll. STIERLIN.

eurynota BOURGEOIS, 1900 (*Cantharis*)
(In: BODEMEYER, E. V.: Quer durch Kleinasiens in den Bulghar Dagh, 153)

Mehrere Syntypen, Biledjik, Bos-Dagh.

DEI: 2 Syntypen, Asia minor, Biledjik, Bos-Dagh, leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD (1 Ex. ohne Caput).

fibulatus KIESENWETTER, 1852 (*Malthodes*)
(Linn. Ent. 7, 300–302)

Mehrere Syntypen, Leipzig, leg. SACHSE und v. KIESENWETTER.

DEI: 1 Syntypus, Leipzig, Coll. STIERLIN.

flavonotaticeps PIC, 1937 (*Athemus*)
(Ent. Bl. 33, 63–64)

Holotypus, Formosa, Chosokei, leg. SAUTER, im DEI [1914].

forticornis HEYDEN, 1885 (*Cantharis*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 287)

Holotypus, Turkestan, Namagan, leg. STAUDINGER; im DEI [1885].

ganglbaueri WITTMER, 1974 (*Malthinus*)
(Ent. Arb. Mus. FREY 25, 419, Abb. 96)

Holotypus, 9 Paratypen, Griechenland, Athos, leg. SCHATZMAYR, im Museum Wien, Museum Basel und DEI.
DEI: 1 ♂, 3 Ex., Paratypen, Macedonia, Athos, leg. SCHATZMAYR, Coll. LEONHARD.

geniculatus KIESENWETTER, 1859 (*Malthinus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 3, 27–28)

Mehrere Syntypen, Griechenland, Zante, IV., leg. v. KIESENWETTER.

DEI: 2 Syntypen, Zante, Coll. STIERLIN.

genistae KIESENWETTER, 1865 (*Cantharis*)
(Berl. Ent. Ztschr. 9, 392–393)

Mehrere Syntypen, Spanien, Castilisches Gebirge, in *Genista*, Guadarrama, leg. v. KIESENWETTER und SEIDLITZ.

DEI: 1 Syntypus, Guadarrama, Coll. STIERLIN.

Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Guadarrama“ steht auf dem Etikett „Guadarrama“.

germaini PIC, 1927 (*Chauliognathus*)
(Ent. Mitt. 16, 252)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.

DEI: 1 Syntypus, Bolivien, leg. GERMAIN.

germaini PIC, 1927 (*Maronius*)
(I.c., 253)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.

DEI: 1 Syntypus, Bolivien, leg. GERMAIN.

germaini PIC, 1911 (*Plectronotum*)
(Echange 27, 179–180)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI.

DEI: 4 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, Coll. KRAATZ.

germaini PIC, 1927 (*Polemius*)
(Ent. Mitt. 16, 251)

Mehrere Syntypen, Bolivien, Jungas, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.

DEI: 12 Ex. Bolivien, 1 Ex. dto., Yungas (nicht Jungas!), Coll. KRAATZ; leg. GERMAIN, Syntypen.

hellenica HEYDEN, 1883 (*Cantharis*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 27, 910)

Holotypus, Griechenland, bei Veluchi, leg. KRÜPER, Coll. v. HEYDEN, im DEI.

horni PIC, 1927 (*Discodon*)
(Ent. Mitt. 16, 251)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.

DEI: 3 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN.

iliacus MARSEUL, 1864 (*Telephorus*)
(L'Abecille 1, 41)

Mehrere Syntypen, Klein-Asien.

DEI: 1 Ex. Asia minor, Sultan Dagh, 1 Ex. Goek-Dagh; leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD, Syntypen.

klapperichi WITTMER, 1952 (*Malthinus*)
(Ent. Bl. 47 (1951), 101)

Holotypus, China-Fukien, Kuatun, 2300 m, IV. 1938, leg. KLAPPERICH, 2 Ex. dto., 1 Ex. Tschung-sen, im Museum A. KOENIG, Bonn und in Coll. KLAPPERICH: Paratypen.

DEI: 1 Paratypus, China, Fukien, Kuatun, 2300 m, 10. IV. 1938, leg. KLAPPERICH.

korbi PIC, 1912 (*Cantharis*)
(Echange 28, 82)

Mehrere Syntypen, Sibirien.

DEI: 1 Syntypus, Sibiria orient., Sorka-Gora, leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

kraatzi PIC, 1927 (*Discodon*)
(Ent. Mitt. 16, 251)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.

DEI: 1 Syntypus, Bolivien, leg. GERMAIN.

kuatunensis WITTMER, 1952 (*Malthodes*)
(Ent. Bl. 47 (1951), 102, Fig. 5, 5a)

Holotypus, mehrere Paratypen, China-Fukien, Kuatun, 2300 m, IV./VI. 1938, leg. KLAPPERICH, im Museum A. KOENIG, Bonn und in Coll. KLAPPERICH.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

luteolimbatus PIC, 1902 (*Cantharis*)
(Echange 18, 47)

Mehrere Syntypen, Sibiria, Amour, Coll. PIC.

DEI: 1 Syntypus, Sibiria orient., Sorka-Gora, leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

mackenziae MCKEY-FENDER, 1950 (*Cantharis*)
(Pan-Pacific Ent. 26, 69–70, Fig. 4)

♂ Holotypus, 1♀, L. Arrowhead, California, 8. VII. 1941, leg. MACKENZIE (Calif. Acad. Sci.); 34 Ex. dto., 3.—5. VII. 1941/11. VII. 1942/23. VIII. 1944/2.—6. VII. 1945; 9 Ex. Forest Home, San Bernardino Co., 14. VI. 1928, 3 Ex. 15. VI. 1928, 1 Ex. 10. VI. 1926; 1 Ex. Tahquitz Cn., Riverside Co., 30. VI. 1928, 5 Ex. Idyllwild, 3. VII. 1928/21. VI. 1940; leg. VAN DYKE; 1 Ex. San Jacinto Mts., 1932, leg. WINTERS; 1 Ex. Santa Rosa Mts., San Jacinto Mts., 31. V. 1940, *Quercus*, leg. RINDGE, 1 Ex. 15. VI. 1946, leg. D. J. and J. N. KNULL; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Calif., L. Arrowhead, 7. IV. 1945, leg. MACKENZIE.

manubriatus KIESENWETTER, 1863 (*Malthodes*)
(Berl. Ent. Ztschr. 7, 430, Taf. 5, Fig. 8)

Mehrere Syntypen, bei Ascoli in Mittelitalien, leg. PIRAZZOLI.
DEI: 2 Syntypen, Mittelitalien.

m-signatus PIC, 1919 (*Tripherus*)
(Echange 35, 24)

Mehrere Syntypen, Formosa.

DEI: 4 Syntypen, Formosa, Hokuto, Taihorin, 1911/III. 1912, leg. SAUTER.

nuristanus HICKER, 1937 (*Themus*)
(Arb. morph. taxon. Ent. 4, 180—181)

Holotypus, Afghanistan, Nuristan, Schlucht oberhalb Schuker, im Schuk-Tal, ca. 2600 m, 24. VI. 1935, Hindukusch-Exped., SCHEIBE; im DEI.

Syn. zu *subannulicornis* PIC, 1915.

paganettii FLACH, 1907 (*Thelephorus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 16)

Mehrere Syntypen, Calabria, Antonimina, leg. HUMMLER, ex Coll. PAGANETTI-HUMMLER.
DEI: 4 Syntypen, Calabria, Antonimina, 1905, Coll. PAGANETTI—Coll. F. MÜLLER.

paulinot KIESENWETTER, 1870 (*Cantharis*)
(Berl. Ent. Ztschr. 14, Beiheft, 125)

♂ Holotypus, Portugal, bei Coimbra, leg. PAULINO d' OLIVEIRA, in Coll. v. HEYDEN; im DEI.

piceovittatum PIC, 1927 (*Discodon*)
(Ent. Mitt. 16, 251—252)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.

DEI: 1 Syntypus, Bolivien, leg. GERMAIN.

pictipennis PIC, 1903 (*Malthodes*)
(Echange 19, 156)

Mehrere Syntypen; Umgebung Algier, Provinz Constantine, leg. DESBROCHERS und PIC; Tafaria, leg. THÉRY; Tunisie, leg. PIC.

DEI: 4 Syntypen, Tunis, Oasis Gafsa, durch v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

plagiata HEYDEN, 1889 (*Cantharis*)
(Horae Soc. Ent. Ross. 23, 675)

Syntypen: 3 Ex. Kan-ssu, 2., 17., 18. VI. 1885, leg. POTANIN, 1 Ex. Korea, leg. HERZ.

DEI: Syntypen: 1 Ex. Kan-ssu, 1885, leg. POTANIN, 1 Ex. Korea, leg. HERZ-SIEVERS, Nr. 204.

pubicollis HEYDEN, 1889 (*Cantharis*)
(l.c., 674–675)

2 Syntypen, Kan-ssu, 18. VI. 1885, leg. POTANIN.

DEI: 1 Syntypus, Kan-ssu, 1885, leg. POTANIN, Coll. v. HEYDEN.

pumilio HEYDEN, 1885 (*Cantharis*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 29, 288)

Holotypus, Turkestan, Namagan, leg. STAUDINGER; im DEI [1885].

reductelineatus PIC, 1922 (*Malthinus*)
(Mé. Exot. Ent. 36, 30)

Mehrere Syntypen, Formosa.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Hbkuto, III. 1912, leg. SAUTER.

reductum PIC, 1927 (*Discodon*)
(Ent. Mitt. 16, 251)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.

DEI: 9 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN.

reinii HEYDEN, 1879 (*Podabrus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 23, 351–352)

♀ Holotypus, Japan, Prov. Mino, 1874–1875, leg. REIN; im DEI, Coll. v. HEYDEN.

Syn. zu *heydeni* KIESENWETTER, 1879.

rufescens LETZNER, 1847 (*Cantharis*)
(Übers. Arb. Veränder. schles. Ges. (1846), 76)

Holotypus, Schlesien, im Gesenke, 1842, leg. LETZNER; im DEI, Coll. LETZNER.

Syn. zu *translucida* KRYNICKI, 1832.

rufolestacea LETZNER, 1845 (*Cantharis*)
(l.c. (1844), 72)

2 Ex. Schlesien, Gesenke, in den Hundstagen, 3. Ex. dto., 1844, leg. LETZNER: Syntypen.
DEI: 2 Syntypen, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.

sauteri PIC, 1912 (*Cantharis*)
(Echange 28, 46)

Holotypus, Formosa, Taihorinsho, leg. SAUTER, Coll. KRAATZ; im DEI [X. 1909].

sauteri PIC, 1926 (*Cantharis*)
(Ent. Mitt. 15, 68–69)

Holotypus, Formosa, leg. SAUTER, im DEI. [Taihorinsho, 7. IX].

sauteri PIC, 1911 (*Drilosilis*)
(Dtsch. Ent. Nat. Bibl. 2, 188)

Mehrere Syntypen, Formosa, Kosempo, Taihorinsho, leg. SAUTER, im DEI und in Coll. PIC.

DEI: 2 Syntypen, Formosa, Kosempo, Taihorinsho, IX. 1887–1909, leg. SAUTER.

sauteri PIC, 1937 (*Ichthyurus*)
(Ent. Bl. 83, 65; nom. praeocc. = *pici* DELKESKAMP, 1939, Cat. Col. 165, 210)

Holotypus, mehrere Paratypen, Formosa, Maruyama, leg. SAUTER, im DEI und in Coll. PIC.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, IV. 1914.

saxicola KRAUSS, 1894 (*Absidia*)
(Wien. Ent. Ztg. 13, 181–182)

Mehrere ♂♂, Syntypen, Santhaler-Alpen, Steiner-Sattel, leg. PENECKE.

DEI: 2 Syntypen, Santhaler-Alpen, 12. VII. 1893.

Syn. zu *birnbacheri* KRAUSS, 1894.

similis WITTMER, 1952 (*Podabrus*)
(Ent. Bl. 47 (1951), 97–98)

Holotypus, 2 Paratypen, China-Fukien, Kuatun, 2300 m, 29. IV.–29. V. 1938, leg. KLAPPERICH, im Museum A. KOENIG, Bonn und in Coll. KLAPPERICH.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 20. V. 1938.

simplicicolle PIC, 1911 (*Plectonotum*)
(Echange 27, 180)

Holotypus, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI [Coll. KRAATZ].

subacuminatus PIC, 1936 (*Chauliognathus*)
(Ent. Anz. 16, 2)

Mehrere Syntypen, Paraguay, Brésil, Coll. HICKER — Coll. PIC.

DEI: 4 Syntypen, Brasilia, Rio Gr do Sul, Coll. HICKER.

subdilaticornis PIC, 1927 (*Polemius*)
(Ent. Mitt. 16, 250)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.
DEI: 1 Syntypus, Bolivien, leg. GERMAIN.

sudetica LETZNER, 1847 (*Cantharis*)
(Übers. Arb. Veränder. schles. Ges. (1846), 75 — 76)

2 Syntypen, Schlesien, an der Südostlehne des schwarzen Berges, ca. 2600' über dem Meere, 4. VI. 1846, leg. LETZNER.
DEI: 6 Syntypen, Schlesien, leg. LETZNER; 4 Ex. mit dem gleichen Fundort sind in der Beschreibung nicht genannt, aber als Typen ausgezeichnet.

taurigrada BOURGEOIS, 1900 (*Metacantharis*)
(In: BODEMEYER, E. v.: Quer durch Kleinasien in den Bulghar Dagh, 154)

Mehrere Syntypen, Burna.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Asia minor, Burna, leg. v. BODEMEYER.

testacea PIC, 1910 (*Silis*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 54, 414)

Mehrere Syntypen, Sumatra, Djampang, Coll. PIC.
DEI: 1 Syntypus, Djampang.

testaceiceps PIC, 1927 (*Maroniuss*)
(Ent. Mitt. 16, 253; nom. praeocc. = *kraatzi* PIC, 1938, Echange 54, 158)

Holotypus, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI.

testaceoprolongatus PIC, 1937 (*Malthodes*)
(Ent. Bl. 33, 64 — 65)

Holotypus, occ. Java, Tjibodas, im DEI [400 m, 1923, FULMEK 32].

tetraglyphus HICKER, 1953 (*Malthodes*)
(Stud. tentini 30, 130, Fig.)

Mehrere Ex.; Adamello-Gebiet, am Piz Arera, 1500 m, leg. NISSL; 30 Ex. am Passo di Croce Domini, Brescianer Vorbergen, ca. 1900 m, leg. MANDL; mehrere Ex. am Monte Arere und Oltre il colle, leg. STOLZ; ♂ Holotypus, Paratypen, in Coll. HICKER und Coll. MANDL.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, Lombardei, Adamello-Gebiet, 28. VI. — 6. VII. 1952, Passo di Croce Domini, ca. 1900 m, leg. MANDL.

triangulifer PIC, 1931 (*Polemius*)
(Ann. Soc. Ent. Fr. 100, 86)

Holotypus, Bolivia, Coll. KRAATZ [Yungas].

trinotaticollis PIC, 1937 (*Silis*)
(Ent. Bl. 33, 62)

Holotypus, Guatemala, leg. CONRADT, im DEI [Coll. KRAATZ].

vaucheri PIC, 1901 (*Malthinus*)
(Bull. Soc. Ent. Fr., 111)

Mehrere Syntypen, Marokko, Tanger.
DEI: 2 Syntypen, Maroc., Coll. STIERLIN.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten

banghaasi PIC (*Chauliognathus*)

DEI: 1 Type, Espírito Santo, STAUDINGER & BANG-HAAS, dedic.

blanchardi BOURGEOIS (*Psilorhynchus*)

DEI: 1 Type, Peru, Callanga, Coll. KRAATZ.

heterocerus BOURGEOIS (*Discodon*)

DEI: 2 Typen, Bolivien, Peru, Pachitea; Coll. KRAATZ.

heteronota BOURGEOIS (*Cantharis*)

DEI: 1 Type, Bolivien, Coll. KRAATZ.

toxophorus GANGLBAUER (*Malthodes*)

DEI: 2 Typen, Venedig, Veneto, Grazepa, 30. VI. 1929, leg. FIORI, Coll. STIERLIN.

trinaerius GANGLBAUER (*Malthodes*)

DEI: 5 Typen, Palermo, leg. HOLDHAUS, Nr. 5856.

Phengodidae

atricolor PIC, 1937 (*Phengodes*)

(Ent. Bl. 33, 58; als var. von *fusca* GORHAM beschrieben)

Holotypus, Costa Rica, Turrialba, leg. SCHILD, im DEI [III., 900 m, HEYNE].

Von WITTMER 1976 als Art erhoben, in Ent. Arb. Mus. FREY 27, 423.

Drilidae

fischeri PIC, 1937 (*Phrixothrix*)
(Ent. Bl. 33, 58–59)

Holotypus, Brésil, Rio de Janeiro, leg. FISCHER, im DEI [27. XI. 1918].

opacus PIC, 1937 (*Phrixothrix*)
(l.c., 58)

Holotypus, Peru, Callanga, im DEI [Coll. KRAATZ].

subspinosus PIC, 1910 (*Laemoglyptus*)
(Naturaliste 32, 259)

Mehrere Syntypen, Formosa, Coll. PIC.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Formosa, Taihorinsho, X. 1909/22. VIII., leg. SAUTER;

testaceonotatus PIC, 1937 (*Monocladius*)
(Ent. Bl. 33, 59)

Holotypus, Indes or., im DEI [Coll. KRAATZ].

Malachiidae

akbesianus PIC, 1898 (*Malachius*)
(Misc. Ent. 6, 138)

Mehrere Syntypen, Hte Syrie, Akbes, Coll. DELAGRANGE.
DEI: 1 Syntypus, Akbes, Coll. KRAATZ.

apicalis PIC, 1912 (*Sphinginopalpus*)
(Col. Rundsch., 53)

Holotypus, Rhodesia, leg. BODONG, im DEI.

artvinensis WITTMER, 1974 (*Malachius*)
(Fragmenta Ent. 10, 15–16, Abb. 18)

Holotypus, mehrere Paratypen, Türkei, Anatolien, Prov. Artvin, Şavşat (Shavşat), 3.–11. VI. 1972, leg. HOLZSCHUH,
im Museum Basel und in Coll. HOLZSCHUH.
DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

banghaasi PERRIN, 1900 (*Malachius*)
(Bull. Acad. Mars., 16; Separat)

Mehrere Syntypen, Turkestan, Buchara, ex STAUDINGER.

DEI: 6 Ex. Ost-Buchara, Tschitschantan, 1898, leg. HAUSER, Coll. LEONHARD; 1 Ex. Buchara, Coll. KRAATZ: Syntypen.

bipunctatus PIC, 1937 (*Attalus*)
(Ent. Bl. 33, 60)

♀ Holotypus, Afrique occ., Kamerun, leg. CONRADT, im DEI [Coll. KRAATZ].

bispinus WITTMER, 1935 (*Cephaloncus*)
(Eos 11, 181–182)

Mehrere Syntypen, Sinai, Wadi Feran, 4. III. 1935, Wadi Hebran, 6. III. 1935, Exped. von TORRE und TASSO.
DEI: 2 Syntypen, Sinai, Wadi Feran, 4. III. 1935, durch WITTMER, Coll. Museo ent., „PIETRO ROSSI“ Duino.

brevilineatus PIC, 1937 (*Philhedonus*)
(Ent. Bl. 33, 60)

♀ Holotypus, Afrique, Usambara, im DEI [Coll. KRAATZ].

brevicornis KRAATZ, 1862 (*Malachius*)
(Berl. Ent. Ztschr. 6, 270)

♂ Holotypus, Andalusien, leg. STAUDINGER; im DEI [Coll. KRAATZ].

bucharicus PIC, 1907 (*Attalus*)
(Echange 23, No. 265, 97–98)

Mehrere Syntypen, Buchara, Repetek, in Coll. HAUSER und Coll. PIC.

DEI: 2 Syntypen, Buchara, Repetek, IV. 1900, Coll. HAUSER-Coll. LEONHARD.

caeruleocolor PIC, 1927 (*Attalus*)
(Ent. Mitt. 16, 255)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, in Coll. PIC und im DEI.

DEI: 4 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN.

coeruleus KRAATZ, 1895 (*Hadrocnemus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 60–61)

Mehrere Syntypen, (Togo) Bismarckburg, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

DEI: 7 Syntypen, Togo, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *azureus* ERICHSON, 1840.

conradti PIC, 1937 (*Ebaeus*)
(Ent. Bl. 33, 61)

♂ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI [Coll. KRAATZ].

Syn. zu *malachoides* FAIRMAIRE, 1887.

conradti KRAATZ, 1895 (*Hadrocnemus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 60)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, (Togo) Bismarckburg, leg. CONRADT, in Coll. KRAATZ; im DEI.

corniculatus KRAATZ, 1864 (*Anthodytes*)
(Berl. Ent. Ztschr. 8, 308–309, Taf. 5, Fig. 1)

♂ Holotypus, Graecia; im DEI, Coll. KRAATZ.

crassicornis WITTMER, 1975 (*Charopus*)
(Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 48, 266–267, Fig. 9)

Holotypus, mehrere Paratypen, Türkei, Anatolien, 30 km östlich von Bingöl, 1200 m, 20. VI. 1972, leg. HOLZSCHUH, im Museum Basel und in Coll. HOLZSCHUH.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

diversicollis CHOBAUT, 1898 (*Attalus*)
(Rev. Ent. Caen 17, 77–78)

15 ♂♂, 18 ♀♀, Syntypen, Algerien, Ghardaïa, Plateau Chebka, leg. BAYONNE.
DEI: 2 Syntypen, Ghardaïa, V. 1897, durch CHOBAUT, Coll. KRAATZ.

drakei PIC, 1937 (*Attalus*)
(Ent. Bl. 33, 61)

Holotypus, Paraguay, leg. DRAKE, im DEI [188., Coll. KRAATZ].

dux ABEILLE, 1890 (*Anthocomus*)
(Rev. Ent. 9, 44–45)

Mehrere Syntypen, Afghanistan, Kischlak, via v. HEYDEN an ABELLE.
DEI: 5 Syntypen, Afghanistan, Kischlak, durch DIECK, Coll. v. HEYDEN.

flavonotatus PIC, 1937 (*Attalus*)
(Ent. Bl. 33, 60–61)

♀ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI [Coll. KRAATZ].

graecus KRAATZ, 1862 (*Malachius*)
(Berl. Ent. Ztschr. 6, 122)

Mehrere Syntypen, Griechenland, leg. KRÜPER.
DEI: 3 Syntypen, Graecia, leg. KRÜPER, Coll. KRAATZ.

heydeni ABEILLE, 1887 (*Attalus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 31, 447–448)

2 ♀♀, Syntypen, Marocco, Mogador, 1872, leg. FRITSCH und REIN, via v. HEYDEN an ABEILLE.
DEI: 1 ♀, Syntypus, Amsmid bis Mogador, 14.–20. VI. 1872, leg. FRITSCH und REIN, Coll. v. HEYDEN.

horni PIC, 1937 (*Carphurus*)
(Ent. Bl. 33, 62)

Holotypus, Ceylon, Kandy, leg. HORN, im DEI [Nr. 7, 1899].

kraatzi PIC, 1927 (*Dromanthus*)
(Ent. Mitt. 16, 254–255)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, in Coll. PIC und im DEI.
DEI: 4 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN.

lateapicalis PIC, 1937 (*Pseudocolotes*)
(Ent. Bl. 33, 62)

Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI [Coll. KRAATZ].

latefasciatus PIC, 1919 (*Laius*)
(Mé. Exot. Ent. 30, 12)

Mehrere Syntypen, Formosa.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Anping, VIII. 1911, leg. SAUTER.

lineaticollis PIC, 1917 (*Malachius*)
(l.c. 26, 6)

Mehrere Syntypen, Formosa.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Hokuto, III. 1912, leg. SAUTER.

quadripustulatus KRAATZ, 1895 (*Hadrocnemus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 272)

♂ Holotypus, Niger-Benue, Coll. KRAATZ, im DEI.
(Auf dem handschriftlichen Determinationszettel von KRAATZ steht *quadrimaculatus*!).
Syn. zu *nobilis* ERICHSON, 1843.

ragusae SCHAUFUSS, 1870 (*Axinotarsus*)
(Nunq. otios. 1, 157–158)

Mehrere Syntypen, Palermo, leg. RAGUSA, via METZNER an SCHAUFUSS.
DEI: 1 Syntypus, Palermo.

rufoapicalis PIC, 1917 (*Attalus*)
(Mé. Exot. Ent. 26, 6)

Mehrere Syntypen, Formosa.
DEI: 3 Syntypen, Formosa, Hokuto, III. 1912, leg. SAUTER.

schenklingi PIC, 1927 (*Attalus*)
(Ent. Mitt. 16, 255)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.
DEI: 1 Syntypus, Bolivien, leg. GERMAIN.

serrifer PIC, 1911 (*Malachius*)
(Echange 27, No. 314, 107, Note 2)

Mehrere Syntypen, Persien, Luristan, via v. BODEMEYER an PIC, in Coll. PIC.
DEI: 1 Syntypus, Persien, Luristan, durch v. BODEMEYER.

spectabilis KRAATZ, 1895 (*Hadrocnemus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 271; nom. praeocc. = *constrictipes* CHAMPION, 1920, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 6, 192)

Mehrere Syntypen, Niger-Benue, ex Coll. RICHTER.
DEI: 3 Syntypen, Niger-Benue, Exp., Coll. KRAATZ.

srnkae KRAATZ, 1895 (*Hadrocnemus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 60)

♂ Holotypus, Africa orient., Mombasa, leg. CONRADT, via SRNKA an KRAATZ; im DEI.

sublunulatus PIC, 1937 (*Laius*)
(Ent. Bl. 33, 59)

Mehrere Syntypen, Australie, Queensland, im DEI.
DEI: 10 Syntypen, Queensland, Coll. HACKER.

tenuellus KRAATZ, 1862 (*Malachius*)
(Berl. Ent. Ztschr. 6, 123)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Griechenland, leg. KRÜPER; im DEI.
Syn. zu *labiatus* BRULLÉ, 1832.

tenuicornis KRAATZ, 1895 (*Hadrocnemus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 62)

♀ Holotypus, Bismarckburg, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ; im DEI [Togo].

trimaculatus PIC, 1937 (*Attalus*)
(Ent. Bl. 33, 61)

Holotypus, Guatemala, im DEI [Nr. 58, Coll. KRAATZ].

varitarsis KRAATZ, 1862 (*Anthocomus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 6, 270–271)

Mehrere Syntypen, Italien, leg. KAHR.
DEI: 1 Syntypus, Italien, leg. KAHR, Coll. KRAATZ.

viridis KRAATZ, 1895 (*Hadrocnemus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 62; nom. praeocc. = *fissipes* CHAMPION, 1920, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 6, 258)

2 ♀♀, Bismarckburg, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ; im DEI [Togo].

Wahrscheinlich nicht beschriebene Art

bodemeyeri REITTER (*Malachius*)

DEI: 2 Typen, Persien, Luristan, durch v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

Karumiidae

holzschuhii MANDL (1978 ?) (*Paulusella*)
(soll in Koleopt. Rundsch. 54 veröffentlicht werden)

DEI: 1 Paratypus, Iran, Kashun, 25.–27. V. 1976, leg. HOLZSCHUH/RESSL.

richteri MANDL, 1974 (*Paulusella*)
(Verh. Natur. Ges. Basel 84, 641–642)

♂ Holotypus, Iran, Belutschistan, Iranshar, 800 m, 11.–21. IV. 1954; 15 Ex. dt.; 3 Ex. Iran, Makran, am Kahuran bei Putab, 25. III. 1954; leg. RICHTER und SCHÄUFFELE, Paratypen; im Museum Stuttgart, in Coll. WITTMER und Museum Basel.

DEI: 1 Paratypus, Iran, Belutschistan, Iranshar, 800 m, 11.–21. IV. 1954, leg. RICHTER und SCHÄUFFELE.

Dasytidae

abietum KIESENWETTER, 1859 (*Haplocnemus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 3, 171–172)

Mehrere Syntypen, Griechenland, Parnes bei Athen und Gebirge Aetoliens, leg. v. KIESENWETTER.

DEI: 2 Syntypen, Graecia, Coll. STIERLIN.

acutus SCHILSKY, 1895 (*Dasytes*)
(In: KÜSTER, H. C.: Käfer Europas 31, Nr. 9)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Algier, Bongie, leg. KOBELT, ex Coll. v. HEYDEN.

DEI: 1 ♀, Syntypus, Bongie, 1884, leg. KOBELT, Coll. v. HEYDEN. Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Bongie“, steht auf dem Etikett „Bougie“.

Syn. zu *acutipennis* BAUDI, 1873.

aplocnemiformis PIC, 1915 (*Dasytes*)
(Bull. Soc. Zool. Fr. 40, 97)

Mehrere Syntypen, Indes, Khasia Hills.

DEI: 3 Ex. Assam, Khasia Hills, 2 Ex. Khasis, 1898; Coll. KRAATZ, Syntypen.

binotaticollis PIC, 1927 (*Dasytes*)
(Ent. Mitt. 16, 254)

Holotypus, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI.

dasytoides KRAATZ, 1882 (*Chaetomalachius*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 26, 97)

Mehrere Syntypen, Margelan, in Coll. KRAATZ und Coll. v. HEYDEN.

DEI: 1 Ex. Margelan, 2 Ex. ohne Fundort, Coll. KRAATZ, 1 Ex. Turkestan, Coll. v. HEYDEN: Syntypen.

emarginatus SCHILSKY, 1895 (*Dasytes*)
(In: KÜSTER, H. C.: Käfer Europas 31, Nr. 8)

Mehrere Syntypen, Marokko, Mogador, leg. FRITSCH und REIN, in Coll. v. HEYDEN.

DEI: 1 Ex. Marokko, durch v. HEYDEN, Nr. 6070, Coll. KOLTZE; 7 Ex. Amsmid bis Mogador, 14.—20. VI. 1872; 2 Ex. Mogador nach Djebel Hadid; 4 Ex. Untere Reraya Thal und Berg, 10. VI. 1872; leg. FRITSCH und REIN, Coll. v. HEYDEN; Syntypen.

kiesenwetteri HEYDEN, 1870 (*Danacea*)
(Span. Reise, 127; ex Berl. Ent. Ztschr., 1870)

Mehrere Syntypen, Andalusien, Ronda, leg. v. HEYDEN.

DEI: 3 Syntypen, Andalusien, Ronda, 1869, leg. v. HEYDEN, Coll. STIERLIN, Coll. v. HEYDEN.

kraatzi SCHILSKY, 1894 (*Dasytes*)
(In: KÜSTER, H. C.: Käfer Europas 30, Nr. 12)

Mehrere Syntypen, Marokko, Setlat, Mogador, V., VI.

DEI: 1 Syntypus, Marokko, durch v. HEYDEN, Nr. 6062, Coll. KOLTZE.

limbipennis KIESENWETTER, 1865 (*Haplocnemus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 9, 333)

Mehrere Syntypen, Spanien, Andalusisches Gebirge, Excursion, Sommer 1865.

DEI: 2 Syntypen, Spanien, Jaen, Coll. STIERLIN.

longula DESBROCHERS, 1889 (*Amauronia*)
(Bull. Soc. Ent. Fr. (6) 9, 185)

Mehrere Syntypen, Algerien, Téniel-el-Haad.

DEI: 2 Syntypen, Téniel-el-Haad, 1889, durch DESBROCHERS, Coll. STIERLIN.

luctuosa DESBROCHERS, 1889 (*Danacea*)
(I.c., 185)

Mehrere Syntypen, Algerien, Téniel-el-Haad.

DEI: 4 Syntypen, Téniel-el-Haad, durch DESBROCHERS, Nr. 102, Coll. STIERLIN.

lusitana HEYDEN, 1870 (*Danacea*)
(Ent. Reise Span., 127—128; ex Berl. Ent. Ztschr., 1870)

2 Syntypen, Portugal, Coimbra, leg. v. HEYDEN; im DEI [1869].

marginatus ROTTENBERG, 1870 (*Haplocnemus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 14, 243)

♀ Holotypus, Catania, leg. v. ROTTENBERG; im DEI.

Syn. zu *rufomarginatus* PERRIS, 1869.

medius ROTTENBERG, 1870 (*Dasytiscus*)
(I.c., 244)

Mehrere Syntypen, Sizilien, bei Syr., leg. v. ROTTENBERG.

DEI: 3 Syntypen, Syrakus, leg. v. ROTTENBERG.

nigritus KIESENWETTER, 1859 (*Dasytes*)
(I.c. 3, 169)

Mehrere Syntypen, Griechenland.

DEI: 2 Syntypen, Graecia, Coll. STIERLIN.

oertzeni SCHILSKY, 1896 (*Trichoceble*)
(In: KÜSTER, H. C.: Käfer Europas 32, Nr. 91)

Mehrere Syntypen, Kreta, leg. v. OERTZEN.

DEI: 4 Syntypen, Kreta, leg. v. OERTZEN, Coll. LEONHARD.

opaciceps PIC, 1927 (*Haplamaurus*)
(Ent. Mitt. 16, 254)

Holotypus, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI.

picticollis HEYDEN, 1899 (*Aphyctus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 328)

2 Syntypen, Turkestan, Taschkent, via HAUSER an v. HEYDEN.

DEI: 1 ♀, Syntypus, Taschkent, durch HAUSER, Nr. 92.

pristocerus KIESENWETTER, 1859 (*Haplocnemus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 3, 170–171)

Mehrere Syntypen, Griechenland.
DEI: 2 Syntypen, Graecia.

scheibeii BLAIR, 1937 (*Eulobonyx*)
(Arb. morph. taxon. Ent. 4, 181–182)

Holotypus, 41 Paratypen, Afghanistan, Gadu im Ramgul-Tal, 5. VII. 1935, Hindukusch-Expedition, im DEI und Britischen Museum.
DEI: ♂ Holotypus, 24 Paratypen, Afghan, Nuristan, Gadu im Ramgul-Tal, 5. VII. 1935, Expedit. SCHEIBE.

subdepressus SCHILSKY, 1895 (*Dasytes*)
(In: KÜSER, H. C.: Käfer Europas 31, Nr. 7)

Mehrere Syntypen, Nord-Afrika, Djebel-Aures, im Museum Berlin und in Coll. v. HEYDEN.
DEI: 3 Syntypen, Djebel-Aures, 1875, durch OBERTHÜR, Coll. v. HEYDEN (1 Ex. ohne Abdomen).

timidus BAUDI, 1873 (*Dasytes*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 17, 318)

Mehrere Syntypen, Cypern, leg. TRUQUI.
DEI: 1 Syntypus, Cypro, Coll. STEERLIN.

turkestanicus KRAATZ, 1882 (*Eulobonyx*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 26, 98)

Mehrere Syntypen, Margelan, in Coll. KRAATZ und Coll. v. HEYDEN.
DEI: 1 Ex. Margelan, 2 Ex. ohne Fundort, Coll. KRAATZ; 3 Ex. Turkestan, durch STAUDINGER-KRAATZ, Coll. v. HEYDEN: Syntypen.

valida HEYDEN, 1877 (*Danacea*)
(Verh. Nat. Ver. Brünn 16, 215)

2 Syntypen, Kaukasus, Mikwena am Rien, IV., Katharinenfeld, V.; 1874, leg. LEDER.
DEI: 1 Syntypus, Kaukas., leg. LEDER, Nr. 140.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten

aheneus SCHAUFUSS, (*Dasytes*)

DEI: 2 Typen, Callistoga, IV., Coll. SCHAUFUSS.

australis SCHAUFUSS (*Dasytes*)

DEI: 2 Typen, Australien, Coll. SCHAUFUSS.

paganettii PIC (*Trichoceble*)

DEI: 3 Typen, Zelenika, leg. PAGANETTI, Coll. LEONHARD.

serraticornis KÜSTER (*Dasytes*)

DEI: 1 Type, Sardinien, Coll. KRAATZ.

serrimargo SCHAUFUSS (*Dasytes*)

DEI: 2 Typen, S. Mateo, VI.

Melyridae

amaliae HEYDEN, 1886 (*Melyris*)
(Senckenb. Naturf. Gesellsch., 56)

Holotypus, Algier, Prov. Constantine, nahe El Kantara, 1884, leg. KOEBLT; Coll. v. HEYDEN, im DEI.
Syn. zu *ruficrus* FAIRMAIRE, 1882.

atricolor PIC, 1927 (*Melyrodes*)
(Ent. Mitt. 16, 254)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, in Coll. PIC und im DEI.
DEI: 3 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN.

banghaasi PIC, 1902 (*Astylus*)
(Echange 18, Nr. 210, 34–35)

Mehrere Syntypen, Bolivien, in Coll. PIC.
DEI: 3 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN.

obscuritarsis PIC, 1912 (*Zygia*)
(Kol. Rundsch. 1, 53)

Holotypus, Panzani-Fälle, im DEI [Coll. KRAATZ].

reitteri HEYDEN, 1890 (*Zygia*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 73)

2 Syntypen, Tripolis, leg. QUEDENFELDT; im DEI.

rubrolimbata PIC, 1909 (*Zygia*)
(Echange 25, Nr. 294, 142)

Mehrere Syntypen, Küste von Somalis Berbera, durch ROLLE, Coll. PIC.
DEI: 2 Syntypen, Abessinien, Dire Dasua, Coll. KRAATZ.

turkestanicus HEYDEN, 1886 (*Anthodromius*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 30, 186)

Syntypen: 1 Ex. Turkestan, Alai Gebirge, 1 Ex. Namagan, leg. STAUDINGER, in Coll. v. HEYDEN.

DEI: 1 ♂, Turkestan, Alai, Nr. 276, 1 Ex. Namangan, 1885, leg. STAUDINGER; Syntypen.

Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Namagan“ steht auf dem Etikett „Namagan“.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Art

apicalis SCHAUFUSS (*Zygia*)

DEI: 2 Typen, Zambesi, Coll. SCHAUFUSS, HEYNE comm. 1912.

Cleridae

abdominalis KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 101)

Holotypus, N. Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].

abruptepunctatus SCHENKLING, 1932 (*Orthrius*)

(Mitt. Dtsch. Ent. Ges. 3, 24—25)

2 ♂♂, 2 ♀♀, Holotypus, Paratypen, südl. Provinz China, Yunnan, Gebirge bei Mengtze, in Coll. HAUSER und im DEI.
DEI: 1 ♂, Paratypus, China, Prov. Yunnan, Gebirge bei Mengtze.

abyssinicus GORHAM, 1883 (*Gyponyx*)

(Ann. Mus. Genova 18, 604—605)

Mehrere Syntypen, Abyssinien, Scioa, Giagaguè, Let-Marefia, Mahal-Uonz, leg. ANTINORI, im Museum Genua.
DEI: 1 Syntypus, Scioa, Giagaguè, 1881, leg. ANTINORI, Coll. SCHENKLING.

adustus KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 104)

Mehrere Syntypen, Westafrika, Togo, leg. CONRADT.

DEI: 2 Syntypen, Togo, Coll. KRAATZ.

aeneicollis SCHENKLING, 1907 (*Hydnocera*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 306)

Mehrere Syntypen, Mexico, Guerrero, Chilpancingo, 4000 ft., Amula, 6000 ft., VII.—VIII., leg. SMITH, im Britischen Mu-seum, Museum Berlin und DEI.

DEI: 1 Ex. Mexico, Guerrero; 2 Ex. Guerrero, Amula, 6000 ft., leg. SMITH: Syntypen.

aestivus SCHENKLING, 1906 (*Clerus*)

(l.c., 274)

Holotypus, mehrere Paratypen, Brasilien, im DEI.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Brasilien, Coll. KRAATZ.

albolineata SCHENKLING, 1906 (*Lemidia*)

(l.c., 302)

Holotypus, Queensland, Kuranda, leg. DODD, im DEI [XI. 1904].

amoenus SCHENKLING, 1906 (*Cleronus*)

(l.c., 263, Taf. 2, Fig. 5)

Holotypus, mehrere Paratypen, Magdalenenstrom, im DEI.

DEI: ♂ Holotypus, Magdalenenfluss, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *viridipennis* SPINOLA, 1844.

amoenus KRAATZ, 1899 (*Leptocerus*)

(l.c., 83)

Holotypus, Nord-Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI.

andamanensis SCHENKLING, 1906 (*Orthrius*)

(l.c., 268)

Holotypus, Andamanen, im DEI [Coll. KRAATZ].

Syn. zu *binotatus* FISCHER, 1829.

andresi SCHENKLING, 1913 (*Phloeocopus*)

(Bull. Soc. Ent. Egypte 5 (1912), 38—39)

Holotypus, Unter-Aegypten, Dessoumes, VII. 1909, leg. ANDRES, im DEI.

andrewesi SCHENKLING, 1908 (*Callimerus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 366)

Holotypus, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES, im DEI.

angulata SCHENKLING, 1900 (*Priocera*)

(l.c., 387—388)

Holotypus, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. SCHENKLING; im DEI [durch DONCKIER].

angustefasciatus PIC, 1947 (*Philocalus*)
(Diversites ent. 1, 5)

Holotypus, Rhodesia; im DEI [Plumtree, 5. II. 1909, to light].

angusticollis SCHENKLING, 1902 (*Orthrius*)
(Not. Leyd. Mus. 23, 126–127)

4 Syntypen, West-Java, leg. PASTEUR und SJTHOFF, im Museum Leiden.
DEI: 1 Syntypus, West-Java, Toegoe.

angustus SCHENKLING, 1908 (*Gypyonyx*)
(In: SJÖSTEDT, Y.: Ergebni. Schwed. Zool. Exped. Kilimandjaro 7, 7, 73–74, Taf. 2, Fig. 7)

Syntypen, Kilimandjaro, leg. SJÖSTEDT: 3 Ex. Kibonoto, untere Kulturzone, 23., 27., 30. IV. 1906; 2 Ex. dto., Kulturzone, 13. III., 16. IV. 1906.
DEI: 1 Syntypus, Kilimandjaro, Kibonoto, 1000–1200 m, 23. IV. 1906, leg. SJÖSTEDT.

annulipes SCHENKLING, 1906 (*Cephalocerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 300)

Holotypus, mehrere Paratypen, Britisch Ostafrika, im DEI.

DEI: Holotypus, 2 Paratypen, Britisch Ostafrika, leg. STAUDINGER, Coll. KRAATZ.

antennata SCHENKLING, 1916 (*Ichnea*)
(Ent. Mitt. 5, 151–152)

Holotypus, Jatahy, Goyaz, via DONCKIER an SCHENKLING, im DEI [Coll. SCHENKLING].

apicalis KRAATZ, 1899 (*Placocerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 84–85)

Mehrere Ex. Nord-Kamerun, 1 Ex. Togo, leg. CONRADT; Syntypen.

DEI: 3 Ex. N. Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 1896, 1 Ex. Togo; leg. CONRADT, Coll. KRAATZ, Syntypen.

apicicornis SCHENKLING, 1908 (*Phaeocyclotomus*)
(l.c., 482–483)

Holotypus, Angola, Benguella, an Rinde von *Berlinea* spec., in Gesellschaft von Ameisen, leg. WELLMANN, im DEI [Nr. 57, 27. II. 1906].

araneipes CORPORAAL, 1925 (*Clerus*)
(Ent. Mitt. 14, 394–395)

Holotypus, mehrere Paratypen, Costa Rica, Turrialba und San José, im Museum Amsterdam und DEI.
DEI: 1 Paratypus, Costa Rica, Turrialba, 1922, durch HEYNE.

arrowi SCHENKLING, 1907 (*Clerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 313)

Mehrere Syntypen, Amazon, leg. BATES, Ega, Peru, im Britischen Museum und DEI.
DEI: 1 Syntypus, Ega, 1906, ex Britisch. Museum.

banksi SCHENKLING, 1913 (*Dasyceroderus*)
(Phil. Journ. Sci. 8, No. 4, 304)

Holotypus, No. 12364, Palawan, Bacuit, leg. WEBER, in Coll. des Bureau of Science, Manila; Paratypen, dto., im DEI.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, ex Bu. of Sci., P. J.

basalis SCHENKLING, 1900 (*Axina*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 389)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Jatahy, Minas Geraes, in Coll. FAIRMAIRE, Coll. GRANDJEAN, Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKLING.
DEI: 2 Syntypen, Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING, Coll. KRAATZ.

basalis KRAATZ, 1899 (*Phaeocyclotomus*)
(l.c., 93–94)

Mehrere Ex. SO.-Kamerun, Lolodorf, leg. CONRADT, 1 Ex. Gabun, leg. STAUDINGER; Syntypen.
DEI: 6 Syntypen, SO.-Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

basiventris SCHENKLING, 1902 (*Thaleroconemis*)
(Bull. Mus. Paris 8, 328–329)

Mehrere Syntypen, Nouvelle-Guinée, Dorey, 1878, leg. RAFFRAY und MAINDRON, im Museum Paris.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. SCHENKLING.

bellus SCHENKLING, 1898 (*Clerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 365)

Mehrere Syntypen, Bolivia, leg. STAUDINGER.
DEI: 2 Syntypen, Bolivia, leg. STAUDINGER.

bennigseni SCHENKLING, 1912 (*Ommadius*)
(Ent. Mitt. 1, 308–309)

2 Syntypen, Neuguinea, Sattelberg, Coll. v. BENNIGSEN; im DEI.

bennigseni HINTZ, 1907 (*Phloeocopus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 26)

2 Syntypen, Deutsch-Ostafrika, Kionga.

DEI: 1 Syntypus, Kionga, Coll. v. BENNIGSEN.

bicarinatus GORHAM, 1882 (*Clerus*)
(Biol. Centr.-Amer. 3(2), 152)

Mehrere Syntypen; Nicaragua, Chontales, leg. BELT; Panama, Volcan de Chiriquí, leg. CHAMPION.
DEI: 1 Syntypus, Bugaba, 800—1500 ft., leg. CHAMPION.

bicolor SCHENKLING, 1906 (*Lemidia*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 301)

Holotypus, Australien, im DEI [N. Holl.].

bifasciatus KRAATZ, 1900 (*Thanasimus*)
(l.c., 191)

Holotypus, Ceylon, Dambulla, leg. HORN; im DEI [Coll. KRAATZ].

bimaculata KRAATZ, 1899 (*Epiclines*)
(l.c., 87—88)

Holotypus, Nord-Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].

bipartitus SCHENKLING, 1915 (*Clerus*)
(Ent. Mitt. 4, 314)

Holotypus, Ecuador, Coca, leg. HAENSCH, im DEI [Coll. SCHENKLING].

bipunctata SCHENKLING, 1900 (*Isolemidia*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 399)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goiaz, Jatahy, Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKLING.
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

birmanicum GORHAM, 1892 (*Stigmatical*)
(Ann. Mus. Civ. Genova (2) 12, 740)

4 Syntypen, Burma, Carin Hills, Cheba, 900—1100 m, in Coll. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Carin Cheba, 900—1100 m, 5. XII. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

blackburni HINTZ, 1908 (*Phlogistus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 711, 714)

7 Syntypen, Australia, Paek Downs, Victoria, Sidney, in Coll. HINTZ und im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Peak Downs, Museum Godeffroy, Coll. SCHENKLING.

blackburni SCHENKLING, 1906 (*Phlogistus*)
(l.c., 279—280)

Holotypus, Australien, im DEI [N. Holl., Coll. KRAATZ].

brevis SCHENKLING, 1908 (*Apteroclerus*)
(In: SJÖSTEDT: Ergebn. Schwed. Zool. Exped. Kilimandjaro 7, 7, 71, Taf. 2, Fig. 4)

4 Syntypen, Kilimandjaro, Kiboscho, 3000—3500 m, 15. II. 1906, leg. SJÖSTEDT.
DEI: 1 Syntypus (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).

bruchi SCHENKLING, 1908 (*Hydnocera*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 701)

3 Syntypen, Argentina, Prov. Catamarca und Tucuman, via BRUCH an SCHENKLING, im La Plata Museum und DEI.
DEI: 1 Syntypus, Argentina, Prov. Catamarca, 4. III. 1907, leg. BRUCH.

bruchi SCHENKLING, 1908 (*Pelonium*)
(l.c., 705)

2 Syntypen, Argentina, Prov. Santiago de Estero, via BRUCH an SCHENKLING, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, II. 1908, durch BRUCH.

bruchi SCHENKLING, 1916 (*Pyticeropsis*)
(Ent. Mitt. 5, 154)

Holotypus, Argentina, Prov. San Luis, leg. BRUCH, via BRUCH an SCHENKLING, im DEI [XII. 1911].

brunnea SCHENKLING, 1906 (*Axina*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 254)

Holotypus, Nordperu, Prov. Tumbez, via DONCKIER an SCHENKLING, im DEI [Grao, durch BAER, Coll. SCHENKLING].

brunneopunctatus HINTZ, 1902 (*Gyponyx*)
(l.c., 398)

2 Syntypen, Capland, Natal, Bedford.

DEI: 1 Syntypus, Capland, Bedford, Coll. SCHENKLING.

brunniceps SCHENKLING, 1902 (*Tenerus*)
(Stett. Ent. Ztg. 63, 374—375)

Syntypen, Sumatra, leg. DOHRN; mehrere Ex. Soekaranda, 3 Ex. Palembang, in Coll. SCHENKLING.
DEI: 2 Syntypen, Sumatra, Palembang, Coll. KRAATZ.

caffer BOHEMAN, 1851 (*Opetiopalpus*)
(Ins. Caffraria 1, 516)

Mehrere Syntypen, Caffraria, leg. WAHLBERG.

DEI: 1 Syntypus, Caffraria, leg. WAHLBERG.

carinatum SCHENKLING, 1908 (*Pelonium*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 704—705)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER und leg. BAER, im DEI.

DEI: 1 Ex. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ; 1 Ex. Brésil, Goyaz, Rio verde, Coll. SCHENKLING; Syntypen.

carinulatus SCHENKLING, 1908 (*Tillus*)
(I.c., 364)

Mehrere Syntypen, Mindoro, Brit. Museum, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Mindoro, Nr. 95–226.

caucasicus KRAATZ, 1882 (*Trichodes*)
(I.c. 26, 320–321)

Mehrere Syntypen, Caucasus, via STAUDINGER an KRAATZ.
DEI: 1 Ex. Caucasus, Coll. KRAATZ, 1 Ex. Caucasus, durch STAUDINGER, in Coll. v. HEYDEN; Syntypen.
Syn. zu *armeniacus* BAUDI, 1873.

caviceps KRAATZ, 1899 (*Neohydinus*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 43, 216)

Holotypus, Südwest Sumatra, leg. WEYERS; im DEI [Coll. KRAATZ].

celebensis SCHENKLING, 1899 (*Phaeocyclotomus*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 144–145)

Mehrere Syntypen, Celebes, Kandari, 1874, leg. BECCARI, im Museum Genua.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, III., Coll. SCHENKLING.

centrinaculata SCHENKLING, 1900 (*Axina*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 388)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Coll. BRANCSIK und Coll. SCHENKLING.
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKLING.
Syn. zu *bifasciata* CHEVROLAT, 1876.

centurio SCHENKLING, 1906 (*Phaeocyclotomus*)
(I.c., 293)

Holotypus, mehrere Paratypen, Sumatra, Palembang, im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Sumatra, Palembang, Coll. SCHENKLING.

ceylonicum KRAATZ, 1900 (*Stigmatium*)
(I.c., 190–191)

2 Syntypen, Ceylon, bei Weligama, leg. HORN.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1899, Coll. KRAATZ.

ceylonicus KRAATZ, 1900 (*Thanasimus*)
(I.c., 191–192)

Holotypus, Ceylon, Kanthaley-See, leg. HORN; im DEI [Coll. KRAATZ].

chinensis SCHENKLING, 1915 (*Callimerus*)
(Ent. Mitt. 4, 111–112)

Mehrere Syntypen, Südhina, Kweitschou, Kiangsi, Kanton, im DEI.
DEI: 3 Ex. China, Kweitschou, 1 Ex. Canton, durch STAUDINGER (PLASON!); Syntypen.

cicatricosa LEA, 1907 (*Lemidia*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 51, 334, 344)

Mehrere Syntypen; Tasmania, leg. GRIFFITH, Launceston, George Town, West Tamar, leg. SIMSON, Mount Wellington, Hobart, Frankford, leg. LEA; King Island, leg. KERSHAW und LEA; Victoria, leg. FRENCH; N. S. Wales, Otford, im Macleay Museum.

DEI: 2 Syntypen, Tasmania, King Island, leg. LEA, Coll. HACKER.

cinctus SCHENKLING, 1915 (*Clerus*)
(Ent. Mitt. 4, 315)

Holotypus, Peru, Vilcanota, im DEI [leg. STAUDINGER, Coll. SCHENKLING].

cinereum GORHAM, 1878 (*Stigmatium*)
(Trans. Ent. Soc. London, 165)

Mehrere Syntypen; New Guinea, Dorey, leg. WALLACE; Andaman Isles; in Coll. FRAY und Coll. GORHAM.
DEI: 1 Syntypus, Dorey, leg. WALLACE, Coll. SCHENKLING.

circumcincta SCHENKLING, 1906 (*Lemidia*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 302)

Holotypus, mehrere Paratypen, Queensland, Kuranda, leg. DODD, im DEI.
DEI: Holotypus, Queensland, Kuranda, leg. DODD; 6 Paratypen, dto., VII., VIII. 1904.

circumductus SCHENKLING, 1915 (*Clerus*)
(Ent. Mitt. 4, 314–315)

Holotypus, Amazonas, im DEI [Coll. KRAATZ].

coccineus SCHENKLING, 1906 (*Clerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 272, Taf. 2, Fig. 7)

Holotypus, mehrere Paratypen, Nord-Mexiko, Tsuque, im DEI.
DEI: Holotypus, 2 Paratypen, Nord-Mexiko, Tsuque, Coll. KRAATZ.

conspicua SCHENKLING, 1900 (*Axina*)
(I.c., 390)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. GRANDJEAN und Coll. SCHENKLING.
DEI: 4 Syntypen, Brasilien, Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

cribrata SCHENKLING, 1916 (*Eleale*)
(Ent. Mitt. 5, 148—149)

Mehrere Syntypen, N. S. Wales, im DEI.

DEI: 1 Ex. Belmore, leg. TAYLOR, Coll. HACKER; 2 Ex. N. Holl., Coll. KRAATZ; 1 Ex. Collect. PLASON; Syntypen.

cribratus SCHENKLING, 1908 (*Callimerus*)
(Rec. Ind. Mus. 2, 4, 387)

Holotypus, Bengal, Berhampur, Murshidabad District, leg. LLOYD, ex Museum Indian; im DEI [I. I. 1908].

cribricollis SCHENKLING, 1915 (*Cladiscus*)
(Ent. Mitt. 4, 108)

Holotypus, Tonkin, Sept Pagodes, durch LE MOULT, im DEI.

cribrifemoris SCHENKLING, 1916 (*Tarsostenodes*)
(I.c. 5, 154—155)

9 Syntypen, Australia, Kuranda, Herberton, im DEI.

DEI: 4 Ex. Quidl., Kuranda, leg. DODD, 1 Ex. dto., leg. HACKER, Coll. HACKER; 2 Ex. Herberton, I., II. 1911, 3700 ft., leg. DODD: Syntypen.

cruciger SCHENKLING, 1906 (*Orthrius*)
(Dtch. Ent. Ztschr., 269)

Holotypus, mehrere Paratypen, Queensland, Kuranda, leg. DODD, im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

curticollis SCHENKLING, 1906 (*Tenerus*)
(I.c., 305—306, Taf. 2, Fig. 12)

Holotypus, Nepal, im DEI [leg. WEBER, Coll. KRAATZ].

cuspidata SCHENKLING, 1902 (*Pallenis*)
(Bull. Mus. Paris 8, 317—318)

Mehrere Syntypen, Madagascar, baie d' Antongil, 1898, leg. MOCQUERYS, im Museum Paris.
DEI: 2 Syntypen, S. de la baie d' Antongil, Coll. SCHENKLING, Coll. KRAATZ.

cyanella GORHAM, 1878 (*Dolichopsis*)
(Trans. Ent. Soc. London, 155—156)

Mehrere Syntypen, Prom. Bon. Spei., Coll. GORHAM, im Museum SAUNDERS.
DEI: 1 Syntypus, Cap. Bon. Spei., Coll. SCHENKLING.

cyanescens KRAATZ, 1899 (*Cephaloclerus*)
(Dtch. Ent. Ztschr., 106)

1 Ex. Togo, leg. CONRADT, 1 Ex. Gabun, leg. WEBER; Syntypen.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. KRAATZ.

cyanipennis GORHAM, 1883 (*Hydnocera*)
(Biol. Centr.-Amer. 3, 2, 175)

Mehrere Syntypen, Guatemala, Calderas, Capetillo, Quiche Mountains, leg. CHAMPION.
DEI: 2 Syntypen, Guatemala, Calderas, leg. CHAMPION.

cyanipennis PIC, 1948 (*Enopliomorpha*)
(Tijdschr. Ent. (1948), 131)

Holotypus, Africa centralis, Bangui, im DEI [Dubangui-Chari-Tchad].

cylindricollis GORHAM, 1886 (*Hydnocera*)
(Biol. Centr.-Amer. 3, 2 (Suppl.), 343)

Mehrere Syntypen; Nicaragua, Chontales, leg. JANSON; Panama, Bugaba, David, Volcan de Chiriqui below 4000 ft., leg. CHAMPION.

DEI: 1 Ex. Panama, Bugaba, leg. CHAMPION, 1 Ex. Teapa, Tabasco, leg. JAN. H. H. S.; Syntypen.

dalmatinus OBENBERGER, 1916 (*Corynetes*)
(Neue Beitr. Syst. Insekt. 1, 22)

Mehrere Syntypen, Dalmatien, Krivošija, Coll. OBENBERGER.

DEI: 1 Syntypus, Crkvica, Krivošije.

dealbatus KRAATZ, 1879 (*Pseudoclerops*)
(Dtch. Ent. Ztschr. 23, 128—129)

Mehrere Syntypen, Amur, leg. CHRISTOPH.

DEI: 3 Syntypen, Amur, leg. CHRISTOPH, Coll. KRAATZ.

defletum SCHENKLING, 1902 (*Pelonium*)
(Not. Leyd. Mus. 23, 129—130)

4 Syntypen, N. O. Sumatra, Tandjung Morawa, Serdang, leg. HAGEN, im Museum Leyden.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. SCHENKLING.

difficilis SCHENKLING, 1912 (*Opilo*)
(Ent. Mitt. 1, 324—325)

Holotypus, Formosa, Taihorinsho, IX. 1909, leg. SAUTER; im DEI.

dimidiata SCHENKLING, 1915 (*Pallenis*)
(I.c. 4, 109–110)

Holotypus, Madagaskar, Tananarivo, im DEI.

dimidiatipennis SCHENKLING, 1899 (*Ommadius*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 155–156)

Mehrere Syntypen, Ins. Aru, Wokan, 1873, leg. BECCARI, im Museum Genua.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. SCHENKLING.

dimidiatus SCHENKLING, 1907 (*Clerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 304–305)

15 Syntypen, Zentral-Amerika, Guerrero, Chilpancingo, 4600 ft., Amula, 6000 ft., VI.–IX., leg. SMITH, im Britischen Museum, Museum Berlin und DEI.

DEI: 1 Ex. Guerrero, Chilpancingo, 2 Ex. dto., durch HÖGE; 1 Ex. dto., 4600 ft., VI., leg. SMITH; Syntypen.

dimidiatus SCHENKLING, 1922 (*Stenocylidrus*)
(Trans. Linn. Soc. London 18, 1, 326–327, Fig. 2)

5 Syntypen, Seychelles Inseln, Silhouette, Wald nahe Mare bis Cochons, über 1000 ft., Hochwald 1000–2000 ft., VIII. bis IX. 1908, PERCY SLADEN TRUST Exped.

DEI: 1 Syntypus, Silhouette, 1908, Exp. Seychelles.

discoidealis SCHENKLING, 1908 (*Diplophorus*)

(In: SJÖSTEDT, Y.: Ergebn. Schwed. Zool. Exped. Kilimandjaro 7, 7, 70, Taf. 2, Fig. 3)

Mehrere Syntypen, Deutsch-Ostafrika, Kilimandjaro, 1905–1906, leg. SJÖSTEDT.

DEI: 1 Syntypus, Kilimandjaro, Kibonoto, 1300 m, 1905–1906, leg. SJÖSTEDT.

distinguendus SCHENKLING, 1908 (*Opilo*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 477)

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, Hulikal, 6000 ft., X., leg. ANDREWES, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Nilgiri Hills.

diversipes SCHENKLING, 1916 (*Stigmatium*)

(Arch. Naturg. 82, A 5, 118)

Holotypus, Formosa, Hoozan, III. 1910, leg. SAUTER; im DEI.

dorsalis SCHENKLING, 1902 (*Orthrius*)

(Bull. Mus. Paris 8, 323–324)

Mehrere Syntypen, Dardjiling, 1890, leg. HARMAND, im Museum Paris.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

drescheri SCHENKLING, 1915 (*Callimerus*)

(Ent. Mitt. 4, 111)

Holotypus, Java, Noesa Kembangan, leg. DRESCHER, im DEI [I. 1910].

duodecimpustulatus SCHENKLING, 1912 (*Callimerus*)

(I.c. 1, 323–324)

7 Syntypen, Formosa, Kankau, IV.–V. 1912, Kosempo, V. 1912, Banshoryo, VI. 1912, leg. SAUTER.

DEI: 6 Ex. Formosa, Kankau, Kosum, IV., V. 1912, 1 Ex. Kosempo, V. 1912, 1 Ex. Kankau, 7. IV. 1912, 1 Ex. Banshoryo Distr., Sokutsu, VI. 1912; leg. SAUTER, Syntypen.

2 als Typen ausgezeichnete Ex. derselben Fundortes werden in der Beschreibung nicht genannt.

elegans SCHENKLING, 1907 (*Gyponyx*)

(Ann. South Afr. Mus. 5, 198)

Mehrere Syntypen, Transvaal, Lydenburg District, im South African Museum.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

elegantulus SCHENKLING, 1902 (*Clerus*)

(Bull. Mus. Paris 8, 325)

Mehrere Syntypen, Venezuela, La Victoria, 1896, leg. GEAY, im Museum Paris.

DEI: 1 Syntypus, Venezuela, La Victoria, IX., 33–96, leg. GEAY, ex Museum Paris, Coll. SCHENKLING.

eliminata SCHENKLING, 1900 (*Ichnea*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 400)

Holotypus, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. SCHENKLING; im DEI [leg. DONCKIER].

elongatus HINTZ, 1908 (*Phlogistus*)

(I.c., 710, 713)

Holotypus, N. S. Wales, im DEI [durch STAUDINGER, Coll. SCHENKLING].

elongatus SCHENKLING, 1906 (*Thaneroocerus*)

(I.c., 278)

Holotypus, Yunnan, durch DONCKIER, im DEI.

equestris SCHENKLING, 1906 (*Priocera*)

(I.c., 257)

Holotypus, Brasilien, Jatahy, im DEI [Goyaz, Coll. SCHENKLING].

erinaceus SCHENKLING, 1908 (*Dasyceroclerus*)

(I.c., 481–482)

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, Ouchterlony Valley, 3500 ft., X.–II., leg. ANDREWES, im DEI.

DEI: 3 Syntypen, Nilgiri Hills.

erymanthoides SCHENKLING, 1906 (*Pelonium*)
(l.c., 313)

Holotypus, mehrere Paratypen, Brasilien, Jatahy, im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratype, Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

escherichi KRAATZ, 1894 (*Trichodes*)
(l.c., 132, Taf. 1, Fig. 12b)

Mehrere Syntypen, Turkestan, Bairam-Ali, leg. HAUSER, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Transcasp., Bairam-Ali, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *rectilinea* REITTER, 1894.

escherichi REITTER, 1893 (*Trichodes*)
(Wien. Ent. Ztg. 12, 303—304)

Mehrere Syntypen, Turkestan, Kulab, leg. STAUDINGER und BANG-HAAS.
DEI: 1 Syntypus, Turkestan, Mts. Ghissar, 1893, durch HAUSER, Coll. LEONHARD.

farinosus SCHENKLING, 1915 (*Callimerus*)
(Ent. Mitt. 4, 114)

Mehrere Syntypen, Südinindien, Wallardi bei Travancore, im DEI.
DEI: 1 Ex. Travancore, Wallardi, Coll. LE MOULT; 1 Ex. Wallardi, Coll. RONCHETTI: Syntypen.

fasciatus SCHENKLING, 1908 (*Cladiscus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 362—363)

Holotypus, Westl. Himalaya, Kulu, leg. ROST, im DEI [Beasfluss].

fasciatus SCHENKLING, 1900 (*Clerus*)
(l.c., 394—395)

Mehrere Syntypen, Amazonas, Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKLING.
DEI: 3 Ex. Amazon., 1 Ex. Amazon. Strom, Coll. KRAATZ, Coll. SCHENKLING.

fasciatus SCHENKLING, 1915 (*Orthrius*)
(Ent. Mitt. 4, 248)

2 Syntypen, N. S. Wales, im DEI [Coll. HACKER].

fasciatus KRAATZ, 1899 (*Phaeocyclotomus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 98—99)

Mehrere Syntypen, Nord-Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1896, Coll. KRAATZ.

fascicollis SCHENKLING, 1900 (*Clerus*)
(l.c., 393—394)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Espírito Santo, Coll. SCHENKLING.
DEI: 1 Syntypus, Espírito Santo, Coll. SCHENKLING.

fascicollis SCHENKLING, 1906 (*Evenus*)
(l.c., 299—230, Taf. 2, Fig. 11)

Holotypus, Madagaskar, im DEI [Coll. KRAATZ].

faustus GORHAM, 1892 (*Callimerus*)
(Ann. Mus. Genova (2) 12, 724—725)

Mehrere Syntypen, Burma, Carin Hills, Cheba, 900—1100 m, in Coll. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Cheba, 900—1100 m, 5. XII. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

faustus SCHENKLING, 1900 (*Clerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 395—396)

Mehrere Syntypen, Peru, Callanga, Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKLING.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, durch STAUDINGER.

femoralis SCHENKLING, 1915 (*Callimerus*)
(Ent. Mitt. 4, 112)

Mehrere Syntypen, Südinindien, Wallardi bei Travancore, im DEI.
DEI: 2 Syntypen, Wallardi, durch LE MOULT.

fenestratus PIC, 1953 (*Opilo*)
(Beitr. Ent. 3, 321)

Holotypus, Ost-Asien, China, Shan-Hai-Kouan, im DEI.

flavangulus KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 103)

Holotypus, Togo, leg. CONRADT; im DEI [Coll. KRAATZ].

flavipennis KRAATZ, 1899 (*Neohydna*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 43, 216)

Holotypus, Südwest Sumatra, leg. WEYERS; im DEI [Coll. KRAATZ].

flavipes SCHENKLING, 1899 (*Ommadius*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 342—343)

Mehrere Syntypen, Ins. Mentawai, Sipora, 1894, leg. MODIGLIANI, im Museum Genua.
DEI: 1 Syntypus, Mentawai, Sipora, Scrinu, V.—VI. 1894, leg. MODIGLIANI, Coll. SCHENKLING.

flavus CHAPIN, 1919 (*Callimerus*)
(Proc. Biol. Soc. Washington 32, 233–234)

♂ Holotypus, Luzon, P. J., Mt. Banahao, leg. BAKER, in Coll. BAKER, Nr. 7278; 1 ♀, Paratypus, dto., No. 8290.
DEI: 1 Paratypus, P. J. Mt. Banahao, leg. BAKER.

floccosus SCHENKLING, 1898 (*Opilo*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 363–364)

Mehrere Syntypen, Australia.
DEI: 1 Syntypus, Austral., leg. HEYNE.

formosanum SCHENKLING, 1912 (*Pelonium*)
(Ent. Mitt. 1, 329–330)

Holotypus, Formosa, Kankau, IV. 1912, leg. SAUTER; im DEI [Koshun].

formosanus SCHENKLING, 1912 (*Opilo*)
(l.c., 324)

3 Syntypen, Formosa, Taihorin, VI. 1911, leg. SAUTER; im DEI.

formosanus SCHENKLING, 1912 (*Tenerus*)
(l.c., 329)

Holotypus, Formosa, Kosempo, VIII. 1911, leg. SAUTER; im DEI.

fossipenne SCHENKLING, 1917 (*Pelonium*)
(l.c. 6, 282–283)

Mehrere Syntypen, Argentinien, Mendoza, via JENSEN-HAARUP an SCHENKLING, in Coll. JENSEN-HAARUP und im DEI.
DEI: 2 Syntypen, Mendoza, Santa Rosa.

frater KRAATZ, 1893 (*Trichodes*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 80)

Mehrere Syntypen, Klein-Asien, leg. V. HAUSER.

DEI: 4 Ex. Asia minor, Coll. KRAATZ, 1 Ex. Asia minor, leg. V. HAUSER, in Coll. V. HEYDEN; Syntypen.

fraternus SCHENKLING, 1907 (*Clerus*)
(l.c., 311–312)

Mehrere Syntypen, Amazon, Ega, leg. BATES, im Britischen Museum und DEI.

DEI: 2 Syntypen, Amazon, leg. BATES, 1905, Nr. 100, Coll. FRY.

fritzi PIC, 1947 (*Opetiopalpus*)
(Divers. ent. 1, 5)

Mehrere Syntypen, Afr. mer.

DEI: 3 Syntypen, D.S.-Westafrika, durch FRITZ, Swakopmund.

fulva KRAATZ, 1899 (*Aphelochroa*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 86–87)

Mehrere Syntypen, Niger-Benoe, ex Coll. RICHTER.

DEI: 4 Syntypen, Niger-Benoe, Coll. KRAATZ.

fulvipennis SCHENKLING, 1898 (*Hydnocera*)
(l.c., 366–367)

Holotypus, Guatemala; im DEI [leg. HEYNE, Coll. SCHENKLING].

fulvus KRAATZ, 1899 (*Paradoxocerus*)
(l.c., 84)

Holotypus, Nord-Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT [1896, Coll. KRAATZ].

furcata GORHAM, 1886 (*Hydnocera*)
(Biol. Centr.-Amer. Col. 3, 2, Suppl. 342, Taf. 13, Fig. 14)

Ca. 12 Syntypen, Mexico, Northern Sonora, leg. MORRISON, via MORRISON an SCHENKLING.

DEI: 1 Syntypus, Mexico, N. Sonora, leg. MORRISON, Coll. SCHENKLING.

Syn. zu *discoidea* LECONTE, 1852.

furcatus SCHAEFFER, 1904 (*Colyphus*)
(Journ. New York Ent. Soc. 12, 218)

4 Syntypen, Texas, Brownsville, San Tomas, Esperanza Ranch, im Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences.
DEI: 1 Syntypus, Texas, Brownsville, Esperanza Rch., 30. VII.

gahani SCHENKLING, 1907 (*Clerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 311)

Mehrere Syntypen, Amazon, leg. BATES, im Britischen Museum und DEI.

DEI: 1 Syntypus, Amazon, leg. BATES, 1905, Nr. 100, Coll. FRY.

gemellatus SCHENKLING, 1907 (*Gyponyx*)
(Ann. South Afr. Mus. 5, 198)

Mehrere Syntypen, Cape Colony, Ookiep, im South African Museum.

DEI: 1 Syntypus, Ookiep, 1880.

geminum SCHENKLING, 1900 (*Pelonium*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 409)

Mehrere Syntypen, Peru, Callanga, Coll. SCHENKLING.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

gestroi SCHENKLING, 1899 (*Xestonotus*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 142–143)

Mehrere Syntypen, Brit. Neu Guinea; Mt. Astrolabe, Ighibirei, 1890 u. 1893, leg. LORIA; Fly River, 1876–77, leg. D'ALBERTIS.

DEI: 1 Syntypus, Neu Guinea, Fly River, 1876–77, leg. D'ALBERTIS.

glaber SCHENKLING, 1922 (*Stenoclytidrus*)
(Trans. Linn. Soc. London 18, 1, 327–328, Fig. 3)

6 Syntypen, Seychelles Inseln, Mahé, Gegend oberhalb Port Glaud, ca. 500–1000 ft., XI. 1908; nahe Morne Blanc, ca. 1000 ft., PERCY SLADEN TRUST Exped.

DEI: 1 Syntypus, Mahé, 1908–1909; 1921, Exp. Seychelles, Mus. Cambridge (SCOTT).

gorhami WOLCOTT, 1910 (*Hydnocera*)
(Publ. Field. Mus. Chicago 7, 378, Taf. 5, Fig. 8)

Holotypus, Mexico, Cuernavaca, Morelos, in Coll. WICKHAM, 5 Paratypen, dto., in Coll. WOLCOTT.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, ex Coll. WOLCOTT.

gorhami SCHENKLING, 1898 (*Lemidia*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 174–175)

Mehrere Syntypen, Australia.

DEI: 2 Syntypen, N. Holl., Coll. SCHENKLING und Coll. KRAATZ.

gorhami SCHENKLING, 1906 (*Tenerus*)
(I.c., 306)

Holotypus, Morty, leg. WALLACE, im DEI [Coll. SCHENKLING].

gracilis SCHENKLING, 1898 (*Lemidia*)
(I.c., 178)

Holotypus, Tasmania; im DEI [Emu Bay, Coll. SCHENKLING].

gracilis SCHENKLING, 1906 (*Priocera*)
(I.c., 257)

Holotypus, Brasilien, Jatahy, im DEI [Goyaz, Coll. SCHENKLING].

grandis SCHENKLING, 1902 (*Strotocera*)
(Not. Leyd. Mus. 23, 124–125)

Syntypen: 1 Ex. Java, Mons Tjikorai, 1892, leg. FRUHSTORFER, 2 Ex. Borneo, leg. SLITHOFF, im Museum Leiden; 1 Ex. Südost-Borneo, Tandjong, 1894, leg. SUCK, im Museum Hamburg; 1 Ex. Holländisch-Borneo, Pontianak, via DONCKIER an SCHENKLING, in Coll. SCHENKLING.

DEI: 1 Syntypus, Holl. Borneo, Pontianak, Coll. SCHENKLING.

grandis STIERLIN, 1868 (*Opilus*)
(Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 2, 346–347)

Mehrere Syntypen, Bagdad, leg. SCHLAFLI.

DEI: 3 Syntypen, Bagdad, VII. 1862, Coll. STIERLIN.

grandjeani SCHENKLING, 1901 (*Callimerus*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 45, 104–105)

Mehrere Syntypen, Bengal, Himalaya, Barway, im Museum Brüssel und in Coll. GRANDJEAN.

DEI: 1 Syntypus, Barway, durch CARDON, Coll. SCHENKLING.

grossepunctatus FAIRMAIRE, 1902 (*Opilo*)
(Ann. Soc. Ent. Fr. 71, 555)

Mehrere Syntypen, Madagaskar, Umgebung von Suberbieville, leg. PERRIER.

DEI: 1 Syntypus, Madagaskar, leg. PERRIER (FAIRM.), Coll. SCHENKLING.

hackeri LEA, 1907 (*Lemidia*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 51, 334, 356)

Mehrere Syntypen, Queensland, Coen River, leg. HACKER.

DEI: 2 Syntypen, Queensland, Coen District, Cape York, leg. HACKER, Coll. HACKER.

hackeri SCHENKLING, 1915 (*Phaeocyclotomus*)
(Ent. Mitt. 4, 317–318)

Mehrere Syntypen; Süd-Queensland, Cairns, Coll. HACKER; Nord-Queensland, Kuranda, leg. DODD; im DEI.
DEI: 4 Syntypen, Süd-Queensland, Cairns, Coll. HACKER.

haemorrhoidalis SCHENKLING, 1906 (*Orthrius*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 268, Taf. 2, Fig. 6)

Holotypus, Ceylon, im DEI [leg. LEWIS, Coll. KRAATZ].

heynei SCHENKLING, 1915 (*Cladiscus*)
(Ent. Mitt. 4, 108)

Holotypus, India mer., Shembaganur, durch HEYNE, im DEI.

hirsutus SCHENKLING, 1906 (*Tenerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 306–307)

Holotypus, Sumatra, Tebing tinggi, im DEI [leg. SCHULTHEISS, Coll. KRAATZ].

horni KRAATZ, 1900 (*Callimerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 189–190)

3 Syntypen, Ceylon, bei Anuradhapura und Dambulla, leg. HORN.
DEI: 1 Ex. Ceylon, Anuradhapura, 1 Ex. Dambulla, leg. HORN, Coll. KRAATZ; Syntypen.

hydnoceroides GORHAM, 1893 (*Callimerus*)
(Proc. Zool. Soc. London, 574–575)

Mehrere Syntypen, Burmah, Ruby Mines, leg. DOHERTY.
DEI: 1 Syntypus, Upper Burmah, Ruby Mines, 7500 ft., Coll. KRAATZ.

hypocaustus GORHAM, 1892 (*Oriolo*)
(Ann. Mus. Genova (2) 12, 730)

Mehrere Syntypen, Burma, Carin Hills, Cheba, in Coll. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Cheba, 900–1100 m, 5. XII. 1888, leg. FEA, Coll. SCHENKLING.

illaesicollis KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 101–102)

Holotypus, N. Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].

imitans SCHENKLING, 1908 (*Orthopleurodes*)
(l.c., 706–707)

Holotypus, Natal, leg. O'NEIL, im DEI [1908].

impressipennis GORHAM, 1903 (*Oriolo*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 47, 334–335)

Mehrere Syntypen; India, Nilgiri Hills, Beating, Upper Slopes, leg. ANDREWES, in Coll. ANDREWES.
DEI: 1 Syntypus, Nilgiri Hills, Coll. SCHENKLING.

impressus FAIRMAIRE, 1902 (*Oriolo*)
(Ann. Soc. Ent. Fr. 51, 557)

Mehrere Syntypen, Madagascar, Ankrahittra, leg. PERRIER, Nossi-Bé, leg. COQUEREL.
DEI: 1 Syntypus, Madagascar, leg. PERRIER (FAIRM.), Coll. SCHENKLING.

inaequalicolle SCHENKLING, 1902 (*Pelonium*)
(Bull. Mus. Paris 8, 331–332)

Syntypen: 1 Ex. Amérique méridionale, 1845, leg. CASTELNAU, im Museum Paris; Saint-Paul, in Coll. SCHENKLING (Ex. ?).
DEI: 1 Syntypus, S. Paulo, Coll. SCHENKLING.

inequalis PIC, 1947 (*Necrobinus*)
(Diversites ent. 1, 5)

Mehrere Syntypen, Afr., Le Cap.
DEI: 1 Syntypus, Capland, Willowmore, durch BRAUNS.

insignis SCHENKLING, 1915 (*Cymatodera*)
(Ent. Mitt. 4, 110–111)

Mehrere Syntypen, San José, Costa Rica, durch H. SCHMIDT, im Museum Hamburg und DEI.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, vend. 31. VIII. 1911.

israelicus WINKLER, 1963 (*Trichodes*)
(Beitr. Ent. 13, 890–893, Abb. 1–3)

♂ Holotypus, Palestine, Hadi Raman, leg. BYTINSKI-SALZ, im DEI; 1 ♀, Paratype, dto., in Coll. BYTINSKI-SALZ.
DEI: Holotypus (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).

jacobsoni SCHENKLING, 1915 (*Callimerus*)
(Ent. Mitt. 4, 113)

3 Syntypen, Java, Samarang, leg. JACOBSON, via VETH an SCHENKLING, in Coll. VETH und im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Java, Samarang, VI, 1910, leg. JACOBSON.

jocosum SCHENKLING, 1908 (*Pelonium*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 705–706)

Holotypus, N. O. Australien, Kuranda, leg. DODD, im DEI.

jucundum SCHENKLING, 1900 (*Pelonium*)
(l.c., 404–405)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. SCHENKLING.
DEI: 2 Ex. Brasilien, Goyaz, 1 Ex. dto., leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING, Syntypen.

kelecsenyi GEELEN, 1899 (*Necrobia*)
(Ent. Nachr. 25, 97)

Mehrere Syntypen, Hamburg.
DEI: 1 Syntypus, Kuhwärder, 1897, leg. GEELEN.

kolbei SCHENKLING, 1907 (*Cymatodera*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 303)

2 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Mexiko, Tepic, Navarrete, Coll. FLOHR, im Museum Berlin und in Coll. SCHENKLING.
DEI: 1 Syntypus, Mexiko, Tepic, Coll. FLOHR.

kraatzi SCHENKLING, 1900 (*Pelonium*)
(l.c., 408–409)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ, Coll. GRANDJEAN, Coll. SCHENKLING.
DEI: 4 Ex. Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING, 3 Ex. Prov. Goyaz, Jatahy, IX.–XI. 1897, Coll. KRAATZ;
Syntypen.

kunzeni SCHENKLING, 1929 (*Callimerus*)
(Wien. Ent. Ztg. 46, 82–84, Fig.)

1 Ex. Indien, Hyderabad, bei Bangalore, leg. MAHDIHASSAN, via MAHDIHASSAN an SCHENKLING, 1 Ex. Calcutta, im DEI;
Syntypen.

laterimaculatus KRAATZ, 1900 (*Tenerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 192)

Holotypus, Ceylon, Dambulla, leg. HORN; im DEI [Coll. KRAATZ].

lateripunctatum SCHENKLING, 1908 (*Pelonium*)
(i.e., 314–315)

Holotypus, mehrere Paratypen, Columbien, Muzo, Los Tibayer, Paso del Auiedin, im DEI.
DEI: Holotypus, Columbia, Las Tibayer, 1 Paratypus, Muzo; Coll. KRAATZ.

laterisignatus SCHENKLING, 1922 (*Pallenis*)
(Trans. Linn. Soc. London 18, 1, 325–326, Fig. 1)

6 Syntypen, Seychelles Inseln; Silhouette, Wald nahe Mont Pot-à-eau, ca. 1500 ft., VIII. 1908, Wald nahe Plateau von
Mare aux Cochons, über 1000 ft., VIII.–IX. 1908; Mahé, Hochwald von Morne Blanc und Pilot, ca. 1500–2000 ft.,
XI. 1908; PERCY SLADE TRUST Exped.

DEI: 1 Syntypus, Silhouette, 1908, Seychelles Exp., Mus. Cambridge (SCOTT), 1921.

latesellatus SCHENKLING, 1900 (*Clerus*)
(Mitt. Mus. Hamburg 15, 8–9, Separat)

Mehrere Syntypen, Mexico, in Coll. KRAATZ, Coll. GORHAM, Coll. GRANDJEAN, Coll. SCHENKLING und im Museum Ham-
burg.

DEI: 1 Syntypus, Mexico, leg. STAUDINGER, Coll. SCHENKLING.

lividipenne SCHENKLING, 1912 (*Pelonium*)
(Ent. Mitt. 1, 330)

7 Syntypen, Formosa, Hoozan, V. 1910, Kosempo, VII., VIII. 1911, leg. SAUTER.
DEI: 3 Ex. Formosa, Kosempo, VIII. 1911, 1 Ex. Hoozan, V. 1910; leg. SAUTER, Syntypen.

longipes SCHENKLING, 1907 (*Clerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 303–304)

5 Syntypen, Zentral-Amerika, Temax, N. Yucatan, leg. GAUMER, im Britischen Museum.
DEI: 2 Syntypen, Temax, N. Yucatan, leg. GAUMER.

longula SCHENKLING, 1908 (*Priocera*)
(i.c., 256)

Holotypus, Brasilien, Jatahy, im DEI, mehrere Paratypen, dto.

DEI: Holotypus, Brasilien, Prov. Goyaz, IX.–XI. 1897, Coll. KRAATZ.

longulus SCHENKLING, 1906 (*Ommadious*)
(i.c., 295–296)

Holotypus, mehrere Paratypen, Borneo, Pontianak, via STAUDINGER an SCHENKLING, im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Holl. Borneo, Pontianak, Coll. SCHENKLING.

macer SCHENKLING, 1902 (*Callimerus*)
(Not. Leyd. Mus. 23, 125–126)

4 Syntypen, Java, Simpar bei Tagal, 1890, leg. LUCASSEN, im Museum Leiden.
DEI: 1 Syntypus, Java, Simpar, leg. LUCASSEN, ex Museum Leiden.

maculata SCHENKLING, 1899 (*Chlorocnemis*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 141–142)

Mehrere Syntypen; Neu Guinea, Geelvink Bai, Ansus, 1875, leg. BECCARI; Brit. Neu Guinea, Paumomu Fluss, 1892, leg.
LORIA; im Museum Genoa.
DEI: 2 Syntypen, N. Guinea, Ansus, IV. 1875, leg. BECCARI, Coll. SCHENKLING.

maculata SCHENKLING, 1902 (*Lemidia*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 160)

Mehrere Syntypen, Australien, Victoria.

DEI: 1 Syntypus, Austral., Victoria, Coll. SCHENKLING.

maculiceps KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)
(i.c., 102)

Holotypus, N. Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].

maculiceps KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)
(i.c., 103–104; nom. praeocc. = *conradti* LOHDE, 1899, Ent. Nachr. 25, 305)

Holotypus, Togo, leg. CONRADT; im DEI [Coll. KRAATZ].

maculicollis SCHAEFFER, 1904 (*Pelonium*)
(Journ. New York Ent. Soc. 12, 219–220)

4 Syntypen, Texas, Brownsville, im Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences.
DEI: 2 Syntypen, Texas, Brownsville, Esperanza Rch.

maculicollis KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 102–103; nom. praeocc. = *kraatzi* LOHDE, 1899, Ent. Nachr. 25, 305)

Holotypus, N. Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].

maculiventris SCHENKLING, 1916 (*Tenerus*)
(Ent. Mitt. 5, 149–150)

Mehrere Syntypen, Queensland, Cooktown, Coen District, im DEI.

DEI: 1 Ex. Australien, 1 Ex. Cooktown, Nord-N. H.; Coll. KRAATZ; 1 Ex. Queensland, Coen District, Cape York, leg. HACKER, Coll. HACKER: Syntypen.

magnificus SCHENKLING, 1908 (*Cladiscus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 363)

Holotypus, Malang, auf Borneo ? (Sarawak-Museum), im DEI; [VI. 1900].

marginalis SCHENKLING, 1908 (*Phaeocyclotomus*)
(l.c., 482)

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES, im DEI.

DEI: 2 Syntypen, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES.

meieri SCHENKLING, 1900 (*Pelonium*)
(l.c., 408)

Holotypus, Elbinsel Steinwärder, nahe bei Hamburg, leg. MEIER, Coll. SCHENKLING, aus America mer. ?, eingeschleppt; im DEI [1895].

mediopunctatus SCHENKLING, 1908 (*Ommadius*)
(l.c., 483–484)

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES, im DEI.

DEI: 3 Syntypen, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES.

metasternalis SCHENKLING, 1907 (*Clerus*)
(l.c., 312)

Mehrere Syntypen, Amazon, Ega, leg. BATES, im Britischen Museum und DEI.

DEI: 2 Syntypen, Amazon, leg. BATES, 1905, Nr. 100, Coll. FRY.

militaris SCHENKLING, 1906 (*Clerus*)
(l.c., 272–273)

Holotypus, mehrere Paratypen, Brasilien, San Leopoldo, im DEI.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Brasilien, San Leopoldo, durch SCHNEIDER.

minutus SCHENKLING, 1908 (*Callimerus*)
(l.c., 366–367)

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, Naduvatam, Ouchterlony Valley, 6000–6500 Fuss, XII., V., leg. ANDREWES, im DEI.

DEI: 2 Syntypen, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES.

minutus SCHENKLING, 1899 (*Ommadius*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 161–162)

Mehrere Syntypen, Neu Guinea, Andal, Ramoi, 1872, leg. D'ALBERTIS, im Museum Genua.

DEI: 1 Syntypus, Neu Guinea, Ramoi, IV. 1872, leg. D'ALBERTIS, Coll. SCHENKLING.

mirifica SCHENKLING, 1909 (*Hydnocera*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 307)

2 Syntypen, Mexiko, Ventanas, leg. FLOHR, im Museum Berlin und in Coll. SCHENKLING.

DEI: 1 Syntypus, Mexiko, Ventanas, leg. FLOHR.

modestum GORHAM, 1903 (*Stigmatium*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 47, 336–337)

Mehrere Syntypen, India, Nilgiri Hills, Anamala Hills, 4000 ft., leg. ANDREWES, in Coll. ANDREWES.

DEI: 1 Syntypus, Nilgiri Hills, Coll. SCHENKLING.

modestus KRAATZ, 1899 (*Tillus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 82)

Holotypus, Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI.

monticola SCHENKLING, 1906 (*Orthrius*)
(l.c., 267)

Holotypus, Nordborneo, Kini-Balu, 1500 m, leg. WATERSTRADT, im DEI.

mundula SCHENKLING, 1900 (*Axina*)
(l.c., 391)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. SCHENKLING.

DEI: 2 Syntypen, Brasilien, Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

mundum SCHENKLING, 1912 (*Pelonium*)
(Ent. Mitt. 1, 329)

Holotypus, Formosa, Kosempo, VIII. 1911, leg. SAUTER; im DEI.

muscosus SCHENKLING, 1906 (*Ommadius*)
(l.c., 297)

Holotypus, mehrere Paratypen, Sumatra, Si-Rambé, im DEI.

DEI: Holotypus, 3 Paratypen, Sumatra, Si-Rambé, XII. 1890–III. 1891, durch MODIGLIANI, Coll. KRAATZ.

multilooides HINTZ, 1902 (*Thanasimus*)
(l.c., 181)

6 Syntypen, Usambara, im Museum Berlin.

DEI: 1 Syntypus, Kepai, durch WEISE.

muzensis SCHENKLING, 1915 (*Clerus*)
(Ent. Mitt. 4, 313)

Holotypus, Columbién, Muzo, im DEI [Coll. KRAATZ].

myrmecodes SCHENKLING, 1916 (*Pseudopallenis*)
(I.c. 5, 219)

Mehrere Syntypen, Madagascar, Kap Amber, im DEI.
DEI: 2 Syntypen, Madagascar, Cap d'Ambre, ex Coll. SCHNEIDER.

nanus SCHENKLING, 1901 (*Thaneroclerus*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 45, 106)

Mehrere Syntypen, Sumatra, Painan, Ins. Bodjo, im Museum Brüssel.

DEI: 1 Ex. Painan; 1 Ex. Ile. Bodja, leg. WEYERS; Syntypen.

niger KRAATZ, 1899 (*Cylidrus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 82)

Holotypus, Kamerun, Johann Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].

niger HINTZ, 1908 (*Phlogistus*)
(I.c., 710, 712)

9 Syntypen, N. Queensland, Kuranda, in Coll. HINTZ und im DEI.

DEI: 1 Ex. N. Holl., Coll. KRAATZ; 2 Ex. Kuranda, leg. DODD; Syntypen.

nigra KRAATZ, 1899 (*Chariessa*)
(I.c., 104—105)

Holotypus, N. Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].

Syn. zu *nigerrimus* KUWERTZ, 1893.

nigrifrons SCHENKLING, 1906 (*Axina*)
(I.c., 253, Taf. 2, Fig. 4)

Holotypus, mehrere Paratypen, Puerto Cabello, im DEI.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Puerto Cabello, Coll. SCHENKLING.

nigrifrons KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)
(I.c., 104)

Holotypus, N. Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].

nigripes PIC, 1953 (*Ceratocopus*)
(Beitr. Ent. 3, 320—321)

Holotypus, Ost-Afrika, Pugn, XII. 1913, leg. METHNER, im DEI.

nigriventris GORHAM, 1886 (*Colyphus*)
(Biol. Centr.-Amer. 3 (2), Suppl., 336)

Mehrere Syntypen; Guatemala, Zapote, San Gerónimo, Teleman in Vera Paz, leg. CHAMPION; Panama, Caldera in Chiriquí, Bugaba, leg. CHAMPION.

DEI: 1 Syntypus, Panama, Bugaba, leg. CHAMPION.

nigroaenea GORHAM, 1888 (*Hydnocera*)
(I.c., 174)

Mehrere Syntypen, Mexico, Guanajuato, leg. DUQÉS, Coll. SALLÉ, Puebla, leg. SALLÉ.

DEI: 1 Syntypus, Mexico, Puebla, Coll. SALLÉ.

nilgirensis SCHENKLING, 1908 (*Ommadius*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 484—485)

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, Ouchterlony Valley, 3000—3500 ft., VI.—IX.—XII., leg. ANDREWES, im DEI.

DEI: 2 Syntypen, Nilgiri Hills.

nitida SCHENKLING, 1908 (*Strotocera*)
(I.c., 361—362)

Holotypus, Kamerun, Mundame, leg. ROHDE, im DEI [Coll. KRAATZ].

nitidum SCHENKLING, 1916 (*Gastrocentrum*)
(Arch. Naturg. 82, A 5, 117)

Holotypus, Formosa, Banshoryo Distr., Sokutsu, VII. 1912, leg. SAUTER; im DEI.

nitidus SCHENKLING, 1898 (*Ommadius*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 366)

Mehrere Syntypen, Ceram.

DEI: 2 Syntypen, Ceram, Illo, 1884, leg. RIBBE, Coll. SCHENKLING.

niveifascia SCHAEFFER, 1905 (*Hydnocera*)
(Sci. Bull. Brooklyn Inst. Mus. 1, 156)

Mehrere Syntypen, Arizona, Palmerlee, Cochise Co., leg. SCHAEFFER, im Brooklyn Museum.
DEI: 3 Syntypen, Arizona, Palmerlee, Cochise Co.

obscurus SCHENKLING, 1904 (*Phloeocopus*)
(Ann. Mus. Genova (3) 1, 16—17)

Holotypus, Madagascar, Diego Suarez, via DONCKIER an SCHENKLING, im DEI.

occidentalis SCHENKLING, 1906 (*Tenerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 307–308)

Holotypus, San Thomé, im DEI [Coll. SCHENKLING].

occipitalis SCHENKLING, 1908 (*Ommadius*)
(l.c., 486–487)

Mehrere Syntypen, N. Queensland, leg. SCHNEIDER, Kuranda, leg. DODD, im DEI.
DEI: Syntypen: 1 Ex. N. Queensland, leg. SCHNEIDER, 3 Ex. Kuranda, leg. DODD.

octopunctatus SCHENKLING, 1906 (*Orthrius*)
(l.c., 267)

Holotypus, Sumatra, im DEI [Coll. KRAATZ].

omissus SCHENKLING, 1906 (*Ommadius*)
(l.c., 295, Taf. 2, Fig. 10)

Holotypus, mehrere Paratypen, Celebes, via STAUDINGER an SCHENKLING, im DEI.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Celebes, durch STAUDINGER, Coll. SCHENKLING und Coll. KRAATZ.

orientalis HINTZ, 1902 (*Cardiostichus*)
(l.c., 191)

6 Syntypen, Usambara, im Museum Berlin.

DEI: 1 Syntypus, D. Ost-Afrika, Lindi, Coll. SCHENKLING.

pallidiventre GORHAM, 1876 (*Stigmatium*)
(Cist. Ent. 2, 97–98)

Mehrere Syntypen, Mysol, durch CHEVROLAT.

DEI: 1 Syntypus, Mysol, Wallace, Coll. SCHENKLING.

pallida LEA, 1907 (*Lemidia*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 51, 334, 348)

Mehrere Syntypen, N. S. Wales, leg. FRENCH, Tarcutta, im Macleay Museum, Sydney, Blue Mountains, leg. FERGUSON, Galston, Clifton, National Park, Como, leg. LEA.

DEI: 1 Syntypus, N. S. Wales, Clifton, leg. LEA, Coll. HACKER.

pallipes KRAATZ, 1899 (*Neohydinus*)
(l.c. 43, 215)

Holotypus, Südwest Sumatra, leg. WEYERS; im DEI [Coll. KRAATZ].

parallela PIC, 1948 (*Enopliomorpha*)
(Tijdschr. Ent. (1948), 131–132)

Holotypus, Africa australis, Rhodesia, im DEI [Plumtin].

parcepunctata SCHENKLING, 1900 (*Axina*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 388–389)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. BRANSIK und Coll. SCHENKLING.

DEI: 4 Syntypen, Brasilien, Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

parva SCHENKLING, 1908 (*Eucymatodera*)
(l.c., 364–365)

2 Ex. Deutsch-Südwestafrika, Outyo, leg. LANGHELD, 1 Ex. Damara bis Ngamisee, leg. FLECK, im DEI und Museum Berlin:
Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, Deutsch SW Afrika, Outyo, leg. LANGHELD.

parvicollis SCHENKLING, 1908 (*Thanasimus*)
(l.c., 478)

Holotypus, Deutsch-Ostafrika, Kigonsera, leg. ERTL, im DEI.

parvulus SCHENKLING, 1900 (*Epiphloeus*)
(l.c., 398–399)

Holotypus, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. SCHENKLING; im DEI [durch DONCKIER].

parvum KRAATZ, 1899 (*Pyrrhostigmatum*)
(l.c., 97)

Holotypus, SO.-Kamerun, Lolodorf, leg. CONRADT; im DEI [1895, Coll. KRAATZ].

parvus SCHENKLING, 1916 (*Thanerocerus*)
(Ent. Mitt. 5, 222)

2 Syntypen, Java, Preanger, in Coll. CORPORAAL und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Java, Preanger, Tjimbong, durch CORPORAAL.

paula SCHENKLING, 1908 (*Tillicera*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 224)

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, in Coll. ANDREWES und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Nilgiri Hills.

pectoralis SCHENKLING, 1899 (*Chlorocnemis*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 141)

Mehrere Syntypen; Australia, Somerset, 1875, leg. D'ALBERTIS; Brit. Neu Guinea, Bujakori, 1890, leg. LORIA; im Museum Genua.

DEI: 1 Syntypus, Australia, Somerset, I. 1875, leg. D'ALBERTIS, Coll. SCHENKLING.

pectoralis KRAATZ, 1899 (*Cylidrus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 81)

Mehrere Syntypen, Togo und Nigro-Benue, leg. CONRADT.

DEI: 1 Ex. Niger-Benue, 1 Ex. Togo, 1 Ex. dito., leg. CONRADT; Coll. KRAATZ, Syntypen.

pectoralis SCHENKLING, 1912 (*Ommadius*)
(Ent. Mitt. 1, 326—327)

Mehrere Syntypen, Formosa, Fuhosho, VII. 1909/VIII. 1911, Taihorinsho, IX. 1909, Hoozan, 1909, Kosempo, VIII. 1911, Alikang, X. 1911, Kankau, IV. — V. 1912, leg. SAUTER.

DEI: Syntypen, Formosa, leg. SAUTER: 3 Ex. Fuhosho, VII. 1909/7. VIII.; 4 Ex. Taihorinsho, VIII., IX., 7. IX. 1909; 3 Ex. Hoozan, 1908—10; 6 Ex. Kosempo, 7. VIII., 7. IX. 1909/VII., 7. VIII. 1911; 4 Ex. Alikang, 7. X.; 4 Ex. Kankau, IV., V. 1912.

pectoralis SCHENKLING, 1900 (*Platynoptera*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 401—402)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, in Coll. GRANDJEAN und Coll. SCHENKLING.
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

pelonioides SCHENKLING, 1915 (*Clerus*)
(Ent. Mitt. 4, 315—316)

Holotypus, Mexico, Jalapa, im DEI [1908].

penicillatus SCHENKLING, 1899 (*Metademius*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 137—138)

Mehrere Syntypen, Brit. Neu Guinea, Ins. Yule, VI. 1875, leg. D'ALBERTIS, im Museum Genusa.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. SCHENKLING.

pernix SCHENKLING, 1915 (*Callimerus*)
(Ent. Mitt. 4, 112—113)

7 Syntypen, östl. Himalaya, Kursong, 4700—5000 ft., im Indian Museum Kalkutta und DEI.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Annandale, 24. VI. 1910.

persicus KRAATZ, 1894 (*Trichodes*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 126)

9 Syntypen, Persien, Hadschgabad.

DEI: 3 Syntypen, Hadschgabad, durch LEDERER, Coll. KRAATZ.

piceocinctus KRAATZ, 1899 (*Phaeocyclotomus*)
(l.c., 92—93)

Mehrere Syntypen, Nord-Kamerun, Togo, leg. CONRADT.

DEI: Syntypen: 4 Ex. N. Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 1896; 2 Ex. Togo; leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

picta SCHENKLING, 1907 (*Axina*)
(l.c., 309)

Mehrere Syntypen, Amazon, Coll. BATES, Coll. FRY, im Britischen Museum und DEI.

DEI: 1 Syntypus, Amazon, durch BATES, Coll. FRY, 1903, Nr. 100.

pictipennis KRAATZ, 1899 (*Phaeocyclotomus*)
(l.c., 98)

2 Syntypen, Westafrika, Kamerun, Togo, leg. CONRADT.

DEI: 2 Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

placidum SCHENKLING, 1900 (*Pelonium*)
(l.c., 405—406)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKLING.

DEI: Syntypen, Brasilien: 2 Ex. Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKLING; 1 Ex. Prov. Goyaz, Jatahy, IX.—XI. 1897, Coll. KRAATZ.

plagiata SCHENKLING, 1900 (*Axina*)
(l.c., 390—391)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. GRANDJEAN und Coll. SCHENKLING.

DEI: 3 Syntypen, Brasilien, Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

plicaticollis SCHENKLING, 1916 (*Eleale*)
(Ent. Mitt. 5, 147—148)

Mehrere Syntypen; N. S.-Wales, National Park; Victoria, Mallee Distr.; Tasmania, Mole Creek; im DEI.

DEI: 2 Ex. Tasmania, Mole Creek, durch LEA, Coll. HACKER; 2 Ex. New S.-Wales, National Park, durch TAYLOR, Coll. HACKER: Syntypen.

plumbeus SCHENKLING, 1906 (*Phloeocopus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 259)

Holotypus, mehrere Paratypen, Madagascar, Ankazoaba, 1902, leg. BASTARD.

DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

podagraria SCHENKLING, 1900 (*Priocera*)
(l.c., 385—386)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, in Coll. FAIRMAIRE, Coll. GRANDJEAN und Coll. SCHENKLING.

DEI: 2 Syntypen, Brasilien, Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

pretiosus GORHAM, 1892 (*Callimerus*)
(Ann. Mus. Genova (2) 12, 727)

2 Syntypen, Upper Burma, Bhamo, 1885—86, in Coll. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamo, VI. 1886, leg. FEA.

princeps GORHAM, 1886 (*Epiphloeus*)
(Biol. Centr.-Amer. 3 (2), Suppl., 340, Taf. 12, Fig. 19)

Mehrere Syntypen, Panama, Bugaba, 1000 ft., leg. CHAMPION.
DEI: 2 Syntypen, Bugaba, 800—1500 ft., leg. CHAMPION, Coll. SCHENKLING.

procera SCHENKLING, 1900 (*Ichneia*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 399—400)

Mehrere Syntypen, Peru, Callanga, in Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKLING.
DEI: 6 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, durch STAUDINGER.

prolongatus SCHENKLING, 1912 (*Orthrius*)
(Ent. Mitt. 1, 325)

6 Syntypen, Formosa, leg. SAUTER: Taihorinsho, III., X. 1909, Kosempo, VIII. 1911, Taihorin, IX. 1911, Kankau, IV.—V. 1912.

DEI: Syntypen, Formosa, leg. SAUTER: 2 Ex. Kosempo, VIII. 1911/22, V. 1912 (Datum nicht erwähnt); 2 Ex. Taihorinsho, VII./1909/7, IX. 1911 (Daten nicht erwähnt); 1 Ex. Kankau, Koshun, IV. 1912; 1 Ex. Taihorin, 7. IX. 1911.

proximus SCHENKLING, 1908 (*Tenerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 703)

Mehrere Syntypen, Borneo, Klingkang, im Sarawak-Museum und DEI.
DEI: 1 Syntypus, Klingkang, 1.

pulcher SCHENKLING, 1907 (*Clerus*)
(l.c., 310—311)

Mehrere Syntypen, Amazon, leg. BATES, im Britischen Museum und DEI.
DEI: 1 Syntypus, Amazon, 1905, leg. BATES, Nr. 100, Coll. FRY.

pulcher SCHENKLING, 1906 (*Diplophorus*)
(l.c., 247—248)

Holotypus, Africa (or.?), im DEI [♂].

pulcherrimus SCHENKLING, 1899 (*Ommadius*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 338—339)

Mehrere Syntypen, Sumatra, Si-Rambé, 1890—91, leg. MODIGLIANI, im Museum Genua.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, XII. 1890—III. 1891, Coll. SCHENKLING.

punctatus HINTZ, 1908 (*Phlogistus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 710, 713—714)

17 Syntypen, Australia, Kuranda, in Coll. HINTZ und im DEI.
DEI: 5 Syntypen, Kuranda, leg. DODD.

puncticollis KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 43, 216—217)

2 Syntypen, Südwest Sumatra, leg. WEYERS, im DEI [Coll. KRAATZ].

purpurea LEA, 1907 (*Lemidia*)
(l.c. 51, 332, 341)

Holotypus, Queensland, Coen River, Coll. HACKER, im DEI.

pusilla SCHENKLING, 1906 (*Lemidia*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 303)

Holotypus, mehrere Paratypen, Queensland, Kuranda, leg. DODD, im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratype, Kuranda, leg. DODD.

pusio SCHENKLING, 1906 (*Clerus*)
(l.c., 276)

Holotypus, mehrere Paratypen, Peru, Callanga, Marcapata, im DEI.

DEI: Holotypus, 1 Paratype, Peru, Callanga, durch STAUDINGER, Coll. SCHENKLING und Coll. KRAATZ.

quadrifoveolatum SCHENKLING, 1906 (*Pelonium*)
(l.c., 313—314)

Holotypus, mehrere Paratypen, Brasilien, Jatahy, im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratype, Brasilien, Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

quadrinotata SCHENKLING, 1900 (*Priocera*)
(l.c., 386—387)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, in Coll. FAIRMAIRE, Coll. GRANDJEAN, Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKLING.

DEI: 2 Ex. Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING; 2 Ex. Prov. Goyaz, Jatahy, IX.—XI. 1897, Coll. KRAATZ: Syntypen.

quadriplagiata GAHAN, 1908 (*Dieropsis*)
(Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 1, 96)

Mehrere Syntypen, British Central Africa, Kondowe, leg. WHYTE, Niomkolo, leg. CARSON, Fwambo, leg. NUTT.
DEI: 1 ♀, Syntypus, E. Africa, Niomkolo, 91—28.

rectefasciatus SCHENKLING, 1915 (*Clerus*)
(Ent. Mitt. 4, 313)

2 Syntypen, Brasilien, San Leopoldo, via SCHNEIDER an SCHENKLING, im DEI.

rhodesianum SCHENKLING, 1907 (*Stigmatium*)
(Ann. S. Afr. Mus. 5, 201—202)

Mehrere Syntypen, Rhodesia, Sebakwe, im South African Museum.
DEI: 1 Syntypus, Rhodesia, Sebakwe.

rosti SCHENKLING, 1908 (*Cladiscus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 362)

Holotypus, Westl. Himalaya, Kulu, leg. ROST, im DEI [Beasfluss].

rotundopunctatus HINTZ, 1908 (*Phlogistus*)
(I.c., 711, 714)

3 Syntypen, Australia, Kuranda, in Coll. HINTZ und im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Kuranda, leg. DODD.

ruficeps KRAATZ, 1899 (*Microstigmatium*)
(I.c., 100—101)

25 Syntypen, Togo, leg. CONRADT; im DEI [Coll. KRAATZ].

ruficeps SCHENKLING, 1900 (*Pelonium*)
(I.c., 404)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, in Coll. SCHENKLING.

DEI: 2 Ex. Goyaz, 1 Ex. Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER; Coll. SCHENKLING, Syntypen.

rufimanus SCHENKLING, 1900 (*Clerus*)
(I.c., 395)

Mehrere Syntypen, Peru, Paranga, Coll. SCHENKLING.

DEI: 3 Syntypen, Peru, Callanga, durch STAUDINGER, Coll. SCHENKLING.

Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Paranga“ steht auf dem Etikett „Callanga“.

rufipes KRAATZ, 1899 (*Phaeocyclotomus*)
(I.c., 95—96)

Mehrere Syntypen, Westafrica, Kamerun, Togo, leg. CONRADT.

DEI: 4 Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

rufipes SCHENKLING, 1898 (*Poecilochroa*)
(I.c., 364—365)

Mehrere Syntypen, Mexiko, leg. COMITÁN.

DEI: Lectotypus, Mexiko, durch SPEYER, Coll. SCHENKLING; 1 ♀, Paralectotypus, Mexiko, leg. COMITÁN, Coll. KRAATZ; von EKIS designiert.

rufofemoratus KRAATZ, 1899 (*Cephaloclerus*)
(I.c., 106)

Holotypus, Togo, leg. CONRADT; im DEI [Coll. KRAATZ].

rufofemoratus SCHENKLING, 1915 (*Clerus*)
(Ent. Mitt. 4, 314)

Holotypus, Peru, Chanchamayo, im DEI [leg. HEYNE].

rufopiceum KRAATZ, 1899 (*Pyrrhostigmatium*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 97)

2 Syntypen, Nord-Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1896, Coll. KRAATZ.

rufostaceus SCHENKLING, 1902 (*Orthrius*)
(Bull. Mus. Paris 8, 323)

Mehrere Syntypen, Dardjiling, 1890, leg. HARMAND, im Museum Paris.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. SCHENKLING.

rufum KRAATZ, 1899 (*Pyrrhostigmatium*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 96)

Holotypus, Gabun, durch WEBER; im DEI [Coll. KRAATZ].

rufus KRAATZ, 1899 (*Corynetes*)
(I.c., 107)

Holotypus, Nord-Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896].

rugulicollis SCHENKLING, 1906 (*Opilo*)
(I.c., 260)

Holotypus, Darjeeling, im DEI [Hammer, Coll. SCHENKLING].

salamandra SCHENKLING, 1906 (*Priocera*)
(I.c., 255)

Holotypus, Mexiko, im DEI [Coll. KRAATZ].

sanguineus SCHENKLING, 1899 (*Tenerus*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 344—345)

Mehrere Syntypen, Ins. Nias, 1897—98, leg. RAAP, im Museum Genua.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

sauteri SCHENKLING, 1912 (*Allochotes*)
(Ent. Mitt. 1, 328)

15 Syntypen, Formosa, Kankau, IV. 1912, leg. SAUTER.
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

sauteri SCHENKLING, 1912 (*Cladiscus*)
(l.c., 322)

2 Syntypen, Formosa, Kosempo, VI. 1911, Banshoryo, VI. 1912, leg. SAUTER; im DEI [Sokutsu].

schenklingi HINTZ, 1908 (*Phlogistus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 712, 715)

13 Syntypen, Australia, N. S. Wales, in Coll. HINTZ und im DEI.
DEI: 3 Ex. Australia, Coll. HACKER-Coll. KRAATZ; 1 Ex. N. Holl., Coll. KRAATZ: Syntypen.

schultzei SCHENKLING, 1913 (*Callimerus*)
(Philipp. Journ. Sci. 8, No. 4, 303)

Holotypus, No. 1598, Luzon, Benguet, Baguio, leg. BANKS, in Coll. des Bureau of Science, Manila; Paratypen, No. 1392, Negros Occ., Bago, leg. BANKS, im DEI.
DEI: 1 Paratypus, No. 1392, Negros, Occ., Nakalang, lot Gort. Lab. Coll., leg. BANKS.

schulzi HINTZ, 1908 (*Phlogistus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 710, 712)

7 Syntypen, Australia, Kap York, Kuranda, Endeavour, in Coll. HINTZ und im DEI.
DEI: 1 Ex. N. Holl., Coll. KRAATZ; 1 Ex. Austral.; 2 Ex. Kuranda, leg. DODD; Syntypen.

scitum SCHENKLING, 1906 (*Stigmatum*)
(l.c., 289–290, Taf. 2, Fig. 8)

Holotypus, mehrere Paratypen, Sumatra, Tebing tinggi, im DEI.
DEI: Holotypus, 2 Paratypen, N. O. Sumatra, Tebing tinggi, leg. SCHULTHEISS, Coll. KRAATZ.

scaber SCHENKLING, 1902 (*Phaeocyclotomus*)
(Not. Leyd. Mus. 23, 128–129)

4 Syntypen, West-Java, leg. SIJTHOFF, im Museum Leiden.
DEI: 1 Syntypus, Java, ex Museum Leiden, Coll. SCHENKLING.

scotti SCHENKLING, 1922 (*Anthriboclerus*)
(Trans. Linn. Soc. London 18, 1, 328–329, Fig. 4)

9 Syntypen; Seychelles Inseln, Silhouette, Wald nahe d. Plateau von Mare bis Cochons, über 1000 ft., VIII.–IX. 1908; Mahé, Hochwald von Morne Blanc und Pilot, ca. 1500–2000 ft., XI. 1908, nahe Morne Blanc, ca. 1000 ft., XI. 1908, Cascade Estale, ca. 1000 ft.; PERCY SLADEN TRUST Exped.
DEI: 1 Syntypus, Mahé, 1908–09, Seychelles Exp.

sexnotatus BOHEMAN, 1851 (*Clerus*)
(Ins. Caffraria 1, 496–497)

Mehrere Syntypen, Caffraria, leg. WAHLBERG.
DEI: 1 Syntypus, Caffraria, leg. WAHLBERG.

sexplagiatus SCHENKLING, 1908 (*Orthrius*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 478–479)

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, leg. HAMPSON, im Britischen Museum und DEI.
DEI: 2 Syntypen, Nilgiri Hills, leg. HAMPSON, 94–89.

signatus SCHENKLING, 1915 (*Orthrius*)
(Ent. Mitt. 4, 310)

Holotypus, Bengal, im DEI [Coll. SCHENKLING].

similis SCHENKLING, 1900 (*Epiclines*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 397)

Mehrere Syntypen, Chile, Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKLING.
DEI: Lectotypus, Chile, durch SCHRÖDER; designiert von SOLERVICENS.
Syn. zu *aeneus* PHILIPPI, 1864.

similia SCHENKLING, 1898 (*Priocera*)
(l.c., 362)

Holotypus, via HEYNE an SCHENKLING, ohne Fundortangabe; im DEI [Brasilien, durch HEYNE, Coll. SCHENKLING]
Syn. zu *variegata* KIRBY, 1818.

similis KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)
(l.c., 102)

Holotypus, Ashante, leg. REITTER; im DEI [Coll. KRAATZ].

simillimus SCHENKLING, 1902 (*Tenerus*)
(l.c., 112)

Mehrere Syntypen, Nordost-Sumatra, Tebing tinggi, Tandjong Morawa, 1884–85, leg. SCHULTHEISS, via KRAATZ an SCHENKLING, im Museum Leiden und in Coll. SCHENKLING.
DEI: 2 Syntypen, N. O. Sumatra, Tebing tinggi, leg. SCHULTHEISS, Coll. KRAATZ.

simplex SCHENKLING, 1907 (*Apopempsis*)
(Ann. S. Afr. Mus. 5, 202)

Mehrere Syntypen, S. Rhodesia, Manica, Christmas Pass, im South African Museum.
DEI: 1 Syntypus, S. E. Trop. Afr., Manica, Christmas Pass, Coll. SCHENKLING.

simplex SCHENKLING, 1900 (*Epiphloeus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 397—398)

Mehrere Syntypen, Bolivia, Coll. SCHENKLING.
DEI: 2 Syntypen, Bolivia, durch STAUDINGER, Coll. SCHENKLING.

simplex SCHENKLING, 1903 (*Xenorhrius*)
(Stett. Ent. Ztg. 64, 16—17)

Mehrere Syntypen, Hongkong, leg. BOWRING, im Museum Stettin.
DEI: 1 Syntypus, Hongkong, leg. BOWRING, Coll. SCHENKLING.

simsoni LEA, 1907 (*Lemidia*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 51, 333, 349, Taf. 3, Fig. 58)

Mehrere Syntypen, Tasmania, Launceston, leg. SIMSON und GRIFFITH, Goulds Country, Mole Creek, Beaconsfield, leg. SIMSON, HOBART und LEA; King Island, leg. KERSHAW.
DEI: 1 Syntypus, Tasmania, Launceston, Coll. HACKER.

smaragdinus SCHENKLING, 1899 (*Ommadius*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 152—153)

Mehrere Syntypen; Neu Guinea, Fly River, 1876—77, leg. D'ALBERTIS; Paumomu River, 1892, leg. LORIA; im Museum Genua.

DEI: 1 Syntypus, Neu Guinea, Fly River, 1876—77, leg. D'ALBERTIS, Coll. SCHENKLING.

socius SCHENKLING, 1899 (*Ommadius*)
(l.c., 157)

Mehrere Syntypen, Neu Guinea, Fly River, 1876—77, leg. D'ALBERTIS, im Museum Genua.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. SCHENKLING.

soror SCHENKLING, 1915 (*Pallenis*)
(Ent. Mitt. 4, 110)

Holotypus, Madagaskar, Diego Suarez, im DEI [Coll. SCHENKLING].

soror SCHENKLING, 1908 (*Tillicera*)
(Not. Leyd. Mus. 23, 127—128)

Mehrere Syntypen, Brit. Bootang, Bhutan, leg. DUREL, im Museum Leiden.
DEI: 1 Syntypus, Brit. Bootang, leg. DUREL.

speciosus HINTZ, 1908 (*Phlogistus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 710, 713)

11 Syntypen, N. Queensland, Kuranda, Townsville, in Coll. HINTZ und im DEI.
DEI: 4 Syntypen, Kuranda, leg. DODD.

spectabilis KRAATZ, 1883 (*Trichodes*)
(l.c. 27, 346)

Holotypus, Turkestan, Osch, Coll. KRAATZ; im DEI.

spinipenne KRAATZ, 1899 (*Oxystigmatium*)
(l.c., 91—92)

Mehrere Syntypen, Nord-Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1896, Coll. KRAATZ.

stictica GORHAM, 1882 (*Priocera*)
(Biol. Centr.-Amer. 3 (2), 140, Taf. 7, Fig. 17)

Mehrere Syntypen; Mexico, Oaxaca, leg. HöGE und SALLÉ; Guatemala, Teleman, San Juan, Calderas, Cerro Zunil, Panteón, Panajachel, leg. CHAMPION; Nicaragua, Chontales, leg. BELT; Panama, Volcan de Chiriquí, leg. CHAMPION.
DEI: 2 Syntypen, V. de Chiriquí, 25—4000 ft., leg. CHAMPION, Coll. SCHENKLING.

striatopunctatus SCHENKLING, 1901 (*Orthrius*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 45, 106)

Mehrere Syntypen, Bengal, Barway, Mandar, im Museum Brüssel.
DEI: 3 Syntypen, Bengal, Mandar, VII. 1891, leg. CARDON, Coll. SCHENKLING.

suavis GORHAM, 1892 (*Callimerus*)
(Ann. Mus. Genova (2) 12, 722—723)

4 Ex. Burma, Carin Hills, Chebà, 900—1100 m, in Coll. FEA; 2 Ex. India, Manipur, leg. DOHERTY, in Coll. FRY; Syntypen.
DEI: 1 Syntypus, Carin Chebà, 900—1100 m, 5. XII. 1888, leg. FEA.

subfuscum GORHAM, 1876 (*Stigmatium*)
(Cist. Ent. 2, 94)

Mehrere Syntypen, Philippine Isles, East Mindanao, durch SEMPER.
DEI: 3 Syntypen, Mindanao, durch GORHAM, Coll. SCHENKLING.

sumatranus KRAATZ, 1899 (*Cylidrus*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 43, 212)

Mehrere Syntypen, Südwest Sumatra, leg. WEYERS.
DEI: 3 Syntypen, Sumatra, Coll. KRAATZ.

sumatranus KRAATZ, 1899 (*Tillus*)
(l.c., 214)

Holotypus, Südwest Sumatra, leg. WEYERS; im DEI [Coll. KRAATZ].

sumatrensis PIC, 1953 (*Teneropsis*)
(Beitr. Ent. 3, 322)

Holotypus, Sumatra, im DEI.

suturale KRAATZ, 1899 (*Microstigmatium*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 101)

Holotypus, Togo, leg. CONRADT; im DEI [Coll. KRAATZ].

suturalis SCHENKLING, 1906 (*Clerus*)
(I.c., 277)

Holotypus, mehrere Paratypen, Brasilien, Jatahy, im DEI.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Brasilien, Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

suturalis SCHENKLING, 1906 (*Dasyceroderus*)
(I.c., 291)

Holotypus, mehrere Paratypen, Sumatra, Si-Rambé, Malakka, im DEI.

DEI: Holotypus, Sumatra, Si-Rambé, XII. 1890 – III. 1891, leg. MODIGLIANI, Coll. KRAATZ; 4 Ex. dto., 1 Ex. Malakka, Coll. KRAATZ; Paratypen.

suturalis SCHENKLING, 1898 (*Platynoptera*)
(I.c., 367 – 368)

Holotypus, Bolivia; im DEI [durch STAUDINGER, Coll. SCHENKLING].

suturalis SEIDLITZ, 1891 (*Trichodes*)
(Fauna Transsylvania, 527)

Mehrere Syntypen, Spanien, in Escorial, 1865.

DEI: 2 Syntypen, Hisp., ex Coll. SEIDLITZ.

tarsale SCHENKLING, 1900 (*Pelonium*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 407)

Mehrere Syntypen; Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy; Paraguay; in Coll. GRANDJEAN und Coll. SCHENKLING.

DEI: Syntypen, Brasilien: 1 Ex. Goyaz, leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING; 2 Ex. Prov. Goyaz, Jatahy; 2 Ex. Paraguay, 1888 .., leg. DRAKE; Coll. KRAATZ.

tarsalis GORHAM, 1892 (*Orthrius*)
(Ann. Mus. Genova (2) 12, 737 – 738)

4 Syntypen, Birmania, Bhamo, 1885 – 86, in Coll. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamo, VIII. 1885, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

terminale SCHENKLING, 1908 (*Enoplium*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 706)

2 Syntypen, Vorderindien, Anamalai Hills, 3500 ft., durch ANDREWES, in Coll. ANDREWES und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Anamalais.

terminalis SCHENKLING, 1912 (*Cladiscus*)
(Ent. Mitt. 1, 322 – 323)

Holotypus, Formosa, Taihorinsho, X. 1909, leg. SAUTER; im DEI [§, 7. X.].

termitincola CORPORAAL, 1939 (*Thanerocerus*)
(Bijdr. Dierkd. 27, 351 – 352, Taf. 9, Fig. 6)

Mehrere Syntypen, Sumatra's West Küste, Haraukloof, leg. JACOBSON.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 560 m, VII. 1925.

testacea GORHAM, 1883 (*Hydnocera*)
(Biol. Centr.-Amer. 3 (2), 189)

Mehrere Syntypen; Mexico, Playa Vicente, leg. HÖGE; Guatemala, Cerro Zunil, Quiche Mountains, leg. CHAMPION; Panama, Volcan de Chiriquí, alt. 8000 ft., Bugaba, leg. CHAMPION.

DEI: 1 Syntypus, Cerro Zunil, 4 – 5000 ft., leg. CHAMPION.

texana WOLCOTT, 1908 (*Chariessa*)
(Ent. News 19, 70, 72)

3 Syntypen, Texas, Nolan County, Sweetwater, via WOODING an WOLCOTT.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. WOODING.

thoracicus SCHENKLING, 1907 (*Aulicus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 305)

4 Syntypen, Zentral-Amerika, Guerrero, Venta de Zopilote, 2800 ft., leg. SMITH, im Britischen Museum und in Coll. SCHENKLING.

DEI: 1 Syntypus, Guerrero, Venta de Zopilote, 2800 ft., X., leg. SMITH.

tibialis SCHENKLING, 1915 (*Orthrius*)
(Ent. Mitt. 4, 310 – 311; nom. praeocc. = *tonkineus* PIC, 1925, Echange (40) 41, 15)

Holotypus, Tonkin, Laokay, via SALVAZA an SCHENKLING, im DEI [V. 1913].

tibialis SCHENKLING, 1906 (*Orthrius*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 268 – 269)

Holotypus, mehrere Paratypen, Assam, im DEI.

DEI: Holotypus, Assam, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *brachialis* GORHAM, 1893.

tibialis KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)
(l.c., 104)

Holotypus, N. Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].

togenis SCHENKLING, 1906 (*Phloeocopus*)
(l.c., 258)

Holotypus, mehrere Paratypen, Togo, im DEI.
DEI: Holotypus, Togo, Coll. KRAATZ.

tomentosus SCHENKLING, 1906 (*Clerus*)
(l.c., 275—276)

Holotypus, mehrere Paratypen, Central-Cordillere, unt. Salento, Muzo, im DEI.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

tricolor SCHENKLING, 1902 (*Ommadius*)
(l.c., 158—159)

Mehrere Syntypen, Sumatra, Palembang, Java, in Coll. GRANDJEAN, Coll. SCHENKLING und im Museum Leiden.
DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Palembang, Coll. SCHENKLING.

Syn. zu *ustulatus* GORHAM, 1878.

tricolor SCHENKLING, 1908 (*Orthrius*)
(l.c., 479)

Holotypus, Queensland, leg. SCHNEIDER, im DEI [1906].

trinotatus SCHENKLING, 1916 (*Tenerus*)
(Ent. Mitt. 5, 150)

Holotypus, Togo, im DEI [durch LUDWIG].

tubercularis GORHAM, 1882 (*Clerus*)
(Biol. Centr.-Amer. 3 (2), 153, Taf. 8, Fig. 20)

Mehrere Syntypen: Mexico, Cordova, leg. SALLÉ; Guatemala, Cerro Zunil, Capetillo, Aceituno, leg. CHAMPION.
DEI: 1 Syntypus, Cerro Zunil, 4—5000 ft., leg. CHAMPION, Coll. SCHENKLING.

tuberculatus SCHENKLING, 1906 (*Neoclerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 278—279)

Holotypus, Ceylon, leg. LEWIS, im DEI [Coll. KRAATZ].

tuberculatus SCHENKLING, 1906 (*Neotenerus*)
(l.c., 309)

Holotypus, mehrere Paratypen, Brasilien, Jatahy, Paraguay; im DEI.

DEI: Holotypus, Brasil., Prov. Goyaz, Jatahy, IX.—XI., Coll. SCHENKLING; 2 Ex. dto., Coll. SCHENKLING und Coll. KRAATZ; 1 Ex. Paraguay, 188., leg. DRAKE, Coll. KRAATZ: Paratypen.

tuberculicollis CHEVROLAT, 1874 (*Opilo*)
(Rev. Mag. Zool., 284—285)

Mehrere Syntypen, Africa Australi, Natal, in Coll. CHEVROLAT.

DEI: 1 Syntypus, Afr. mer. (Fundort nicht lesbar!), durch CHEVROLAT, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *nodicollis* BOHEMAN, 1851.

tuberculicollis SCHENKLING, 1902 (*Orthrius*)
(Bull. Mus. Paris 8, 323)

Mehrere Syntypen, Dardjiling, 1890, leg. HARMAND, im Museum Paris.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

tuberculipenne SCHENKLING, 1900 (*Pelonium*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 406)

Mehrere Syntypen, Chile, Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKLING.

DEI: 3 Ex. Chile, durch SCHRÖDER, 4 Ex. Chile; Coll. SCHENKLING, Syntypen.

Syn. zu *insignicorne* FAIRMAIRE, 1861.

tucumanensis SCHENKLING, 1908 (*Platynoptera*)
(l.c., 703—704)

1 Ex. Argentina, Prov. Tucuman, bei Tapia, 1903, leg. BAER, via PIC an DEI; 1 Ex. Tucuman, leg. BRUCH, im La Plata-Museum; Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, Argentine, Prov. Tucuman, Tapia, 600 m, 3. IV. 1903, leg. BAER, Coll. PIC, 1906 — Coll. SCHENKLING.

tugelanus GORHAM, 1900 (*Trichodes*)
(Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 5, 72—74)

3 Syntypen, Natal, Tugela River, Weenen, 1896, leg. MARSHALL.

DEI: 1 Syntypus, Natal, Weenen, durch GORHAM, Coll. SCHENKLING.

umbratus SCHENKLING, 1912 (*Xenorhrius*)
(Ent. Mitt. 1, 325—326)

Mehrere Syntypen, Formosa, Kosempo, IX. 1911/V. 1912, Kankau, IV.—V. 1912, leg. SAUTER.

DEI: Syntypen, Formosa, leg. SAUTER: 5 Ex. Kosempo, 7. IX. 1909 (Datum nicht erwähnt!), 7. IX. 1911; 6 Ex. Kankau, Koshun, IV., V. 1912.

uncinatus SCHENKLING, 1907 (*Clerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 312)

Mehrere Syntypen, Amazon, leg. BATES, im Britischen Museum und DEI.

DEI: 1 Syntypus, Amazon, leg. BATES, 1906, ex Britisches Museum.

undatus SCHENKLING, 1899 (*Ommadius*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 343–344)

Mehrere Syntypen, Sumatra, Si-Rambé, 1890–91, leg. MODIGLIANI, im Museum Genua.
DEI: 2 Syntypen, Sumatra, Si-Rambé, XII. 1890–III. 1891, leg. MODIGLIANI, Coll. SCHENKLING.

ungulatus ELSTON, 1922 (*Phlogistus*)
(Trans. Proc. R. Soc. S. Austr. 46, 314)

Holotypus, mehrere Paratypen, Western Australia, Swan River, leg. CLARK, in Coll. ELSTON.
DEI: 2 Paratypen, W. Australia, Swan R., leg. CLARK.

unifasciata SCHENKLING, 1900 (*Priocera*)
(Mitt. Mus. Hamburg 15, 4, Separat)

Mehrere Syntypen, Brasilia, Lages, im Museum Hamburg.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

unifasciata PIC, 1953 (*Thriocera*)
(Beitr. Ent. 3, 321)

Holotypus, Ost-Afrika, Myombe, III. 1914, leg. METHNER, im DEI [10.–16. III.].

unifasciatum KRAATZ, 1899 (*Microstigmatum*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 100)

Holotypus, Togo, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ; im DEI.

unimaculata PIC, 1940 (*Lebasiella*)
(Echange 56, Nr. 481, 10–11)

Mehrere Syntypen, Mexico, im DEI und in Coll. PIC.
DEI: 1 Syntypus, Mexico, Tasco, durch HOEGE.

unimaculata PIC, 1953 (*Strotocera*)
(Beitr. Ent. 3, 320)

Holotypus, West-Afrika, Togogebiet, durch STAUDINGER & BANG-HAAS, im DEI.

unistriatus SCHENKLING, 1906 (*Opilo*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 260–261)

Holotypus, mehrere Paratypen, Pondicherry, im DEI.
DEI: Holotypus, 2 Paratypen, Pondicherry, durch STAUDINGER.

validus SCHENKLING, 1915 (*Tillus*)
(Ent. Mitt. 4, 109)

Holotypus, Südafrika, Rhodesia, Plumtree, im DEI.

varicollis SCHENKLING, 1906 (*Ichnea*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 310–311)

Holotypus, mehrere Paratypen, Brasilien, Jatahy, im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

ventralis SCHENKLING, 1908 (*Ommadius*)
(l.c., 485–486)

Mehrere Syntypen, Nord-Kanara, Basti, Bombay, 2500 ft., leg. BELL und leg. ANDREWES, im DEI.
DEI: 2 Syntypen, Nord-Kanara, Basti, Bombay, leg. ANDREWES.

vicinus SCHENKLING, 1899 (*Ommadius*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 341–342)

Mehrere Syntypen, Ins. Mentawai, Sipora, 1894, leg. MODIGLIANI, im Museum Genua.
DEI: 1 Syntypus, Mentawai, Sipora, Sereinu, V.–VI. 1894, leg. MODIGLIANI, Coll. SCHENKLING.

villosa SCHENKLING, 1908 (*Hydnocera*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 702)

Mehrere Syntypen, Mexiko, San Isidro, leg. HÖGE, im Britischen Museum und DEI.
DEI: 2 Syntypen, Mexiko, San Isidro, leg. HÖGE.

violaceipennis SCHENKLING, 1912 (*Allochotes*)
(Ent. Mitt. 1, 328)

Holotypus, Formosa, Kankau, IV. 1912, leg. SAUTER; im DEI [Koshun].

viridescens PIC, 1947 (*Prosymnus*)
(Divers. Ent. 1, 5)

Mehrere Syntypen, Tanganjika.

DEI: 1 Syntypus, D.O.A., Tanganjika, STAUDINGER & BANG-HAAS dedic.

viridicollis SCHENKLING, 1899 (*Chlorocnemis*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 140–141)

Mehrere Syntypen, Brit. Neu Guinea; Ighibirei, Kapakapa, 1890–91, leg. LORIA; Fly River, 1876–77, leg. D'ALBERTIS; im Museum Genua.

DEI: 1 Syntypus, N. Guinea, Ighibirei, VII.–VIII. 1890, leg. LORIA, Coll. SCHENKLING.

viridis SCHENKLING, 1915 (*Cyclotomocerus*)
(Ent. Mitt. 4, 317)

Syntypen: 2 Ex. Nord-Queensland, Kuranda, ex Coll. HACKER; 1 Ex. dto., via DODD an SCHENKLING; im DEI.
DEI: 2 Syntypen, Kuranda, VII. 1905, Coll. HACKER.

vitticeps KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 104)

Holotypus, N. Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].

vitticollis SCHENKLING, 1906 (*Epiphloeus*)
(L.c., 299)

Holotypus, mehrere Paratypen, Amazon, im DEI.
DEI: Holotypus, 3 Paratypen, Amazon, Coll. KRAATZ.

vitticollis KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)
(L.c., 103; nom. praeocc. = *conradti* LOHDE, 1899, Ent. Nachr. 25, 305)

Holotypus, Togo, leg. CONRADT; im DEI [Coll. KRAATZ].

vittipenne SCHENKLING, 1906 (*Peloniūm*)
(L.c., 316)

Holotypus, mehrere Paratypen; Argentinien, Tucuman; Paraguay, im DEI.

DEI: Holotypus, Argentinien, Tucuman, leg. DONCKIER, Coll. KRAATZ; 2 Ex. dto., 1 Ex. Paraguay, leg. KRAATZ, Coll. KRAATZ; 1 Ex. dto., leg. DRAKE, 188.: Paratypen.

vittipennis SCHENKLING, 1903 (*Tenerus*)
(Ann. Mus. Nat. Hung. 1, 396—397)

7 Syntypen, Neu-Guinea, Stephansort, Simbang, 1897—1900, leg. BIRÓ, im Museum Budapest.

DEI: 1 Ex. N. Guinea, Simbang, Huon Gulf., 1898, leg. BIRÓ, 1 Ex. (Fundort nicht lesbar!), durch WALLACE; Coll. SCHENKLING, Syntypen.

wagneri SCHENKLING, 1926 (*Opetio palpus*)
(Col. Centralbl. 1, 102)

Mehrere Syntypen, Hispania centr., Aragonien, Hochplateau bei Albarracin, 1200 m, leg. WAGNER.
DEI: 2 Syntypen, Hispania, Aragon., Umgeb. Albarracin, 1200 m, VI.—VII. 1925.

weyersii KRAATZ, 1899 (*Cladiscus*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 43, 213—214)

Holotypus, Südwest Sumatra, leg. WEYERS; im DEI.

wokanensis SCHENKLING, 1899 (*Ommadius*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 148)

Mehrere Syntypen, Ins. Aru, Wokan, 1873, leg. BECCARI, im Museum Genua.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. SCHENKLING.

yunnensis SCHENKLING, 1908 (*Allochotes*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 702—703)

Mehrere Syntypen, Yunnan, leg. DONCKIER, im DEI.

DEI: 3 Syntypen, Yunnan, leg. DONCKIER.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten

bakeri SCHENKLING (*Dasyceroclerus*)

DEI: 3 Typen, Los Banos, P. I., leg. BAKER.

bipartitus SCHENKLING (*Galeruclerus*)

DEI: 1 Typus, Brasilien, Mar de Hespanha, 14. XII. 1905.

curvifasciata LEA (*Allelidea*)

DEI: 1 Typus, W. Australia, Coll. HACKER.

italicus OBENBERGER (*Tillus*)

DEI: 1 Typus, Calabria, Aspromonte, leg. PAGANETTI, Coll. LEONHARD.

mundum SCHENKLING (*Pelonium*)

DEI: 1 Typus, Argentina, Pr. Santiago d. Estero, leg. BRUCH, 190.

plagiatus SCHENKLING (*Epiphloeus*)

DEI: 2 Typen, Brazil, Minas, Passa Quatro, Faz. dos Campos, 4. XII. 1915/2. I. 1918, leg. ZIKÁN.

zikanii SCHENKLING (*Galeruclerus*)

DEI: 3 Typen, Brasilien, Mines, Passa Quetro, 7. XII. 1920, leg. ZIKÁN.

virescens SCHENKLING (*Ommadius*)

DEI: 1 Type, Sumatra, Liangagas, leg. DOHRN, Coll. SCHENKLING.

Lymexylonidae

ater KRAATZ, 1895 (*Atractocerus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 163)

♂ Holotypus, Togo; im DEI [leg. CONRADT, Coll. KRAATZ].

Nach KRAATZ ist der Holotypus ein ♂, er wurde jedoch vom Spezialisten WHEELER bei seiner Revision als ♀ ausgezeichnet.

Syn. zu *brevicornis* LINNÉ, 1766.

procerus SCHENKLING, 1914 (*Atractocerus*)
(Ent. Mitt. 3, 319–320)

1 Ex. Brasilia, Corumba, Coll. RICHTER, im DEI; 1 Ex. Süd-Brasilien, Porto Alegre, im Museum Dresden; 1 Ex. Cayenne, Demerara, im Britischen Museum: Syntypen.
DEI: 1 ♀, Syntypus, Brazil, Corumba, Ato Paraguay, Coll. RICHTER.

Derodontidae

erichsoni ROSENHAUER, 1846 (*Laricobius*)
(*Broscosoma* und *Laricobius*, zwei neue Käfergatt. 7, Tab. f (II) A–L)

Mehrere Syntypen, Tyrol, Gschnitzer Thal bei Steinach, 30. VII.–6. VIII., 3200 ft.; Katharinenberg bei Wunsiedel im Fichtelgebirge, A. IX.; leg. ROSENHAUER.
DEI: 1 Syntypus, Tyrol, Coll. STIERLIN.

sahlibergi REITTER, 1883 (*Laricobius*)
(Rev. mens. Ent. 1, 42)

Mehrere Syntypen, Sibiria arctica, Fatjanowsk, leg. SAHLBERG.
DEI: 1 Syntypus, Sibir. arct., leg. SAHLBERG, Coll. STIERLIN.

Zusammenfassung

Vorliegender Katalog beinhaltet die Coleopteren-Typen (XX), die in den Sammlungen der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung, Bereich Eberswalde (ehemals Deutsches Entomologisches Institut), aufbewahrt werden.

Summary

The present catalogue contains the types of Coleoptera (XX) that are preserved in the collections of the Department of Taxonomy of Insects in the Eberswalde branch of the Institute of Plant Protection Research (former Deutsches Entomologisches Institut).

Резюме

Данный каталог содержит типы Coleoptera (XX), хранящиеся в коллекциях отдела таксономии насекомых при Научно-исследовательском институте защиты растений, Эберсвальдский филиал (бывший Немецкий энтомологический институт).