

Institut für Pflanzenschutzforschung
der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR zu Berlin
Bereich Eberswalde
Abteilung Taxonomie der Insekten
Eberswalde

HANNELORE GAEDIKE

Katalog der in den Sammlungen der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung, Bereich Eberswalde (ehemals Deutsches Entomologisches Institut), aufbewahrten Typen — XIX

(Coleoptera: Staphylinidae)

abbreviatus FENYES, 1914 (*Zyras*)

(Arch. Nat. 80 A 2, 52)

♀ ? Holotypus, Formosa, Taihorin, leg. SAUTER, det. Nr. 4353, im DEI.

abietum KIESENWETTER, 1858 (*Quedius*)

(Berl. Ent. Ztschr. 2, 57 – 58)

Syntypen, Griechenland, Parnes bei Athen, auf blühenden Apollotannen; Aetolische Alpen; leg. v. KIESENWETTER.
DEI: 1 Syntypus, Parnass.

absolutus RAMBOUSEK, 1916 (*Athela*)

(Col. Rundsch. 4 (1915), 129 – 130)

10 Syntypen, südöstliche Herzegovina, im großen Ponor der Trebinjčica bei Turkovici am Popovo polje.
DEI: 1 Syntypus, Herzegovina, Ponor bei Turkovici, Popovo polje, 23. 7. 1914, leg. ABSOLON.

acroleucus KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)

(Arch. Nat. 25, 91)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 3 Syntypen, Ceylon, leg. J. NIETNER; 1 Syntypus, Ostindien.

acuminatus KRAATZ, 1859 (*Placusa*)

(Arch. Nat. 25, 43)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 8 Syntypen, Ceylon, leg. J. NIETNER.

acuminatus KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)

(Arch. Nat. 25, 93 – 94)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. J. NIETNER.

acuminatus KRAATZ, 1859 (*Stenus*)

(Arch. Nat. 25, 165 – 166)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 2 Syntypen, Ceylon.

acuticollis KRAATZ, 1859 (*Homalota*)

(Arch. Nat. 25, 28 – 29)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

aemulus ROTTENBERG, 1870 (*Sunius*)

(Berl. Ent. Ztschr. 14, 33)

Syntypen, Palermo, 7. 12. 1868 – 20. 2. 1869; Rom, leg. ROTTENBERG; Corsica, leg. SCHWARZ; Neapel, leg. EMMERY.

DEI: 7 Syntypen, Palermo, leg. ROTTENBERG; 1 Syntypus, Rom, leg. ROTTENBERG.

aequinoctialis ERICHSON, 1839 – 40 (*Paederus*)

(Genera et Species Staphylinorum, 657)

Syntypen, Columbia, Cayenna.

DEI: 1 Syntypus, FAIRM.; 1 Syntypus, Cayenne.

aetolicum KRAATZ, 1858 (*Anthobium*)

(Berl. Ent. Ztschr. 2, 129)

Syntypen, ätolische Alpen, leg. v. KIESENWETTER.

DEI: 2 Syntypen, Aetol. Alp.

aetolicus KRAATZ, 1858 (*Quediiformes*)

(Berl. Ent. Ztschr. 2, 58)

1♂, 1♀ Syntypen, ätolische Alpen, leg. v. KIESENWETTER.

DEI: 1 Syntypus, Alp. aetol.

affinis FUSS, 1868 (*Homalota*)

(Berl. Ent. Ztschr. 12, 354)

Syntypen, Ahrweiler, im Dünger und bei faulenden Pflanzen, leg. FUSS.

DEI: 4 Syntypen, Ahrweiler.

affinis KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)

(Arch. Nat. 25, 142)

♂ Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.

affinis KRAATZ, 1859 (*Myrmecodia*)

(Arch. Nat. 25, 23)

Syntypen, Ceylon, in Termitennestern, leg. NIETNER.

DEI: 5 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

- affinis** CZWALINA, 1871 (*Oxytelus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 14 (1870), 420—421)
Ca. 15 Syntypen, Königsberg.
DEI: 2 Syntypen, Königsberg.
- africana** EICHELBAUM, 1913 (*Elephromniusa*)
(Arch. Nat. 79 A 3, 157—158)
6 Syntypen, Ost-Afrika, Amani, 7.—10. 1903, leg. EICHELBAUM.
DEI: 1 Syntypus, Amani, 11. 1903, leg. EICHELBAUM.
- africana** BERNHAUER, 1912 (*Delopeis*)
(Ent. Mitt. 1, 179)
Syntypen, SO-Kamerun, Loloendorf, 1895, leg. CONRADT, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
africana BERNHAUER, 1932 (*Leptusa*)
(Kol. Rundsch. 17 (1931), 237)
Syntypen, Oran, im DEI und Sammlung BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, Oran.
- africanum** ROUBAL, 1915 (*Anthobium*)
(Col. Rundsch. 4, 102)
[nom. nov. pro *A. tibiale* LUZE, Verh. zool. bot. Ges. Wien 60, 237—238; 1910]
Syntypen, Algier, Oran, im Mus. Wien und im DEI.
DEI: 1♂, 1♀ Syntypen, Oran.
- africanum** BERNHAUER, 1912 (*Philoruminum*)
(Ent. Mitt. 1, 178)
Syntypen, Usambara, im DEI und Sammlung BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, Usambara.
- africanum** EICHELBAUM, 1913 (*Megarthrus*)
(Arch. Nat. 79 A 3, 114—115)
5 Syntypen, Amani, am Fuße des Berges Bomole im Ostusambaragebirge, 11. 10. 1903, leg. EICHELBAUM.
DEI: 1 Syntypus, Amani, 10. 1903.
- agilis** BAUDI, 1869 (*Tachysa*)
(Berl. Ent. Ztschr. 13, 376)
- 12 Syntypen, Cypern.
DEI: 3 Syntypen, Cypern.
- abidicornis** BERNHAUER, 1913 (*Gyrophaena*)
(Denkschr. Akad. Wiss. Wien 89, 689)
Zahlreiche Syntypen, Samoa, Upolu, in einem Pilz, leg. RECHINGER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- albomarginatus** BERNHAUER, 1922 (*Bledius*)
(Arch. Nat. 88 A 7, 225)
Syntypen, Formosa, Alikang, Suisharyo, 10. 1911, 2. 1912, leg. SAUTER.
DEI: 3 Syntypen, Formosa, Alikang, 7. 8. 1910 (nicht 10. 1911), leg. SAUTER.
- alienigenus** PUTHZ, 1964 (*Stenus*)
(Ann. Ent. Fenn. 30, 229—231, Abb. 4)
♂ Holotypus, ♀ Paratypus, Israel, Saffurije, an einer Quelle wenige km unterhalb Nazareths am Wege nach Haifa, 25. 8. 1918, leg. LIEBMAN, Holotypus, im DEI, Paratypus, in Sammlung PUTHZ.
DEI: ♂ Holotypus, Israel, Saffurije, 25. 8. 1918, leg. LIEBMAN.
- alpestris** SCHEERPELTZ, 1935 (*Leptusa*)
(Kol. Rundsch. 21, 140—142)
Syntypen, östliches Gebiet des Zentralalpenbogens und östlicher Teil der nördlichen Kalkalpen bis zum Rhein, ohne nähere Fundortangaben.
DEI: 1 Syntypus, Turnau, Styr.bor.; 1 Syntypus, Eisenerzer Alp., Styr. sept., Südhang des Zeyritz Kampels, 1200 bis 1300 m, oberster Kurz-Teichgraben, subalp. Hochw., Moos und Rasen in Felsritzen, 4. 6. 1922, leg. KÄUFEL.
- apicalis** BRANCSIK, 1874 (*Leptusa*)
(Berl. Ent. Ztschr. 18, 227)
Zahlreiche Syntypen, Ungarn, Transsiner Comitat, Berge bei Sillein und im Vratna-Tal, leg. BRANCSIK.
DEI: 1 Syntypus, Carpathen, leg. BRANCSIK.
- alternans** SACHSE, 1852 (*Silusa*)
(Stett. Ent. Ztg. 13, 118—119)
♂ Syntypen, N.Amerika, Georgia, leg. A. GERHARDT.
DEI: 1 Syntypus, Georg., GERH.
- alutaceum** SCHUBERT, 1911 (*Cryptobium*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1911, 11—12)
Holotypus, Port.-Ost-Afrika, Beira, leg. A. BODONG, im DEI.
- aluticeps** BERNHAUER, 1927 (*Agerodes*)
(Mem. Soc. Ent. Ital. 5 (1926), 157—158)
Syntypen, Kolumbien, leg. v. BRUCK, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, Columb., Haag.
- amabilis** KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 97—98)
Holotypus, Nord-Indien, leg. BACON, im DEI.
- amanensis** EICHELBAUM, 1913 (*Dorylonia*)
(Arch. Nat. 79 A 3, 151—152)
22 Syntypen, Ostafrika, Amani, am Berg Bomole, 11. und 13. 10. 1903, leg. EICHELBAUM.
DEI: 1 Syntypus, Amani, 10. 03, leg. EICHELBAUM.
- amicissima** EICHELBAUM, 1913 (*Elephromniusa*)
(Arch. Nat. 79 A 3, 157)
14 Syntypen, Ostafrika, Amani, am Berg Bomole, 11. + 13. 10. 1903, leg. EICHELBAUM.
DEI: 2 Syntypen, Amani, 10. 1903, leg. EICHELBAUM.
- aneptius** CAMERON, 1925 (*Stenus*)
(Treubia 6, 178)
3 Syntypen, Java, Tjibodas, 1400 m, 8. 1921, leg. DAMMERMAN.
DEI: 1 Syntypus, Tjibodas, 1400 m, [23. 5. 1922], leg. DAMMERMAN.
- angulicollis** MÄKLIN, 1852 (*Megarthrus*)
(Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 25/II, 325)
Syntypen, Insel Sitkha, leg. FRANKENHAUSER und HOLMBERG.
DEI: 1 Syntypus, Sitkha.

angulipennis BERNHAUER, 1908 (*Stenus*)
(Arch. Nat. 74, 297–298)

Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.

DEI: 2 Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.

angustatus KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 92)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELPER.

DEI: 6 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; 1 Syntypus, Ostindien.

angustiformis BAUDI, 1869 (*Phloeopora*)
(Berl. Ent. Ztschr. 13, 379–380 nota)

Syntypen, Apennin, unter Rinde von Lärchen, leg. BAUDI.

DEI: 1 Syntypus, Apennin.

annulatus FAUVEL, 1895 (*Xantholinus*)
(Rev. d'Ent. 14, 241)

Syntypen, Birma, Bhamo, 8.; Carin Cheba, 500–1000 m, 7.; Tenasserim, mont Mooleyit, 1800–1900 m, 3.; alle leg. FEA.
Inde: Pulo Penang; Sumatra, Ajer, Mantecor, 8., leg. BECCARI; Tandjong Morawa Serdang. Sungai-Bulu, 9., Mus. Leiden.
Borneo, Sarawak, leg. WALLACE.

DEI: 1 Syntypus, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12. 1888, leg. FEA.

annuliventris KRAATZ, 1859 (*Leptusa*)
(Arch. Nat. 25, 12–13)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELPER.

DEI: 1 Syntypus, Ind.-post., leg. HELPER.

antennalis FENYES, 1914 (*Aleochara*)
(Arch. Nat. 80 A 2, 54–55)

♂? Holotypus, Formosa, Kankau (Koshun), leg. SAUTER, det. Nr. 4369, im DEI.

antennatus WENDELER, 1955 (*Holotrochus*)
(Dusenia 6, 195–196)

Syntypen, Brasilien, Espírito Santo, Sta. Theresa, 11. 1928, CONDE, in Sammlung WENDELER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

antilope FAUVEL, 1895 (*Leptochirus*)
(Rev. d'Ent. 14, 181)

Syntypen, Birma, Carin Ghécu, 1300–1400 m, 2., 3., 5.; Semmijion, 2.; leg. FEA.

DEI: 2 Syntypen, Carin Ghécu, 1300–1400 m, 2.–3. 1888, leg. FEA.

apertus BENICK, 1940 (*Stenus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 7, 330–332)

♂ Holotypus, Costa Rica, Hamburgfarm, Reventazon, Ebene Limon, 26. 1. 1935, in Sammlung BENICK; Paratypen, 2 ♀♀,
vom selben Fundort, 10. 4., 4. 6. 1926, leg. F. NEVERMANN; 1 ♀, La Caja, 8 km westlich San José, 1930, leg. H. SCHMIDT,
im DEI.

DEI: 1 Paratypus, La Caja, 8 km westlich San José, C. R., 1930, leg. SCHMIDT.

apfelbecki BERNHAUER, 1899 (*Medon*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 49, 25)

Syntypen, Bosnien, Umgebung von Sarajevo, leg. APFELBECK.

DEI: 1 Syntypus, Bosnien, leg. APFELBECK.

apicalis KRAATZ, 1857 (*Lathocaris*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 715–716)

Syntypen, Cassel, leg. RIEHL; Lyon, leg. REY.

DEI: 2 Syntypen, Cassel, leg. RIEHL; 1 Syntypus, Lyon, leg. REY.

apicalis KRAATZ, 1859 (*Myllaena*)

(Arch. Nat. 25, 51)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER.

apicipennis KRAATZ, 1859 (*Isomalus*)

siehe *kraatzii* FAUVEL, 1878

appendiculatus SAHLBERG, 1880 (*Thinobius*)

(Kongl. Svenska Vetensk. Akad. Handl., N. F. 17, nr. 4, 100; Taf. 1, Fig. 16a–b)

Syntypen, Umgebung Chantaika, 18. 7. und 19. 7., in Coll. FAUVEL, HAGLUND, KRAATZ, SAHLBERG, Mus. Holm und Mus. Helsingfors.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Kantaika, leg. SAHLBERG.

appulsa SCRIBA, 1867 (*Homalota*)

(Berl. Ent. Ztschr. 11, 389)

Syntypen, Jülich, leg. EICHHOFF.

DEI: 1 Syntypus, Jülich.

arabs SAULCY, 1864 (*Stilicus*)

(Ann. Soc. Ent. France IV. 4, 651–652)

Syntypen, Jerusalem, unter vertrockneten Pflanzenresten.

DEI: 1 Syntypus, Jerusalem.

arenarius BENICK, 1938 (*Stenus*)

(Mitt. Münch. Ent. Ges. 28, 272)

Syntypen, Costa Rica: Ramal, Parismina, Santa Clara, 6. 3. 23, 1♂; Hamburgfarm, Reventazon, Ebene Limon, 25. 2. 24,
1♀, 18. 1. 25, 1♂, 9. 2. 28, 1 Ex., 25. 3. 28, 1♀, 2. 38, 4♂, 3♀, alle auf Sandbank oder im Sand am Reventazon. Genaue
Beschreibung und Typenfestlegung (Mitt. Münch. Ent. Ges. 29, 35–36; 1939).

DEI: 1 Syntypus, Costa Rica, Hamburgfarm, Reventazon, Ebene Limon, auf Sandbank, 21. 2. 1933, leg. NEVERMANN.

arenicola THOMSON, 1868 (*Atheta*)

(Skandinavien Coleoptera 10, 321–322)

Syntypen, Schweden, Ystad.

DEI: 1 Syntypus, Suecia.

areolatus BENICK, 1929 (*Stenus*)

(Ent. Bl. 26, 94, 97–98)

2♂♂ Syntypen, Bergamaske Alpen, Mte. Arera, 20. 7. 1914, leg. KÜNNEMANN, 1 Ex., in Coll. LINKE.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

argus WENDELER, 1956 (*Heterothops*)

(Dusenia 7, 268)

Holotypus, Paratypen, Brasilien, Nova Teutonia, leg. PLAUMANN, in den Sammlungen FRANCKE und WENDELER.

DEI: 1 Paratypus, Brasilien, Nova Teutonia, leg. PLAUMANN.

armicollis BREIT, 1917 (*Sipalia*)

(Col. Rundsch. 6, 68—69)

Syntypen, Nord-Kroatien, Ivancica-Gebirge südlich von Waraschin, in Buchenwäldern, aus feuchtem Laub, leg. BREIT.
DEI: 2 Syntypen, Ivancica, Croatia bor.*asemus* KRAATZ, 1859 (*Staphylinus*)

(Arch. Nat. 25, 77—78)

Holotypus, Nord-Indien, leg. BACON, im DEI.

asiatica KRAATZ, 1859 (*Aleochara*)

(Arch. Nat. 25, 15—16)

Einige Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 12 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

asiatica BERNHAUER, 1909 (*Leptusa*)

(Soc. Ent. 23, 179—180)

Syntypen, Klein-Asien, Goek Daghi, leg. BODEMEYER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

asiaticus BERNHAUER, 1901 (*Geodromicus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1901, 249—250)

1♂, 1♀ Syntypen, Kleinasien, Bulghar Maaden, leg. von BODEMEYER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

aspericolle FAUVEL, 1895 (*Calliderma*)

(Rev. d'Ent. 14, 236)

Syntypen, Birma, Carin Asciuii Cheba, 1200—1300 m, 1.; Carin Asciuii Ghécu, 1400—1500 m, 3.—4.; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Asciuii Ghécu, 1400—1500 m, 3.—4. 88, leg. FEA.*atkinsoni* FAUVEL, 1895 (*Leptochirus*)

(Rev. d'Ent. 14, 182)

Syntypen, Birma, Carin Cheba, 900—1400 m, 8., 5. 12., leg. FEA; Tenasserim, Tavoy.

DEI: 2 Syntypen, Carin Cheba, 900—1100 m, 5. 12. 1888, leg. FEA.

atomaria KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 254—255)

Syntypen, mittleres und südliches Deutschland, ohne nähere Angaben.

DEI: 2 Syntypen, Crefeld.

atomarioides BRUNDIN, 1948 (*Atheta*)

(Ent. Tidskr. 69, 55)

♂ Holotypus, Bulgarien, Samakov, 1911, leg. HILF, im DEI.

atramentarius ROTTENBERG, 1870 (*Bledius*)

(Berl. Ent. Ztschr. 14, 35—36)

Zahlreiche Syntypen, Syracus, in Salzstümpfen am Hafen, 6.—21. 4. 1869, leg. ROTTENBERG; Südfrankreich.

DEI: 3 Syntypen, Syracus, leg. ROTTENBERG.

atratum BREIT, 1911 (*Coryphium*)

(Wien. Ent. Ztg. 30, 171—172)

Syntypen, Mte. Maggiore bei Abazzia, leg. BREIT.

DEI: 4 Syntypen, Mte. Maggiore, Istrien, leg. BREIT.

auripennis KRAATZ, 1859 (*Staphylinus*)

(Arch. Nat. 25, 72—73)

Holotypus, Nord-Indien, leg. BACON, im DEI.

auronotatus FAUVEL, 1895 (*Staphylinus*)

(Rev. d'Ent. 14, 256)

Syntypen, Birma, Carin Cheba, 900—1100 m, 5.—12., leg. FEA.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

austriaca SCHEERPELTZ, 1935 (*Leptusa*)

(Kol. Rundsch. 21, 139—140)

Syntypen, Niederösterreich, Hohe Wand, 9. 1920, leg. SCHEERPELTZ; weitere Syntypen von den meisten Alpenbergen Niederösterreichs.

DEI: 2 Syntypen, O. A., Hohe Wand A. i., Umgebung Waldegg Hütte, 26. 9. 1920, leg. SCHEERPELTZ.

azureus BENICK, 1929 (*Stenus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1929, 59—61, Fig. 6, 7)

104 Syntypen, Philippinen, Basilan.

DEI: 2 Syntypen, Philippinen, Basilan.

bagdadensis STIERLIN, 1867 (*Platyprosopus*)

(Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 2, 218—219)

Syntypen, Bagdad, leg. SCHLÄFLI.

DEI: 1 Syntypus, Bagdad; 1 Syntypus, Bagdad, 5. 1862; 1 Syntypus ohne Fundortangaben.

baicalensis BERNHAUER, 1927 (*Philonthus*)

(Ent. Mitt. 16, 123—124)

Syntypen, 1♂, Baikalgebiet, Turansk, im DEI; 1♀, Baikalgebiet, Kultuk, in Sammlung BERNHAUER.

DEI: 1 Syntypus, Turansk, Baikal-Geb., leg. FRANKLIN MÜLLER.

balcanica BERNHAUER, 1936 (*Atheta*)

(Kol. Rundsch. 22, 53)

Syntypen, Albanien, Tomor-Buranj, leg. REITTER.

DEI: 2 Syntypen, Albanien, Tumor-Buranj, leg. REITTER.

balcanica SCHEERPELTZ, 1937 (*Lesteva*)

(Mitt. Naturw. Inst. Sofie 10, 191—192)

♂ Holotypus, Massiv des Masalat, Schipka-Balkan, ca. 1900 m, in Sammlung SCHEERPELTZ, zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1♀ Paratypus, Dalmatien, Gravosa, leg. AFFELBECK.

balticus KRAATZ, 1859 (*Phytosus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 3, 52—53)

Syntypen, Swinemünde, leg. KRAATZ.

DEI: 4 Syntypen, Swinemünde.

banghaasi BENICK, 1929 (*Stenus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1929, 88—89)

Syntypen, Philippinen; 6♂♂, 6♀♀, Mt. Polis, Luzon; 32♂♂, 25♀♀, Luzon, Balbalan.

DEI: 1 Syntypus, Balbalan, Luzon.

basalis MÄKLIN, 1852 (*Proteinus*)

(Bull. Soc. Imp. Nat. Moskau 25/II, 324)

Syntypen, Insel Sithka, leg. FRANKENHAUSER & HOLMBERG.

DEI: 1 Syntypus, Sithka.

basicornis FAUVEL, 1895 (*Staphylinus*)

(Rev. d'Ent. 14, 255–256)

Syntypen; Birma, Teinzo, 5.; Carin Cheba, 400–1100 m, 4., 5., 12.; Carin Ghéou, 1300–1400 m, 2., 3.; leg. FEA. Inde, Sylhet.

DEI: 1 Syntypus, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12. 1888, leg. FEA.

basicornis KRAATZ, 1859 (*Stenus*)

(Arch. Nat. 25, 163–164)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

basilewskyi FAGEL, 1954 (*Paederus*)

(Volume Jubilaire VICTOR VAN STRAELEN Inst. Royal Sc. Nat. Belg., Bruxelles, Band 2, 922–923)

♂ Holotypus, Congo Belge, Kivu, Gebiet Kabare, an der Mündung des Lwino, 1700 m, 11. 1951, leg. LELEUP, im Mus. Tervueren; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 ♀ Paratypus, vom Fundort des Holotypus.

beesoni CAMERON, 1924 (*Lispinus*)

(Trans. Ent. Soc. London 1924, 161)

Syntypen, Indien, Dehra Dun; Siwaliks.

DEI: 1 Syntypus, Nakranda, Siwaliks, 8. 10. 1922, leg. CAMERON.

beesoni CAMERON, 1930 (*Stenus*)

(Fn. Brit. India Col. Staph. I, 346–347)

Syntypen, Chakrata district: Sainj, Manjaon und Khedar Khuds; Bangar. Mussoorie district, Assam; Naga Hills, 5000 bis 7500 Fuß.

DEI: 1 Syntypus, Arni Gad., Mussoorie, 16. 10. 1921, leg. CAMERON.

bella MÄRKEL, 1844 (*Bolitochara*)

(In: GERMAR, Ztschr. f. Ent. 5, 209–210)

Syntypen, 1 ♂, leg. MÄRKEL; 1 ♀, leg. GRESSNER.

DEI: 1 Syntypus, Saxon, MÄRKEL.

bellicosus FAUVEL, 1895 (*Ozytelus*)

(Rev. d'Ent. 14, 202–203)

Syntypen, Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12., leg. FEA.

DEI: 5 Paralectotypen, mit den Angaben der Beschreibung, durch HAMMOND festgelegt.

bellus KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)

(Arch. Nat. 25, 83–84)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELPER.

DEI: 3 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; 1 Syntypus, Ostindien.

benickellius PUTZH, 1967 (*Stenus*)

(Ann. Ent. Fennici 33, 234–236)

♂ Holotypus, Rumänien, Sinaia, leg. v. BODEMEYER, im SMF; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 ♂ Paratypus, Schuler-Gog. DEUBEL.

benigseni BERNHAUER, 1927 (*Leucitus*)

(Nova Guinea Zool. 15, 3, 293–294)

Syntypen, Neu Guinea, Kani Gebirge, leg. v. BENNIGSEN, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.

DEI: 1 Syntypus, D. N. Guinea, Limbang, leg. v. BENNIGSEN.

bernhaueri POPPIUS, 1909 (*Bledius*)

(Acta Soc. Fn. Flora Fenn. 31 (8), 17)

Zahlreiche Syntypen, Nordküste der Halbinsel Kanin, Ufer des Krinka, 16. 7.; Kambalnitz, 18. 7.; leg. POPPIUS.

DEI: 2 Syntypen, Kanin, leg. POPPIUS.

bernhaueri SCHERPETZL, 1926 (*Leptusa*)

(Kol. Rundsch. 12, 5–7)

♂ Holotypus, 10 ♂, 15 ♀ Paratypen, Kärnten, Karawanken, Gipfelregion des Obir, ca. 2120 m, 17. 7. 1923, leg. SCHEERPETZL und WINKLER, in Sammlung SCHEERPETZL; Paratypen, vom selben Fundort, 5.–7. 8. 1924, leg. BERNHAUER.

DEI: 3 Paratypen, Eisenkappel, Kärnten, Obir, Gipfelreg., 2150 m, 23. 7. 1923, leg. SCHEERPETZL.

bernhaueri CAMERON, 1925 (*Stenus*)

(Tribula 6, 177–178)

♂ Holotypus, Malabar bei Bandung, 1600 m, 26. 12. 1920, leg. DAMMERMAN; Paratypen, Java, Tjibodas. Die Typenserie besteht aus 4 Ex., aus der Beschreibung ist nicht ersichtlich, wieviel Exemplare von den beiden Fundorten vorlagen.

DEI: 1 Paratypus, Malabar, 1600 m, 26. 12. 1920.

bernhaueri RAMBOUSEK, 1916 (*Tenebriobius*)

(Col. Rundsch. 4 (1915), 130–132)

Syntypen, Mazedonien, Peristeri-Gebirge bei Monastir, 1800–2000 m, 8. 1914, leg. RAMBOUSEK.

DEI: 1 Syntypus, Maced. Peristeri alpin, 7. 14, leg. RAMBOUSEK.

bicolor REICHENSPERGER, 1938 (*Eciophya*)

(Rev. d' Ent. 3, 184 – 186)

Zahlreiche Syntypen, Umbria, Putumayo, Peru, 1930, leg. KLUG; Hamburg Farm, San José, Costa Rica, 7. 10. 1932, 28. 1. 1933; Salvador Farm, Parismina-Fluß, 4. 10. 1931, leg. NEVERMANN.

DEI: 1 Syntypus, Costa Rica, Salvador Farm, Parismina Flub, 23.–30. 10. 1930, leg. NEVERMANN; 1 Syntypus, Costa Rica, Hamburg Farm, leg. NEVERMANN.

bicolor SCHUBERT, 1911 (*Ericsonius*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1911, 33)

Syntypen, Brit. Uganda, leg. GRAUER, in Sammlung v. BENNIGSEN.

DEI: 1 Syntypus, Brit. Uganda, GRAUER.

bicolor CAMERON, 1931 (*Medome*)

(Fauna Brit. Ind. Col. Staph. 2, 189–190, Fig. 70)

Syntypen, Mussoorie district, Arni Gad.; Chakrata district, Mohna, 5000–6500 Fuß.

DEI: 2 Syntypen, Mussoorie, Arni Gad., 17. 4. und 12. 6., leg. CAMERON.

bicolor WENDELER, 1942 (*Paederus*)

(Arb. morph. tax. Ent. 9, 103)

♀ Holotypus, Cuman, Venezuela, im DEI.

bicolor FENYES, 1914 (*Schistogenia*)

(Arch. Nat. 80 A 2, 47–48)

Holotypus, Formosa, Anping, leg. SAUTER, det. Nr. 4381, im DEI; 6 Paratypen, vom selben Fundort.

DEI: 3 Paratypen, Anping, Formosa, 6. 1911, leg. SAUTER.

bicornis PUTHZ, 1972 (*Stenus*)

(Wiss. Mitt. Bosn.-herz. Landesmus. 2, Nat., 170—172)

♂ Holotypus, ♀ Paratypus, Macedonia, Djevdzeljia, 21. 5. 1937, leg. LIEBMAN, im DEI; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung, im Mus. Genf, in coll. COIFFAIT, FAGEL und PUTHZ.

DEI: ♂ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung; 1 ♂ Paratypus, Macedonia, Strumica, 19. 5. 1937, leg. LIEBMAN.

bicuspidis KRAATZ, 1859 (*Scopaeus*)

(Arch. Nat. 25, 129)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 3 Syntypen, India orient.

biforme FAUVEL, 1895 (*Cryptobium*)

(Rev. d'Ent. 14, 237)

Syntypen, Birmania, Rangoon, 5.; Bhamo, 7.; Probe, 12.; Carin Cheba, 900—1100 m, 12.; Carin Asciuii Ghécu, 1400—1500 m, 3.—4.; Pegu, Palon, 8.—9.; Tenasserim, Kawkareet, 2.; leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Carin Ghecu, 1300—1400 m, 2.—3. 1888, leg. FEA; 1 Syntypus, Bhamo, Birmania, 7. 1886, leg. FEA.

bifoveolata KRAATZ, 1859 (*Linoglossa*)

(Arch. Nat. 25, 11—12)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 1 Syntypus, Ind. post., leg. HELFER.

bifoveolata BRISOUT DE BARNEVILLE, 1860 (*Lomechusa*)

(Ann. Soc. Ent. France III. 8, 345—346)

Syntypen, Frankreich, Umgebung Collioure, zusammen mit kleinen Ameisen, DELAROUZZÉE.

DEI: 1 Syntypus, Collioure.

bitineatus FAUVEL, 1895 (*Platyprosopus*)

(Rev. d'Ent. 14, 239—240)

Syntypen, Birma, Bhamo, 8., leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamo, 8. 1886, leg. FEA.

bimaculatus KRAATZ, 1859 (*Boletobius*)

(Arch. Nat. 25, 63—64)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 5 Syntypen, Ceylon.

binotata KRAATZ, 1856 (*Aleochara*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 106—107)

Syntypen, im nördlichen Deutschland.

DEI: 2 Syntypen, Berlin; 1 Syntypus, Danzig.

bipunctatus FAUVEL, 1895 (*Leptochirus*)

(Rev. d'Ent. 14, 180—181)

Syntypen, Birma, Carin Cheba, 900—1100 m, 5.; Carin Ghécu, 1300—1400 m, 2., 3.; Tenasserim, mont Moolyit, 1800 bis 1900 m, 3.; Plapoo, 4.; alle leg. FEA. Siam, monts de La Khone, leg. HARMAND.

DEI: 2 Syntypen, Carin Ghecu, 1300—1400 m, 5. 1888, leg. FEA.

birmanus FAUVEL, 1895 (*Astenus*)

(Rev. d'Ent. 14, 222)

Syntypen, Birma, Carin Asciuii Ghécu, 1400—1500 m, 3.—4., leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

birmanus FAUVEL, 1895 (*Leistostrophus*)

(Rev. d'Ent. 14, 246—247)

Syntypen, Birma, Carin Cheba, 900—1100 m, 5.—12.; Carin Asciuii Ghécu, 1400—1500 m, 3.—4.; leg. FEA.

DEI: 4 Syntypen, Carin Asciuii Ghécu, 1400—1500 m, 3.—4. 1888, leg. FEA.

birmanus FAUVEL, 1895 (*Lispinus*)

(Rev. d'Ent. 14, 184)

Syntypen, Birma, Carin Cheba, 1200—1300 m, 1.; Carin Asciuii Ghécu, 1400—1500 m, 3.—4.; Tenasserim, mont Moolyit, 1800—1900 m, 3.; alle leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Carin Asciuii Ghecu, 1400—1500 m, 3.—4. 1888, leg. FEA.

birmanus FAUVEL, 1895 (*Paederus*)

(Rev. d'Ent. 14, 233)

Syntypen, Birma, Carin Cheba, 900—1100 m, 5.—12.; Carin Asciuii Cheba, 800—1400 m, 12.; leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Birma, 1888, leg. FEA.

birmanus FAUVEL, 1895 (*Medon*)

(Rev. d'Ent. 14, 228—229)

Syntypen; Birma, Carin Cheba, 500—1000 m, 12.; Carin Ghécu, 1300—1400 m, 2.—3.; Carin Asciuii Ghécu, 1400—1500 m, 3.—4.; alle leg. FEA. Sikkim.

DEI: 1 Syntypus, Carin Asciuii Ghecu, 1400—1500 m, 3.—4. 1888, leg. FEA.

bisinatus CAMERON, 1924 (*Priocnirus*)

(Nova Guinea Zool. 15, 1, 81—82)

8 Syntypen, Neu Guinea, Mamberano Riv.

DEI: 2 Syntypen, N. Guinea, Mamberano Riv., Pionierbivak, 1920, leg. W. C. v. HEURN.

bistrigatus FAUVEL, 1895 (*Lispinodes*)

(Rev. d'Ent. 14, 185)

Syntypen; Birma, Bhamo, 8., leg. FEA. Annam, Hué, leg. DE BEAUCHÈNE; Sikkim, Darjeeling, leg. CHRISTIE.

DEI: 1 Syntypus, Birma, Bhamo, 8. 1885, leg. FEA.

bodemeyeri BERNHAUER, 1914 (*Aleochara*)

(Münch. Kol. Ztschr. 4, 43)

2 Syntypen, Kleinasiens, Goek Dagh, leg. v. BODEMEYER, 1 Ex., in Sammlung BERNHAUER.

DEI: 1 Syntypus, Asia-Minor, Goek-Dagh, leg. v. BODEMEYER.

bodemeyeri BERNHAUER, 1903 (*Lathrobium*)

(Verh. zool. bot. Ges. Wien 53, 593)

2 Syntypen, Kleinasiens, Gock-Dagh bei Hassa-Pasche-Kay unweit Salandja, 9.—12. 4. 1903, leg. v. BODEMEYER.

DEI: 1 Syntypus, Asia-Minor, Goek-Dagh, leg. v. BODEMEYER.

bodemeyeri BERNHAUER, 1914 (*Medon*)

(Münch. Kol. Ztschr. 4, 266)

Syntypen, Tunis, Ain Draham, leg. v. BODEMEYER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

bodemeyeri EPPELSHEIM, 1881 (*Philonthus*)

(Stett. Ent. Ztg. 42, 376)

Syntypen, Süd-Ungarn, dicht bei Herkulesbad, bei Mehadia, unter Steinen am Ufer der Czerna.

DEI: 1 Syntypus, Mehadia.

bodemeyeri BERNHAUER, 1902 (*Trogophloeus*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 52, 701)

Syntypen, Kleinasiens, Gock-Dagh, leg. v. BODEMEYER.

DEI: 1 Syntypus, Asia minor, Gock Dagh, leg. v. BODEMEYER.
boettcheri WENDELER, 1924 (*Priochirus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1924, 340)

♂♀ Syntypen, Philippinen, Nord-Palawan, Binaluan, 11. 1913, leg. BOETTCHER, in Sammlung WENDELER.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

brachycera KRAATZ, 1859 (*Acanthoglossa*)
(Arch. Nat. 25, 145)

Syntypen, ohne Fundortangaben.
DEI: 2 Syntypen, Ceylon.

brachycerus KRAATZ, 1859 (*Leptochirus*)
(Arch. Nat. 25, 191)

Mehrere Syntypen, Ceylon.

DEI: 4 Syntypen, Ceylon.

brachypterus KRAATZ, 1856 (*Oxypoda*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 188)

Syntypen, Österreich.

DEI: 1 Syntypus, Österreich.

brachypterus KRAATZ, 1859 (*Pinophilus*)
(Arch. Nat. 25, 161–162)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

brachypterus KRAATZ, 1859 (*Staphylinus*)
(Arch. Nat. 25, 76)

Holotypus, Indien boreali, leg. BACON, im DEI.

brachypterus KRAATZ, 1859 (*Stenus*)
(Arch. Nat. 25, 164)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

breviceps REICHENSPERGER, 1933 (*Ecitonomorpha*)
(Rev. d'Ent. 3, 182)

Syntypen, Costa Rica, Hamburg-Farm, San José, 3. 4. 1931, leg. NEVERMANN.

DEI: 1 Syntypus, Costa Rica, Hamburg-Farm, Reventazon, Ebene Limon, 7. 4. 1930.

brevicolle THOMSON, 1884 (*Omalium*)
(Opusc. Ent. Lund 10, 1033)

Syntypen, Lappland.

DEI: 1 Syntypus, Enontekis; 1 Syntypus, Muonio, leg. SAHLBERG.

brevicollis KRAATZ, 1856 (*Bolitochara*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 40–41)

Syntypen, Grafschaft Glatz, leg. ZEEBE; Grafschaft Glatz, am Fuße der Heuscheuer unweit Abendorf, leg. KRAATZ.

DEI: 4 Syntypen, Silesia.

brevicornis KRAATZ, 1859 (*Lispinus*)
(Arch. Nat. 25, 187)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 1 Syntypus, India.

brevicornis KRAATZ, 1856 (*Ocalea*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 51)

Syntypen, Österreich.

DEI: 2 Syntypen, Österreich.

brevicornis CAMERON, 1927 (*Sternotropa*)
(Rec. South Austr. Mus. 3, 265–266)

Viti Levu, Holotypus Nr. 16434, Paratypen; Paratypen, Taveuni, Ovalau.

DEI: 2 Paratypen, Viti Levu, Fiji, leg. LEA.

brevilingue SCHIÖDTE, 1844–45 (*Micralymma*)
(Naturhist. Tidskrift Krøyer [2] 1, (4), 377–379; Taf. 4, Fig. 2)

Syntypen, Grönland, Kikertarsoetisika.

DEI: 1 Syntypus, Grönland, leg. SCHIÖDTE.

brevipennis KRAATZ, 1857 (*Othius*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 657)

Holotypus, Österreich, leg. Graf v. FERRARI, im DEI.

brevis KRAATZ, 1859 (*Pinophilus*)
(Arch. Nat. 25, 159–160)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

brevitarsis BENICK, 1916 (*Stenus*)
(Ent. Mitt. 5, 245–246)

Holotypus, N. O.-Sumatra, Tebing-tinggi, leg. SCHULTHEISS, im DEI.

brevitarsula KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)
(Arch. Nat. 25, 137–138)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 3 Syntypen, Ceylon.

brunneipennis KRAATZ, 1856 (*Aleochara*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 100–101)

Syntypen, ganz Deutschland, hauptsächlich an feuchten Localitäten.

DEI: 5 Syntypen, Germ.

brunneiventris KRAATZ, 1859 (*Aleochara*)
(Arch. Nat. 25, 14–15)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 1 Syntypus, Ind. post., leg. HELFER.

brunnescens SAHLBERG, 1870 (*Arpedium*)
(Not. Fauna Flora Fennica 11, 423)

Mehrere Syntypen, Karelien, Muonioniska, 5.–6., leg. PALMÉN und SAHLBERG.

DEI: 1 Syntypus, Muonio, leg. SAHLBERG.

bucharicus BERNHAUER, 1901 (*Medon*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1901, 244)

Syntypen, Centralasien, Buchara.

DEI: 1 Syntypus, Ost-Buchara, Tschitschantan, 1898, leg. HAUSER.

cabrali PUTHZ, 1968 (*Stenus*)

(Ark. Zool. 20, 446—448, Fig. 3—5)

♂ Holotypus, 9♂♂, 8♀♀ Paratypen, Brasilien, Sta. Catharina, Nova Teutonia, 1., 9. und 12. 1938, 2. 1939, leg. PLAUMANN;
 ♀ Paratypus, Ibidem, 27° 11' B., 52° 23' L, leg. PLAUMANN. Holotypus, Paratypen, im Mus. Stockholm. Paratypen, in Coll. BENICK, KORGE, PUTHZ und im British Mus.
 DEI: 1 ♀ Paratypus, Sta. Catharina, Nova Teutonia, Brasil., 1. 1938, leg. PLAUMANN.

caelata ROTTENBERG, 1870 (*Quediushispanus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 14, 28—29)

Holotypus, Sizilien, Niclosi, 9.—13. 5. 1869, leg. ROTTENBERG, im DEI.

calabricus REITTER, 1907 (*Micropeplus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1907, 484—485)

Zahlreiche Syntypen, Calabrien, Santa Eufemia d'Aspromonte, 1905, leg. PAGANETTI-HUMMLER.

DEI: 3 Paratypotyphen, Calabria, Aspromonte, PAGANETTI, von P. NOHEL (im Druck) festgelegt.

californicus HUBBARD, 1894 (*Brathinus*)

(Proc. Ent. Soc. Washington 3, 11—12)

Zahlreiche Syntypen, Californien, Lake Tahoe; 2 Syntypen, Californien, Lisson.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung (als Paratypen nr. 4575 USNM ausgezeichnet).

caligicola PUTHZ, 1970 (*Stenus*)

(Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Giacomo Doria 78 (1970—71), 55—57)

♂ Holotypus, Calabria, Monte Cocuzzo, 9. 6. 1899, leg. A. FIORI, in Sammlung PUTHZ; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 3 Paratypen, Calabria, Aspromonte, leg. PAGANETTI; 1 Paratypus, Calabria, Sta. Eufemia d'Aspromonte, 1905, leg. PAGANETTI.

callifer BENICK, 1938 (*Stenus*)

(Mitt. Münch. Ent. Ges. 28, 271)

♀ Holotypus, Costa Rica, La Caja, 8 km westlich von San José, leg. H. SCHMIDT. Genaue Beschreibung und genaue Be-
schreibung des Typenfundortes in Mitt. Münch. Ent. Ges. 29, 29—31; 1939.

DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

camura ERICHSON, 1840 (*Myrmecodona*)

(Genera et Species Staphylinorum, 44)

Syntypen, Columbien, Puerto Cabello, in Sammlung MORITZ.

DEI: 1 Syntypus, MORITZ.

capillaris FAUVEL, 1805 (*Paederus*)

(Rev. d'Ent. 14, 231—232)

Syntypen, Birma, Carin Ascuiii Ghécu, 1400—1500 m, 3.—4., leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

capitata BRUNDIN, 1948 (*Atheta*)

(Ent. Tidskr. 69, 55—56)

♂ Holotypus, Holstein, bei Eutin, im DEI.

capitata SCHUBERT, 1911 (*Eleusis*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1911, 2—3)

2 Syntypen, Brit.-Uganda, leg. GRAUER.

DEI: 1 Syntypus, Brit. Uganda, leg. GRAUER.

capitatus EPPELSHHEIM, 1878 (*Stenus*)

(Stett. Ent. Ztg. 39, 421)

Syntypen, Oran, leg. LEDER.

DEI: 1 Syntypus, Oran.

carinicollis KRAATZ, 1859 (*Thinocharis*)

(Arch. Nat. 25, 143)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

carinthiaca SCHEERPELTZ, 1948 (*Leptusa*)

(Carinthia II 57, 159—164, Abb. 3)

Holotypus, Paratypen, Kärnten, in einer Doline im südwestlichen Teil des isolierten Kalkzuges Launsdorf-Brückl-Eber-
stein, leg. HÖLZEL, in Sammlung SCHEERPELTZ.

DEI: 1 Paratypus, Carinthia, Launsdorf, 25. 9. 1946, leg. HÖLZEL.

carpathica WEISE, 1877 (*Leptusa*)

(Verh. Nat. Ver. Brünn 15 (1876), 10)

Zahlreiche Syntypen, Karpaten, am Hoverla, aus Buchenlaub, 1875, leg. WEISE; einige Syntypen, Kerzer Gebirge, 1876,
leg. REITTER.

DEI: 1 Syntypus, Hoverla.

caspia REITTER, 1885 (*Micropeplus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 29, 366)

Syntypen, Lenkoran.

DEI: ♂ Lectotypus, Lenkoran, LEDER, REITTER, von NOHEL (im Druck) festgelegt.

castaneipennis KRAATZ, 1859 (*Coproporus*)

(Arch. Nat. 25, 60—61)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 2 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

castaneipennis KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)

(Arch. Nat. 25, 96—97)

Syntypen; Ost-indien, leg. HELPER; Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 6 Syntypen, Ostindien; 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER.

castaneipennis CAMERON, 1925 (*Thyreoccephalus*)

(Treubia 6, 185—186)

7 Syntypen, Merauke, S. N. Guinea.

DEI: 3 Syntypen, Holländ. Indien, Merauke.

castanoptera KRAATZ, 1856 (*Euryusa*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 76)

Syntypen; 1 Ex. bei Berlin, am Fuße einer Eiche, leg. KRAATZ; 1 Ex. Österreich, leg. WAGENMAN, beide im DEI.

castanoptera KRAATZ, 1857 (*Lithocharus*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 716—717)

Holotypus, Baiern, leg. WALTL, im DEI.

cavifrons BIERIG, 1933 (*Neobisnius*)

(Rev. de Ent. Rio de Janeiro 3, 51—54)

Holotypus, Paratypen, Puerto Armuelles, 6. 1930, leg. BIERIG, in Sammlung BIERIG; 3 Paratypen, Costa Rica, La Caja, 1931, leg. SCHMIDT, im DEI.

DEI: 1 Ex., C. R., Vara Blanca, zwischen Barba und Poas, 2000 m, leg. SCHMIDT, bei uns als Allotypus ausgezeichnet, dieser Fundort stimmt aber nicht mit dem in der Beschreibung genannten überein.

ceylanense KRAATZ, 1859 (*Conosoma*)

(Arch. Nat. 25, 62)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 2 Syntypen, Ceylon.

ceylanense KRAATZ, 1859 (*Cryptobium*)

(Arch. Nat. 25, 119)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

ceylanensis KRAATZ, 1859 (*Holisomorphus*)

(Arch. Nat. 25, 101—102)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 3 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

ceylanensis KRAATZ, 1859 (*Palaminus*)

(Arch. Nat. 25, 153)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 1 Syntypus, Ceylon.

ceylanensis KRAATZ, 1859 (*Phloeopora*)

(Arch. Nat. 25, 41—42)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

ceylanensis KRAATZ, 1859 (*Stilicus*)

(Arch. Nat. 25, 126)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 10 Syntypen, Ceylon.

ceylonica KRAATZ, 1857 (*Stenus*)

(Linnaea 11, 8—9)

Zahlreiche Syntypen, Ceylon, bei Colombo, unter faulenden Früchten, leg. NIETNER.

DEI: 7 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

chilensis KRAATZ, 1859 (*Oxypoda*)

(Berl. Ent. Ztschr. 3, 15)

Syntypen, Chile.

DEI: 1 Syntypus, Chile, leg. DEYROLLE.

chilensis BERNHAUER, 1939 (*Philonthus*)

(Arb. morph. tax. Ent. 6, 13—14)

Syntypen, Isla Calbuco, Süd-Chile, 6. 2. 1937, leg. SCHWABE, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.

DEI: 1 Syntypus, Isla Calbuco, Süd-Chile, 3. 10. 1937, leg. SCHWABE.

chinense BERNHAUER, 1927 (*Achenium*)

(Kol. Rundsch. 13, 94—95)

Syntypen, China, Tientsin, im DEI und Sammlung BERNHAUER.

DEI: 1 Syntypus, China, Tientsin.

chinense BERNHAUER, 1928 (*Bledius*)

(Kol. Rundsch. 14, 8—9)

Syntypen, Schantung, Jentschoufu, 22. 11. 1911—1912, leg. KREYENBERG, im DEI und Sammlung BERNHAUER.

DEI: 11 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

chobauti FAUVEL, 1902 (*Megarthrus*)

(Rev. d'Ent. 21, 179)

Syntypen, Kabylie, Gipfel des Djebel, Bou-Berak bei Dellys, unter abgestorbenen Blättern, 5., leg. CHOBAUT; Wald von Yakouren, leg. PUEL; Bougie, leg. CHOBAUT.

DEI: 5 Syntypen, Bou-Berak, Kabylie, leg. PUEL.

chrysopyga KRAATZ, 1859 (*Oligota*)

(Arch. Nat. 25, 45)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 2 Syntypen, Ceylon.

ciliifrons HELLER, 1898 (*Priocnemis*)

(Abh. u. Ber. Mus. Dresden 7 (1898/99), 16)

Syntypen, Celebes meridionalis, Bonthain und Maros, leg. SARASIN und FRUHSTORFER, im Mus. Dresden Nr. 11356 und 11084 und Mus. Tring.

DEI: 1 Syntypus, S. Celebes, Bua-Kraeng, 5000', 2. 1896, Nr. 11084, leg. FRUHSTORFER.

cinicoides FAUVEL, 1895 (*Oxytelopeis*)

(Rev. d'Ent. 14, 200—201)

Syntypen, Birma, Carin Asciuii Ghécu, 1400—1500 m, 3.—4., leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

cincticollis KRAATZ, 1857 (*Quedius*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 508)

Syntypen, bei Wien, leg. Graf v. FERRARI und MILLER.

DEI: 2 Syntypen, Austria, leg. MILLER.

cingulata KRAATZ, 1858 (*Chilocorus*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 148)

Syntypen, Baiern, leg. WALTL.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Baiern, leg. WALTL, von SCHILOW festgelegt.

cinnamomea KRAATZ, 1859 (*Dinopsis*)

(Arch. Nat. 25, 51)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: Lectotypus, 4 Paralectotypen, Ceylon, leg. NIETNER, von KLIMASZEWSKI (Canad. Ent., im Druck) festgelegt.

cinnamomeum KRAATZ, 1857 (*Omalium*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 1000—1001 nota)

Syntypen, Dalmatien, leg. KAHR.

DEI: 5 Syntypen, Dalmatien, leg. KAHR.

cinnamoptera KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)

(Arch. Nat. 25, 141)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 3 Syntypen, India orient.

circumductus FAUVEL, 1895 (*Philonthus*)

(Rev. d'Ent. 14, 263)

Syntypen; Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12., leg. FEA. Philippines, Antipolo, leg. SIMON.

DEI: 1 Syntypus, Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5., 12. 88, leg. FEA.

circumflexus FAUVEL, 1895 (*Stenus*)

(Rev. d'Ent. 14, 211)

Syntypen, Birma, Carin Ghécu, 1300–1400 m, 2., 3.; Carin Asciuii Ghécu, 1400–1500 m, 3.–4.; leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Carin Ghecu, 1300–1400 m, 2.–3. 1888, leg. FEA; 1 Syntypus, Carin Asciuii Ghecu, 1400–1500 m, 3.–4. 1888, leg. FEA.

claritarsis PUTHZ, 1971 (*Stenus*)

(Ent. Bl. 67, 100–102, Fig. 14–17)

♂ Holotypus, Lenkoran, leg. LEDER, in Sammlung PUTHZ; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 ♂ Paratypus, Caucasus, Meskigeln Gl., leg. LEDER, REITTER; 1 ♀ Paratypus, Talysch, coll. GEAVE.

clavatus ROTTENBERG, 1870 (*Callicerus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 14, 27)

Syntypen; 1 Ex. Syracuse, 6.–21. 4. 1868; 1 Ex. Catania, 26. 2.–5. 4. 1868, leg. ROTTENBERG.

DEI: 1 Syntypus, Syrac.; 1 Syntypus, Catan.

clavicornis CAMERON, 1925 (*Gyrophaena*)

(Treubie 6, 189)

Zahlreiche Syntypen, Wai Lima, Sumatra, 11. und 12. 1921, leg. KARNY.

DEI: 16 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1 Ex. als Typus ausgezeichnet.

clavicornis KRAATZ, 1859 (*Myrmedonia*)

(Arch. Nat. 25, 24–25)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

coarcicollis KRAATZ, 1859 (*Lispinus*)

(Arch. Nat. 25, 186)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 6 Syntypen, Indien.

collare SCHEERPELTZ, 1962 (*Scimbalium*)

(Beitr. Ent. 12, 530–582)

♀ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Ägypt. Sudan, Bahr el Ghazah, 4. 3. 1913; Holotypus, im DEI, Paratypus in Sammlung SCHEERPELTZ.

DEI: ♀ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

comes FAUVEL, 1895 (*Stenus*)

(Rev. d'Ent. 14, 207)

Syntypen, Tenasserim, Thagata, 4., leg. FEA.

DEI: ♂ Paralectotypus, Tenasserim, Thagata, 4. 1887, leg. FEA, von PUTHZ (Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg. 45 (9), 5; 1969) festgelegt. Der Paralectotypus trägt das Originaletikett FAUVELS „*collum* FVL“. Nach PUTHZ handelt es sich hierbei um einen Irrtum FAUVELS. Das oben genannte Exemplar gehört zur Typenserie von *comes* FVL.*concolor* KRAATZ, 1859 (*Sunus*)

(Arch. Nat. 25, 149)

Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.

condei WENDELER, 1933 (*Paederus*)

(Mitt. Dtsch. Ent. Ges. 4, 57–58)

Syntypen, Brasilien, Espírito Santo, Sta. Theresa, 5., 9. 1928, leg. O. CONDE, in Sammlung WENDELER.

DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

conforme KRAATZ, 1857 (*Omalium*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 987)

Holotypus, Bayern, leg. WALTL, im DEI.

consentaneus BENICK, 1938 (*Stenus*)

(Mitt. Münch. Ent. Ges. 28, 269)

♂ Holotypus, Costa Rica, La Caja, 8 km westlich San José, 1934, leg. SCHMIDT. (Genaue Beschreibung und genaue Beschreibung des Typenfundortes in Mitt. Münch. Ent. Ges. 29, 26–27; 1939).

DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

consobrinus BENICK, 1916 (*Stenus*)

(Ent. Mitt. 5, 242–244)

Holotypus, Usambara, im DEI.

contristata KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 304–305)

Syntypen, südliches und mittleres Deutschland, ohne nähere Fundortangaben.

DEI: 4 Syntypen, Styria, leg. KAHR; 1 Syntypus, Silesia.

conveccus EICHELBAUM, 1913 (*Atheta*)

(Arch. Nat. 79 A 3, 146–147)

Syntypen; 6 Ex., Dar-es-Salam, im Garten der evangelischen Mission, in faulenden Zitronen, 5. 1903; 6 Ex., Tanga, im Mist des Zeburindes, 7. 1903; 25 Ex., Amani, 7.–11. 1903; alle leg. EICHELBAUM.

DEI: 2 Syntypen, Amani, 7.–9. 1903.

cordatooides PUTHZ, 1972 (*Stenus*)

(Wiss. Mitt. Bosn.-herz. Landesmus. 1 (1971), Nat., 279–281)

♂ Holotypus, 9 ♂♂, 9 ♀♀ Paratypen, Bulgarien, Maglige, leg. HILF; Holotypus, in Sammlung PUTHZ, Paratypen in Sammlung BENICK und im DEI.

DEI: 4 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

coriaceus CAMERON, 1924 (*Geodromicus*)

(Trans. Ent. Soc. London 1924, 172, 173)

Syntypen; Indien, Chakrata District; Chulli Khud and Binal Gad, 7000–8000 Fuß.

DEI: 1 Syntypus, Chakrata Dist., Binal Gad, 7000–8000 Fuß, 28. 5. 1922, leg. CAMERON.

coriaceus FAUVEL, 1895 (*Lispinus*)

(Rev. d'Ent. 14, 185)

Syntypen; Birma, Carin Asciuii Cheba, 1200–1300 m, 1.; Carin Asciuii Ghécu, 1400–1500 m, 3., 4.; Bhamo, 8.; Tenasserim montagnes entre Meekalan et Kyeat, 1000–1400 m, 3.; alle leg. FEA. Puio Penang; Java, monts Tengger, 1100 m, Icibodas, leg. FRUHSTORFER.

DEI: 1 Syntypus, Carin Asciuii Cheba, 1200–1300 m, 1. 1888, leg. FEA.

corticaria KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 282–283)

Syntypen, Deutschland, ohne nähere Fundortangaben.

DEI: 6 Syntypen, Berlin; 1 Syntypus, Leipzig.

corpulentus LUZE, 1901 (*Mycetoporus*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 51, 707–708)

Zahlreiche Syntypen; Riesengebirge, leg. SKALITZKY; Glatzgebirge, leg. v. BODEMEYER; Böhmen, leg. REITTER; Ungarn, leg. CHYZER, V. HEYDEN, REITTER; Croatiens, leg. BERNHAUER, V. HEYDEN, V. VIERTL; Serbien, leg. MERKL; Siebenbürgen, Rodnaer Gebirge, leg. DEUBEL, GANGLBAUER; Steiermark, leg. KOLTZE; Bachergebirge, leg. GANGLBAUER; Kärnten, leg. KAUFMANN; Tirol, leg. HALBHEER, KAUFMANN, LOKAY; Salzburg, Gastein, leg. SKALITZKY; Niederösterreich, leg. KAUFMANN.

DEI: 1 Syntypus, Spindelmühle, Riesengebirge, leg. SKALITZKY.
costaricensis BERNHAUER, 1940 (*Palagria*)
(Arb. morph. tax. Ent. 7, 159–160)

Syntypen, Costa Rica, La Caja bei San José, 1934, leg. SCHMIDT, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.
DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

cocaitis FAUVEL, 1895 (*Paeaderus*)
(Rev. d'Ent. 14, 232–233)

Syntypen; Birma, Semmigion, 2.; Vyounk-Myoung, 4.; de Yonang-Young à Mandalay; Teinzo; Rangoon, 5.; Bhamo, 6.; Schwego-myo, 10.; Myeen-Kyan; alle leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Teinzo, Birmania, 1880, leg. FEA.
cocaitis KRAATZ, 1858 (*Quedius*)
(Berl. Ent. Ztschr. 2, 59–60)

Syntypen, bei Athen, leg. v. HÄLDERICH und v. KIESENWETTER.

DEI: 3 Lectotypus, Graecia, von FAGEL (Bull. Inst. R. Sci. Nat. Belg. 44 (24), 2–4; 1968) festgelegt.
crassiuscula KRAATZ, 1859 (*Homalota*)
(Arch. Nat. 25, 41)

Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 6 Syntypen, Ceylon, leg. J. NIETNER; 1 Syntypus, Ind. post., leg. HELFER.
crassus KRAATZ, 1859 (*Psilotrachelus*)
(Arch. Nat. 25, 124–125)

♂ Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

crenicalis KRAATZ, 1857 (*Schistogenia*)
(Linnaea 11, 40)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 5 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

crenifrons BERNHAUER, 1917 (*Oscorius*)
(In: VOELTZKOW, A., Ergebnisse Reise in Ostafrika 3, 557)

♂ Holotypus, 1 Paratypus, Madagascar.

DEI: 1 Paratypus, Madagaskar.

cres PUTHZ, 1971 (*Stenus*)
(Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg. 47 (14), 3)

♂ Holotypus, Kreta, leg. PAGANETTI, im DEI.

cribrata FENYES, 1914 (*Aleochara*)
(Arch. Nat. 80 A 2, 55)

♂? Holotypus, Formosa, Anping, leg. SAUTER, det. Nr. 4370, im DEI; 1 Paratypus, vom selben Fundort.

DEI: Holotypus, Formosa, Anping, 1911, leg. SAUTER.

cribrata KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 288)

Syntypen; 1 Ex. Baiern, leg. WALTL; 2 Ex. Brieselanger Forst bei Berlin, unter feuchtem Laub, leg. WEIDEHASE.

DEI: 3 Syntypen, Berlin.

cribricollis L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Edaphus*)
(Horae Soc. Ent. Ross. 21, 109)

Syntypen, Sumatra, in Nicotiana.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra, in Tabak.

cribripennis KRAATZ, 1856 (*Leptusa*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 65–66)

Syntypen, Österreich.

DEI: 1 Syntypus, Austria.

cuneiformis KRAATZ, 1856 (*Leptusa*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 66–67 nota)

Holotypus, Ungarn, leg. FRIVALDSKY, im DEI.

cupreolus FAUVEL, 1895 (*Mitomorphus*)
(Rev. d'Ent. 14, 240–241)

Syntypen; Birma, Carin Cheba, 900–1100 m., 5., 12.; Carin Asciuii Ghéou, 1400–1500 m., 3.–4.; leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Carin Asciuii Ghéou, 1400–1500 m., 3.–4. 88, leg. FEA.

currant vastus WENDELER, 1928 (*Priocnirus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1928, 123)

Syntypen, Nord-Luzon, Heightsplan.

DEI: 1 Syntypus, Luzon, Heightsplan.

currax KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 198–199)

Zahlreiche Syntypen, bei Ilsenburg im Harz, am Ufer der Ilse; Thüringen; Österreich; Baiern.

DEI: 1 Syntypus, Herzyn, leg. KRAATZ; 1 Syntypus, Bavar, leg. WALTL.

curta KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)
(Arch. Nat. 25, 136)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 3 Syntypen, Ceylon.

curticornis FAUVEL, 1895 (*Staphylinus*)
(Rev. d'Ent. 14, 256)

Syntypen, Birma, Carin Cheba, 900–1100 m., 5.–12., leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Birma, Carin Cheba, 400–900 m., 4. 1888, leg. FEA.

cyanaea KRAATZ, 1856 (*Tachysusa*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 152)

Syntypen, Steyermark, leg. KAHR.

DEI: 1 Syntypus, Styria, leg. KAHR.

cyaneolytrius KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 80)

Holotypus, Nord-Indien, leg. BACON.

DEI: Holotypus, Ostindien (Etikettierungs- oder Druckfehler?)

dalmatina SACHSE, 1852 (*Pronomaea*)
(Stett. Ent. Ztg. 13, 119—120)

Syntypen, Dalmatien, von KAHR.

DEI: 1 Syntypus, Dalmatien, leg. KAHR.

dammermani CAMERON, 1925 (*Neocallicerus*)
(Treubia 6, 193—194)

♂? Holotypus, Pangrango, 2400 m, 8. 1921, leg. DAMMERMAN, im DEI.

dammermani CAMERON, 1925 (*Peliopelta*)
(Treubia 6, 196)

4 Syntypen, Java, Tjibodas, 1400 m, leg. DAMMERMAN.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Tjibodas, 1400 m, 28. 5. 1922, leg. DAMMERMAN.

decipiens KRAATZ, 1859 (*Scopaeus*)

(Arch. Nat. 25, 131)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 7 Syntypen, Ceylon.

decipiens KRAATZ, 1859 (*Staphylinus*)

(Arch. Nat. 25, 75—76)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 2 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

deformis KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 244)

Syntypen, Deutschland, ohne nähere Angaben.

DEI: 1 Syntypus, Crefeld.

deinekini ROUBAL, 1913 (*Lathrimaeum*)

(Kosmos (Lemberg) 38, 479—480)

Zahlreiche Syntypen, Nordkaukasus, am Gebirgsfluß Teberda, 6. 1912, leg. ROUBAL.

DEI: 9 Syntypen, ca. bei Teberda, 6. 1912, leg. ROUBAL.

delicatus KRAATZ, 1857 (*Thinobius*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 884 nota)

Holotypus, Beaujolais, im DEI.

densepunctatus BENICK, 1938 (*Stenus*)

(Mitt. Münch. Ent. Ges. 28, 278)

Syntypen; 1 ♂, Nicaragua, Managua, leg. SOLARI; 5 ♂♂, 2 ♀♀, Costa Rica, San José, 1000—1200 m, 15. 9. 1930, 13. 10. 1932 und 20. 1. 1933, leg. NEVERMANN; 1 ♀, Curridabat, Rio Tiribí, 7. 6. 1925; 1 ♀, Mexico, Tapachula, leg. FLOHR. Genaue Beschreibung und genaue Angaben der Typenfundorte in Mitt. Münch. Ent. Ges. 29, 630—631; 1939.

DEI: 1 Syntypus, Costa Rica, San José, 1000—1200 m, 20. 1. 1933, leg. NEVERMANN.

densus BERNHAUER, 1922 (*Holosus*)

(Arch. Nat. 88 A 7, 221—222)

Syntypen, Formosa; 1 Ex., Taihorin, 1 Ex., Kosempo, leg. SAUTER; 1 Ex., im DEI, 1 Ex., in Sammlung BERNHAUER.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Taihorin, 7. 1911, leg. SAUTER.

dentifera BRUNDIN, 1942 (*Atheta*)

(Ann. Nat. Hist. Mus. Wien 53, Teil 2, 206, Fig. 56, 88, 89, 90)

♂ Holotypus, 2 ♂♂, 4 ♀♀ Paratypen, Dänemark, Seeland, Damhusmosen bei Kopenhagen, leg. JOHANSEN, im Mus. Kopen hagen; 2 ♀♀, dto., leg. WEST; 1 ♀, Hilleröd, leg. JOHANSEN; 1 ♂, Schweden; 1 ♀, Sk. Bøkebergslätt, leg. LOHMANDER; 1 ♂, Deutschland; 1 ♂, 1 ♀, Brandenburg, Finkenkrug; 1 ♂, 2 ♀♀, Wildpark Golm; 1 ♀, Magdeburg; 1 ♂, 3 ♀♀, Sachsen, Umg. Leipzig-Zühnau; 1 ♂, 1 ♀, Modelwitz; 2 ♂♂, Schkeuditz, alle leg. LINKE; 1 ♀, Böhmen, Prag, leg. SKALITZKY; 1 ♀, Mähren, Proßnitz, leg. ZOUFAL; 1 ♂, Niederdonau, Neusiedlersee.

DEI: 1 ♂, 2 ♀♀ Paratypen, Mark, Wildpark — Golm.

depressus KRAATZ, 1859 (*Pinophilus*)

(Arch. Nat. 25, 157—158)

Holotypus, India borealis, BACON, im DEI.

Nach Ansicht von BERNHAUER vielleicht Type von *planus*, Fundort von *planus* ist aber India orientalis.

deubeli GANGLBAUER, 1896 (*Niphetodes*)

(Ann. Nat. Hofmus. Wien 11, 178—179)

Zahlreiche Syntypen, Siebenbürgen, Gipfel des Kuhhorns (Ineu), aus Grasbüscheln, leg. DEUBEL und GANGLBAUER; 2 Syntypen, Siebenbürgen, Bucsecs, leg. DEUBEL; 15 Ex. in Mus. Wien.

DEI: 1 Syntypus, Bucsecs bei Kronstadt, Transs.

dieckmanni SMETANA, 1957 (*Gabrius*)

(Ent. Bl. 53, 70—72)

♂ Holotypus, 3 ♂♂, 6 ♀♀ Paratypen, Deutschland, Thüringen, Salzstolle bei Esperstedt — Frankenhausen (Kyffhäuser), 30. 3. 1956, leg. DIECKMANN. Holotypus und Paratypen in Sammlung SMETANA, Paratypen in Sammlung DIECKMANN.

DEI: 1 ♂, 3 ♀♀ Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1 ♀, 17. 8. 1954.

ditalicornis KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 293—294)

Syntypen, Steiermark, leg. KAHR.

DEI: 1 Syntypus, Styria, leg. KAHR.

ditutum BERNHAUER, 1922 (*Leucocraspedum*)

(Arch. Nat. 88 A 7, 236)

Syntypen, Formosa, Shis und Kosempo, leg. SAUTER.

DEI: 3 Syntypen, Formosa, Shis A 56, 5.—6. 1912, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 22. 5. 1912, leg. SAUTER.

ditutus L. W. SCHAUFLSS, 1887 (*Edaphus*)

(Horae Soc. Ent. Ross. 21, 109—110)

Syntypen, Sumatra.

DEI: 3 ♂ Paratypen, 1 ♂ Paralectotypus, Sumatra, Tabak, von PUTHZ (Philippia 2, 87; 1974) festgelegt.

discalis FAUVEL, 1895 (*Stilicoderus*)

(Rev. d'Ent. 14, 225)

Syntypen, Birma, Carin Asciuli Ghéou, 1400—1500 m, 3.—4., leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

discipennis MULSANT & REY, 1853 (*Aleochara*)

(Opusc. Ent. 2, 61—62)

♂? Syntypen, Lyon, Beaujolais.

DEI: 1 Syntypus, Lyon.

distigma KRAATZ, 1859 (*Conosoma*)

(Arch. Nat. 25, 61—62)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 1 Syntypus, Ost-Indien.

divisus SCHUBERT, 1911 (*Bolitobius*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1911, 35–36)

Holotypus, Chile, Concepcion.

DEI: Holotypus, Chile, Concepcion, an Pilzen, leg. HERBST.

dodopora THOMSON, 1867 (*Atheta*)
(Skandinavien Coleoptera 9, 283–284)

Syntypen, Schweden, Stehag in Skåne.

DEI: 1 Syntypus, Suecia.

drakei BERNHAUER, 1908 (*Pinophilus*)
(Arch. Nat. 74, 305)

Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.

DEI: 2 Syntypen, Paraguay, DRAKE.

dubia KRAATZ, 1859 (*Homalota*)
(Arch. Nat. 25, 37)

Holotypus, Ceylon, l. . NIETNER, im DEI.

dubia FENYES, 1914 (*Schistogenia* ?)
(Arch. Nat. 80 A 2, 48)

1 Ex., Formosa, Shis; 1 Ex., Formosa, Kosempo: leg. SAUTER. Holotypus det. Nr. 4386, 1 Paratypus, im DEI.

DEI: Holotypus, Formosa, Shis A 56, 5.–6. 1912, leg. SAUTER; 1 Paratypus, Kosempo, Formosa, 22. 5. 1912, leg. SAUTER.

dubiosa BENICK, 1935 (*Atheta*)
(Ent. Bl. 31, 29–31)

♂ Holotypus, Umgebung des Würmsteins, 16. 5. 1931, leg. STÖCKLEIN; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Bosnien, Prozor, 1902, leg. LEONHARD.

dubium BERNHAUER, 1940 (*Conosoma*)
(Arb. morph. tax. Ent. 7, 158–159)

Syntypen, Costa Rica, La Caja 8 km westlich von San José, 1930, leg. SCHMIDT, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

dubius KRAATZ, 1859 (*Paeaderus*)
(Arch. Nat. 25, 151)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 5 Syntypen, Ceylon.

dudu EICHELBAUM, 1913 (*Myrmedonia*)
(Arch. Nat. 79 A 3, 153)

12 Syntypen, Ostafrika, Amani, 7.–11. 1903, leg. EICHELBAUM.

DEI: 1 Syntypus, Amani, 7.–11. 03, leg. EICHELBAUM.

ecitonis WASMANN, 1913 (*Mimonilla*)
(Ent. Mitt. 2, 377–378, 380)

2 Syntypen, Rio Itabapoana, E. Esp., S. Brasil., B. J. Januar/Februar 1906, leg. ZIKAN.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

egregia APFELBECK, 1906 (*Aleochara*)
(Glaesn. Zem. Muz. Bosn. Herceg. 17, 242–243)

Syntypen, Hercegovina; Crna Gora; Albanien.

DEI: 2 Syntypen, Hercegov., Utovo – bl., 1902, leg. APFELBECK.

eichhoffi SCRIBA, 1867 (*Atheta*)
(Berl. Ent. Ztschr. 11, 390)

♂ Syntypen, Jülich, im Anspüllicht, leg. EICHHOFF.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Jülich.

eichhoffi SCRIBA, 1867 (*Homaloia*)
(Berl. Ent. Ztschr. 11, 390)

Syntypen, Jülich, leg. EICHHOFF.

DEI: 1 Syntypus, Jülich.

elatus FAUVEL, 1904 (*Platyprosopus*)
(Rev. d'Ent. 23, 70)

[nom. nov. pro *P. indicus* KRAATZ, Arch. Nat. 25, 114; 1859]

Syntypen, Nord-Indien, leg. BACON.

DEI: 2 Syntypen, India or., leg. BACON (Etikettierungs- oder Druckfehler ?).

elegans KRAATZ, 1859 (*Cephalothetus*)
(Arch. Nat. 25, 123–124)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 7 Syntypen, Ceylon.

elegans BAUDI, 1857 (*Falagria*)
(Berl. Ent. Ztschr. 1, 97)

Syntypen, Cypern, leg. TRUQUI.

DEI: 1 Syntypus, Cypern.

elegans KRAATZ, 1857 (*Omalium*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 989–990)

Holotypus, Schlesien, Grafschaft Glaz, im DEI.

elegantissimus CAMERON, 1925 (*Philonthus*)
(Treubia 6, 186)

6 Syntypen, Java, Tjibodas, 1400 m, 8. 1921, leg. DAMMERMAN.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

elegantulus KRAATZ, 1857 (*Compochilus*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 896–897 nota)

Syntypen, Crete, leg. ZEBE.

DEI: 2 Syntypen, Crete, leg. ZEBE.

elongata KRAATZ, 1853, (*Myllaena*)
(Stett. Ent. Ztg. 14, 373)

Syntypen, Saxonia.

DEI: 1 Syntypus, Lipsia.

elongatula BALCANICA BRUNDIN, 1942 (*Atheta*)
(Ann. Nat. Hist. Mus. Wien 53, Teil 2, 230–232, Fig. 106)

Holotypus, Neusiedlersee-Gebiet, leg. WINKLER, in Sammlung BRUNDIN; zahlreiche Paratypen aus Deutschland, Banat, Frankreich und Kleinasien, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Banat, Herkulesbad, 1909, leg. HILF; 2 Paratypen, Zante, Kalamaki, 1909, leg. HILF; 1 Paratypus, Maklen Pass, aus coll. LEONHARD.

elongatula cretica BRUNDIN, 1942 (*Atheta*)

(Ann. Nat. Hist. Mus. Wien 53, Teil 2, 232–233, Fig. 107)

♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, Kreta, leg. PAGANETTI; Holotypus in Sammlung BRUNDIN, Paratypus im Mus. Wien.
DEI: 1 Paratypus, Kreta, leg. PAGANETTI.*eppelsheimi* GANGLEBAUER, 1896 (*Niphetodes*)

(Ann. Nat. Hofmus. Wien 11, 178)

16 Syntypen, Rodnaer Alpen, Gipfel des Koronjis, leg. GANGLEBAUER & DEUBEL, 9 Ex. im Mus. Wien.
DEI: 1 Syntypus, Rodnaer-Gb., leg. DEUBEL.*eppelsheimi* KRAATZ, 1895 (*Pygostenus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1895, 142)

♂ Holotypus, Togo, leg. CONRADT, im DEI.

erythropterus KRAATZ, 1857 (*Bledius*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 831–832)

Holotypus, Bayrische Alpen, leg. WALTL, im DEI.

erythropodus KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)

(Arch. Nat. 25, 88–89)

Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Nord- und Süd-Indien, leg. BACON.

DEI: 6 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

erythrostictus KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)

(Arch. Nat. 25, 94–95)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 7 Syntypen, Ostindien.

erythrurum ROTTENBERG, 1870 (*Lathrobium*)

(Berl. Ent. Ztschr. 14, 31–32)

Zahlreiche Syntypen, Sizilien, Catania, 26. 2.–5. 4. 1869 und Palermo, 7. 12. 1868–20. 2. 1869; leg. ROTTENBERG.

DEI: 3 Syntypen, Palermo; 5 Syntypen, Catania; leg. ROTTENBERG.

erythrurus KRAATZ, 1858 (*Cyrtothorax*)

(Berl. Ent. Ztschr. 2, 368)

Holotypus, Nova Granada, im DEI.

eustibius KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)

(Arch. Nat. 25, 98–99)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 3 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

exasperata KRAATZ, 1859 (*Homalota*)

(Arch. Nat. 25, 32–33)

2 ♂♂ Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER.

exasperatus KRAATZ, 1859 (*Oxytelus*)

(Arch. Nat. 25, 175)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 3 Lectotypus. 4 ♂♂, 2 ♀♀ Paralectotypen, Ceylon, von HAMMOND festgelegt.

excellens KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 235–236)

Syntypen; 1 Ex., Harz, Brocken, unter einem Stein; einige Ex., Schlesien, in Pilzen; 1 ♀, bei Berlin, in einem mit Pilzen bedeckten Baumstumpf; alle leg. KRAATZ; Thüringen; Baiern und Österreich.

DEI: 2 Syntypen, Berlin; 1 Syntypus, Thüringen; 1 Syntypus, Bavaria; der Syntypus vom Brocken ist verloren gegangen.

excisa KRAATZ, 1857 (*Myrmedonia*)

(Linnæa 11, 50–51)

Syntypen, Ceylon, Termitenhügel bei Colombo, 1855, leg. NIETNER.

DEI: 14 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

exigua BENICK, 1943 (*Atheta*)

(Ent. Bl. 39, 66–67)

♀ Holotypus, Sicilia, Ficuzza, aus Sammlung LEONHARD, im DEI. Entgegen den Angaben in der Originalbeschreibung befindet sich im DEI noch ein 2. Exemplar vom selben Fundort und vom Autor auch als Typus ausgezeichnet.

exigua KRAATZ, 1859 (*Homalota*)

(Arch. Nat. 25, 36)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

exiguus KRAATZ, 1859 (*Metoponcus*)

(Arch. Nat. 25, 108–109)

Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.

exitis KRAATZ, 1851 (*Philonthus*)

(Stett. Ent. Ztg. 12, 293–294)

Mehrere Syntypen, Berlin, Ananas-Haus des Prinzen ALBRECHT, leg. GRIMM; 1 Syntypus, Berlin, Nähe des botanischen Gartens, leg. WEIDENHAUSE.

DEI: 1 Syntypus, Berol. GRIMM.; 2 Syntypen, Umgebung Berlin, GRIMM.

extimia EPPELSHEIM, 1883 (*Bolitochara*)

(Wien. Ent. Ztg. 2, 251–252)

Syntypen, Südungarn, bei Resicza, leg. MERKEL; bei Mahadja, leg. v. BODEMEYER.

DEI: 1 Syntypus, Mehadia.

extimia KRAATZ, 1856 (*Leptusa*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 67 nota)

Holotypus, Siebenbürgen, im DEI.

explorator FAUVEL, 1875 (*Stenus*)

(Faune gallo – rhén. III, 254–255)

Syntypen, Paris, Saint-Germain, leg. BRISOUT; Calvados, Plainville; Finistère, leg. DE LESÉLEUC; Limoges, Biscarrosse, Hautes Pyrénées, Vallée de Barousse, leg. PANDELLE.

DEI: 1 Syntypus, Paris.

fairmairei BERNHAUER, 1925 (*Calodera*)

(Arch. Nat. 91 A 12, 262–263)

Syntypen, Chile, leg. FAIRMAIRE, im DEI und coll. BERNHAUER.

DEI: 1 Syntypus, Chile, leg. FAIRMAIRE.

fallaciosus KRAATZ, 1862 (*Quedius*)

(Berl. Ent. Ztschr. 6, 268–269)

2 Syntypen, bei Berlin, leg. CALIX.

DEI: 2 Syntypen, German. bor., leg. CALIX.

fallax KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 227–228)

Syntypen, Ufer des Mittelmeeres; Strand der Ostsee bei Misdroy, leg. HABELMANN.

DEI: 1 Syntypus, Italien, leg. SCHIÖDTE; 1 Syntypus, Misdroy, leg. HABELMANN.

fasciculatus SAHLBERG, 1870 (*Stenus*)

(Not. Fauna Flora Fennica 11, 341)

Syntypen; Süd-Finnland, See Yskjärvi bei Mohla, 11. 6.; Sortanlaks bei Pyhäjarvi, 23. 7.; Rautus, 12. 8.; Kexholm, Insel Konewits, Karelien, 1839.

DEI: 1 Syntypus, Carel., leg. SAHLBERG.

fasciipennis KRAATZ, 1859 (*Coproporus*)

(Arch. Nat. 25, 59–60)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

fasciiventris FAUVEL, 1895 (*Anisolinus*)

(Rev. d'Ent. 14, 270–271)

Syntypen; Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12.; Bhamo, 4.; Teinzo, 5.; Pegou, Palon, 8.–9.; alle leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Palon (Pegu), 8.–9. 1887, leg. FEA.

faurei BERNHAUER, 1902 (*Oxypoda*)

(Verh. zool. bot. Ges. Wien 52 (Beihet), 201)

Syntypen, Ostsibirien, Quellgebiet des Irkut, leg. LEDER.

DEI: 1 Syntypus, Quellgebiet des Irkut, leg. LEDER.

favosus LEA, 1906 (*Sunius*)

(Proc. Linn. Soc. N.S.W. 31, 199–200; Taf. 18, Fig. 3)

Syntypen, Australien, Queensland, Cairns, leg. HACKER.

DEI: 3 Syntypen, Mugrave R., leg. HACKER.

feae FAUVEL, 1895 (*Eucibdelus*)

(Rev. d'Ent. 14, 247–248)

Syntypen, Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12., leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

feae FAUVEL, 1895 (*Eupiestus*)

(Rev. d'Ent. 14, 187–188)

Syntypen; Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12.; Tenasserim, Thagata, 4., leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Tenasserim, Thagata, 4. 1887, leg. FEA.

feae FAUVEL, 1895 (*Hesperus*)

(Rev. d'Ent. 14, 260–261)

Syntypen; Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12.; Carin Asciuii Ghécu, 1400–1500 m, 3.–4.; leg. FEA. Sikkim, Da Jeeling, leg. CHRISTIE.

DEI: 1 Syntypus, Carin Asciuii Ghécu, 1400–1500 m, 3.–4. 1888, leg. FEA.

feae FAUVEL, 1895 (*Paederus*)

(Rev. d'Ent. 14, 232)

Syntypen; Birma, Semmigion, 2.; Katha, 4.; Teinzo, 5.; leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Teinzo, Birmania, 1886, leg. FEA, Maggio.

feae FAUVEL, 1895 (*Stilicoderus*)

(Rev. d'Ent. 14, 224–225)

Syntypen; Birma, Carin Ghécu, 1300–1400 m, 2.–3.; Carin Asciuii Ghécu, 1400–1500 m, 3.–4.; leg. FEA.

DEI: 3 Syntypen, Birma, Carin Asciuii Ghécu, 1400–1500 m, 3.–4. 1888, leg. FEA.

feae FAUVEL, 1895 (*Xantholinus*)

(Rev. d'Ent. 14, 242–243)

Syntypen; Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12. 1888, leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

femoratus SCHUBERT, 1911 (*Pinophilus*)

(Dttsch. Ent. Ztschr. 1911, 8–9)

♂ Holotypus, China, Pingshang, leg. KREYENBERG, im DEI.

femoratus L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Tamotus*)

(Nunquam otirosus 2, 289)

Holotypus, Cuba, leg. GUNDLACH, im DEI.

fenesstratus FAUVEL, 1895 (*Stilicoderus*)

(Rev. d'Ent. 14, 225–226)

Syntypen, Birma, Carin Asciuii Ghécu, 1400–1500 m, 3.–4., leg. FEA.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

ferruginea CAMERON, 1925 (*Eusteniamorpha*)

(Tribubia 6, 189–190)

3 Syntypen, Ostindien, Tjibodas, 1400 m, 24. 5. 1921.

DEI: 1 Syntypus, Tjibodas, 1400 m.

ferruginea CAMERON, 1928 (*Masuria*)

(Ent. Monthly Mag. 64, 52)

Syntypen; N. Indien, Mussorie, Mossy Falls; Chakrata, Khedar Khud; Simla Hills, Gahan, 7000–8000 Fuß.

DEI: 1 Syntypus, Chakrata Dist., Khedar Khud, 7500 Fuß, 7. 5. 1922, leg. CAMERON.

ferruginea KRAATZ, 1857 (*Omalium*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 980–981)

Syntypen, Harz, Brocken, leg. KRAATZ.

DEI: 2 Syntypen, Brocken.

ferruginea KRAATZ, 1859 (*Oxytelus*)

(Arch. Nat. 25, 173)

Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFNER.

DEI: 3 Lectotypus, 4 Paralectotypen, Ceylon; 3 Paralectotypen, India or., von HAMMOND festgelegt.

filum KRAATZ, 1862 (*Aleochara*)

(Berl. Ent. Ztschr. 6, 318–319)

Syntypen; 1 Ex., Österreich; 1 Ex., Bozen, leg. GREDLER; 1 Ex., Mühlhausen, leg. KELLNER.

DEI: 1 Syntypus, Bozen, Mai–Juni.

filum KRAATZ, 1859 (*Cryptobium*)

(Arch. Nat. 25, 119–120)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

filum KRAATZ, 1859 (*Leptacinus*)
(Arch. Nat. 25, 111–112)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 7 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

fimorum BRISOUT, 1860 (*Homalota*)

(Ann. Soc. Ent. France III. 8, 343–344)

Syntypen, Frankreich, Saint-Germain, an Hirschlosung, Kadavern und Pilzen.

DEI: 1 Syntypus, Paris, Bris.

flava KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 327–328)

Syntypen, Süddeutschland, ohne nähere Fundortangaben.

DEI: 1 Syntypus, Graetz; 4 Syntypen, Tirol.

flava KRAATZ, 1856 (*Oxypoda*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 175–176)

Syntypen, Österreich.

DEI: 1 Syntypus, Österreich.

flavicornis KRAATZ, 1859 (*Coproporus*)

(Arch. Nat. 25, 56–57)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELPER.

DEI: 1 Syntypus, V. Indien (Etikettierungs- oder Druckfehler ?).

flavicornis FAUVEL, 1895 (*Neobisnius*)

(Rev. d'Ent. 14, 261)

Syntypen, Birmania, Carin Asciiii Ghécu, 1400–1500 m, 3.–4., leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

flavicornis KRAATZ, 1856 (*Oxypoda*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 185–186)

Syntypen, Deutschland, Brieselanger Forst, unter feuchtem Laub in Sandgräben, leg. WAGENSCHIEBER.

DEI: 3 Syntypen, Berlin.

flavipennis KRAATZ, 1859 (*Leptacinus*)

(Arch. Nat. 25, 111)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: Lectotypus, 7 Paralectotypen, Ceylon, leg. NIETNER, von SMETANA festgelegt.

flavipennis KRAATZ, 1859 (*Oxytelus*)

(Arch. Nat. 25, 172–173)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELPER.

DEI: 3 Lectotypus, India or., von HAMMOND (Syst. Ent. 1, 27–28; 1976) festgelegt.

flavipes KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)

(Arch. Nat. 25, 88)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

flavocincta KRAATZ, 1859 (*Falagria*)

(Arch. Nat. 25, 4–5)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELPER.

DEI: 11 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; 3 Syntypen, Ind. post., leg. HELPER.

flavus KRAATZ, 1859 (*Sunius*)

(Arch. Nat. 25, 149)

Holotypus, ohne Fundortangabe.

DEI: Holotypus, India or.

fluvialis KRAATZ, 1854 (*Homalota*)

(Stett. Ent. Ztg. 15, 124)

6 Syntypen, Ufer der Ahr.

DEI: 3 Syntypen, Ahrweiler.

foetidus CAMERON, 1930 (*Oxytelus*)

(Fauna Brit. Ind. Col. Staph. 1, 230)

Syntypen; United Provinces, Dehra Dun, leg. CAMERON; Bihar, Ranchi; Ceylon, Dikoya, leg. LEWIS.

DEI: 3 Paralectotypen, Dehra Dun, 30. 9. 1922, leg. CAMERON, von HAMMOND festgelegt.

fontinalis KIESERNWETTER, 1850 (*Lesteva*)

(Stett. Ent. Ztg. 11, 222)

Syntypen, Catalonien, Montserrat.

DEI: 1 Syntypus, Mt. Serrat.

formosa KRAATZ, 1856 (*Oxypoda*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 176–177)

Syntypen, mittleres und südliches Deutschland.

DEI: 1 Syntypus, Germ. mer.

formosae BERNHAUER, 1922 (*Bledius*)

(Arch. Nat. 88 A 7, 223)

Syntypen, Formosa, Anping und Suisharyo, leg. SAUTER.

DEI: 14 Syntypen, Formosa, Anping, 5.–7. 1911; 1 Syntypus, Formosa, Taihorin, 7. 12. 1911; alle leg. SAUTER.

formosae BERNHAUER, 1922 (*Dibeloneutes*)

(Arch. Nat. 88 A 7, 228–229)

Syntypen, Formosa, Anping und Tainan, leg. SAUTER.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Anping, 7. 1911, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Tainan, 8. 1911, leg. SAUTER.

formosae BERNHAUER, 1922 (*Oligota*)

(Arch. Nat. 88 A 7, 237)

Syntypen; Formosa, Takau, in Coll. BERNHAUER; 1 Ex., Formosa, Akau, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Akau, 12. 1907, leg. SAUTER.

formosae BERNHAUER, 1922 (*Philonthus*)

(Arch. Nat. 88 A 7, 232–233)

Syntypen, Formosa, Kankau, Pilam und Alikang, leg. SAUTER.

DEI: 2 Syntypen, Kankau (Koshun), Formosa, 7. 1909, leg. SAUTER; 2 Syntypen, Pilam, Formosa, 1908, leg. SAUTER.

formosanus BERNHAUER, 1922 (*Coproporus*)
(Arch. Nat. 88 A 7, 235)

Syntypen, Formosa, Taihorin, leg. SAUTER.

DEI: 4 Syntypen, Formosa, Taihorin, 22. 7. 1911, leg. SAUTER.

formosanus BENICK, 1914 (*Stenus*)
(Ent. Mitt. 3, 285–287)

Holotypus, Formosa, Tainan, 1912, leg. SAUTER, im DEI.

fortepunctata EICHELBAUM, 1913 (*Pronomaea*)
(Arch. Nat. 79 A 3, 135)

4 Syntypen, Ost-Afrika, Amani, 7.–9. 1903, leg. EICHELBAUM.

DEI: 1 Syntypus, Amani, 7.–9. 1903, leg. EICHELBAUM.

forticornis KRAATZ, 1853 (*Myllaena*)
(Stett. Ent. Ztg. 14, 373)

Holotypus, Bonn, im DEI.

fossigerum KRAATZ, 1859 (*Cryptobium*)
(Arch. Nat. 25, 120–121)

Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELPER.

DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; 1 Syntypus, Ostindien.

foveicollis KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 296)

Syntypen, Sächsische Schweiz, leg. MÄRKEL.

DEI: 4 Syntypen, Saxonia.

foveicollis KRAATZ, 1859 (*Troglphloeus*)
(Arch. Nat. 25, 180)

Syntypen; Ost-Indien, leg. HELFER; Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 8 Syntypen, Ceylon; 4 Syntypen, India or.

fragilicornis KRAATZ, 1858 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 202)

2 Syntypen, Ahrweiler, leg. KRAATZ.

DEI: 1 Syntypus, Ahrweiler.

fragilis KRAATZ, 1854 (*Homalota*)

(Stett. Ent. Ztg. 15, 125)

Mehrere Syntypen, Ufer der Ahr.

DEI: 3 Syntypen, Ahrweiler.

frater KRAATZ, 1857 (*Bledius*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 827 nota)

Syntypen, bei Nizza, am Ufer des Var, leg. SCHAUM.

DEI: 6 Syntypen, Nizza, leg. SCHAUM.

frater SMETANA, 1965 (*Ocyptus*)

(Reichenbachia 5, 31–33)

♂ Holotypus, 4 Paratypen, Anatolia bor., Abant-Geb., 1100–1500 m, 8. 8. 63, leg. HEINZ, in Sammlung SMETANA;

3 Ex., vom selben Fundort, leg. KORGE; 34 Ex., Abant-Geb., bei Bolu, 30. 5. 1964, leg. KORGE, in Sammlung KORGE; 2 Ex., Kulakkaya bei Giresun, 1450 m, 27. 7. 63, leg. HEINZ, in Sammlung SMETANA.

DEI: 2 Paratypen, Abant-Geb., bei Bolu, As.mин., 30. 5. 64, leg. KORGE.

fraternus BERNHAUER, 1922 (*Platyporopodus*)

(Arch. Nat. 88 A 10, 150)

Syntypen, Kambodja.

DEI: 5 Syntypen, Kambodja, FRIEDERICHS.

frigidum SAHLBERG, 1880 (*Deliphrum*)

(Sv. Vet. Akad. Handl. N. F. 17 (1879) Nr. 4, 108)

Syntypen, Sibirien, Tolstoinos, 2.–6. 9., im Mus. Helsingfors und in den Sammlungen FAUVEL, HAGLUND, EPPELSHEIM, KRAATZ und SAHLBERG.

DEI: 1 Syntypus, Tolstoinos.

frontalis FAGEL, 1958 (*Paederus*)

(Explor. Parc Nat. Upemba Miss. DE WITTE, fasc. 51, 415–417, Fig. 319, 346, 347, 356, 359)

♂ Holotypus, ♀ Paratypus, Kwai Usambara, im Inst. royal Sci. nat. Belgique. Paratypen, vom selben Fundort, 1 ♀, im DEI, 1 ♂, im Mus. Berlin, 1 ♂, 1 ♀, Usambara Mts, Mkusi, 8. 1950, leg. VERDCOURT in Coll. LAST.

DEI: 1 ♀ Paratypus, Usambara.

frostii BERNHAUER, 1928 (*Anthobium*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1928, 40)

Syntypen, Massachusetts, Monterey, 22. 7., leg. FROST, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

fuchstii KRAATZ, 1857 (*Philotermes*)

(Linnaea 11, 15)

Syntypen, Tennessee, leg. MÄRKEL.

DEI: 1 Syntypus, Tennessee, MÄRKEL.

fucicola KRAATZ, 1857 (*Omalium*)

(Stett. Ent. Ztg. 18, 286)

Mehrere Syntypen, Island, Reykjavik, am Seestrande unter faulenden *Fucus*-Arten.

DEI: 1 Syntypus, Island, leg. STAUDINGER.

futuressciata BENICK, 1940 (*Megalopsidia*)

(Arb. morph. tax. Ent. 7, 328–330)

♂ Holotypus, Venezuela, Caracas, im DEI.

fumatum KOCH, 1937 (*Achenium*)

(Publ. Mus. ent. PIETRO ROSSI 2, 129)

Syntypen, Adana, leg. WINKLER, im Mus. ent. Duino; 1 Syntypus, Turcia, leg. BAUDI, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Adana, Asm. 5. 1934, leg. NEUBERT; 1 Syntypus, Turcia, BAUDI.

funebris KRAATZ, 1856 (*Oxypoda*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 166–167)

Syntypen, Grafschaft Glatz, unter feuchtem Laub und Moos, leg. ZEBE und KRAATZ.

DEI: 1 Syntypus, Schlesien.

fungivora THOMSON, 1867 (*Bessobia*)

(Skandinavien Coleoptera 9, 260–261)

Syntypen, Schweden, Dahlby bei Lund.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.

fusciceps KRAATZ, 1859 (*Isomalus*)

(Arch. Nat. 25, 184)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 2 Syntypen, Ceylon.

fuscipennis KRAATZ, 1859 (*Hoplandria*)

(Arch. Nat. 25, 9—10)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 5 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

fuscipennis KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)

(Arch. Nat. 25, 138—139)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 9 Syntypen, Ceylon.

fuscotestaceus CAMERON, 1924 (*Proteinus*)

(Trans. Ent. Soc. London 1924, 162)

Syntypen, Indien, Dehra Dun. U.P.

DEI: 3 Syntypen, Dehra Dun., 4. 3. 1922, leg. CAMERON.

fuscus KRAATZ, 1859 (*Tanygnathus*)

(Arch. Nat. 25, 65)

Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.

fusci KRAATZ, 1859 (*Myrmedonia*)

(Berl. Ent. Ztschr. 3, 53—54)

Holotypus, Rheinland, bei Düsseldorf oder Ahrweiler, leg. FUSS.

DEI: Holotypus, Rheinland, Ahrweiler, leg. FUSS.

ganglbaueri APFELBECK, 1907 (*Leptusa*)

(Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien 116, Abt. 1, 507—508)

Syntypen, Albanien, Merdita, Bulshari bei Oroshi und Munela-Gebirge bei Fandi, unter Eichenlaub, leg. LATIF, 1905 und WINNEGUTH, 1906.

DEI: 2 Syntypen, Merdita, Mumela, 1906, leg. WINNEGUTH; 1 Syntypus, Merdita, Bulschari.

ganglbaueri EPPELSHEIM, 1887 (*Leptusa*)

(Wien. Ent. Ztg. 6, 230—231)

Syntypen, Niederösterreich, bei Kirchberg am Wechsel, leg. GANGLBAUER.

DEI: 1 Syntypus, Wechsel, 1884, leg. GGLB.

garreisi BERNHAUER, 1914 (*Thinobius*)

(Münch. Kol. Ztschr. 4, 34)

Mehrere Syntypen, Istrien, Lagunen des Seebades Grado, im feuchten Schlamm, leg. BERNHAUER.

DEI: 2 Syntypen, Grado, leg. BERNHAUER.

gemellus KRAATZ, 1857 (*Paederus*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 731—732)

Syntypen: Wien, leg. Graf von FERRARI; Rauden, leg. ROGER; Schweiz, leg. STIERLIN.

DEI: 4 Syntypen, Austr.

gemellus KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)

(Arch. Nat. 25, 91—92)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 7 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

gemina KRAATZ, 1859 (*Myrmedonia*)

(Arch. Nat. 25, 27)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 3 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

geminum KRAATZ, 1857 (*Lathrobium*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 673—674)

♂ Holotypus, ohne Fundortangabe.

DEI: Holotypus, Germ.

geminus KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)

(Arch. Nat. 25, 87—88)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

gemmatus FAUVEL, 1895 (*Staphylinus*)

(Rev. d'Ent. 14, 251—252)

Syntypen, Birma, Carin Cheba, 900—1100 m, 5.—12., leg. FEA.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

genalis FAUVEL, 1895 (*Pinophilus*)

(Rev. d'Ent. 14, 219)

Syntypen: Birma, Bhama, 8.; Schwego-myo, 10.; Pegou, Palon, 8.—9.; leg. FEA. Sian, Bangkok, leg. DE CASTELNAU. Cambodge, Phnom-Penh; Cochinchine, Mytho, leg. DELAUNEY.

DEI: 1 Syntypus, Birmania, Shwego-myo, 10. 1885, leg. FEA.

gerhardti BENICK, 1915 (*Stenus*)

(Ent. Mitt. 4, 233—234)

Syntypen, Schlesien, Maitisch bei Liegnitz, leg. KOLBE.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

germana CAMERON, 1925 (*Pelioptera*)

(Treibia 6, 196—197)

Holotypus, Prinsen Eiland; Paratypen, Tjibodas, Batavia. Die Typenserie besteht aus 7 Ex., aus der Beschreibung ist nicht ersichtlich, wieviel Exemplare von den beiden Fundorten vorlagen.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Prinsen Eil., 20. 1. 1922, leg. DAMMERMAN.

gestroi FAUVEL, 1895 (*Stenus*)

(Rev. d'Ent. 14, 212)

Syntypen; Birma, Carin Cheba, 500—1000 m, 12.; Carin Asciuii Cheba, 1200—1300 m, 1.; Carin Ghécu, 1300—1400 m, 2.—3.; alle leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Carin Cheba, 500—1000 m, 12. 1887; 1 Syntypus, Asciuii Cheba, Carin, 1. 1888, leg. FEA.

gestroi FAUVEL, 1895 (*Xantholinus*)

(Rev. d'Ent. 14, 243)

Syntypen; Birma, Carin Cheba, 900—1100 m, 5.—12.; Carin Ghecu, 1300—1400 m, 5.; Carin Asciuii Ghecu, 1400—1500 m, 3.—4.; alle leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Carin Ghecu, 1300—1400 m, 5. 1888, !eg. FEA.

geysiri SCHUBERT, 1909 (*Atheta*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1909, 774)

Syntypen, Island, 1905.

DEI: 2 Syntypen, Island, Geysir, 1905.

ghiliani KRAATZ, 1857 (*Philonthus*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 574 nota)

Syntypen, Piemonteser Alpen, leg. GHILIANI.

DEI: 3 Syntypen, Piemont, leg. GHILIANI.

gigantulus BERNHAUER, 1922 (*Bledius*)

(Arch. Nat. 88 A7, 224)

Syntypen, Formosa, Anping, Taihorin und Suisharyo, leg. SAUTER.

DEI: 9 Syntypen Formosa, Anping, 1911; 4 Syntypen, Formosa, Suisharyo, 12. 1911; alle leg. SAUTER.

ginguinensis BERNHAUER, 1935 (*Oxytelus*)

(Ent. Nachrichtenbl. 9, 5)

Syntypen, China, Tempelberg, 900 m, Ginyün b. Bébé, leg. REITTER.

DEI: 1 Paralectotypus, mit den Angaben der Beschreibung, von HAMMOND festgelegt.

glaber KRAATZ, 1859 (*Hypocyptus*)

(Arch. Nat. 25, 53)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER.

glabriocollis BERNHAUER, 1940 (*Atheta*)

(Arb. morph. tax. Ent. 7, 161)

Syntypen, Costa Rica, La Caja, 8 km n. von San José, 1934, leg. SCHMIDT, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.

DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

globicollis BERNHAUER, 1934 (*Tinotus*)

(Ent. Nachrichtenbl. 8, 19–20)

Syntypen: China, Mittel-Szechuan, Hwa-Yin-Shan, 1600 m, leg. REITTER; Madura, Chambaganoor, leg. DONCKIER; Philipinen, Los Banos, Imugan auf der Insel Luzon; Bacuit auf der Insel Palawan.

DEI: 2 Syntypen, Mittelszechuan, Hwa-Yin-Shan, 1600 m, leg. REITTER.

globulus CAMERON, 1918 (*Mimoclytus*)

(Trans. Ent. Soc. London 1918, 241–242)

Syntypen, Singapore, Keppel Harbour.

DEI: 1 Syntypus, Kepel Harbour, Singapore, Debris, CAMERON.

gracile KRAATZ, 1859 (*Conosoma*)

(Arch. Nat. 25, 62)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

gracilentum KRAATZ, 1859 (*Lathrobium*)

(Arch. Nat. 25, 115–116)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 5 Syntypen, Ceylon.

gracilentus SCHEERPELTZ, 1953 (*Oligolinus*)

(Beitr. Ent. 3, 603–604)

Holotypus, Guatemala, Calé, 11. 4. 1951; 3 Paratypen, Guatemala, Chocoyos, 19. 5. 1951, leg. BECKER; Holotypus, in Sammlung SCHEERPELTZ, 1 Paratypus, im DEI.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

gracilicrus CAMERON, 1925 (*Philonthus*)

(Treubia 6, 186–187)

7 Syntypen, Java, Tjibodas, 1400 m, 8. 1921; 5. 1922, leg. DAMMERMAN.

DEI: 2 Syntypen, Java, Tjibodas, 1400 m, 1 Ex., 8. 1921, 1 Ex., 23. 5. 1922, leg. DAMMERMAN.

gracilicornis KRAATZ, 1859 (*Bledius*)

(Arch. Nat. 25, 169)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 5 Syntypen, Ceylon.

gracilipes KRAATZ, 1857 (*Stenus*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 750)

Syntypen: Spiegitzer Schneeberg, Mähren, leg. v. KIESENWETTER; Glatzer Schneeberg, leg. KRAATZ; 1 Ex., Kärnthen, leg. WALTL.

DEI: 1 Syntypus, Siles.; 2 Syntypen, Carinth., leg. WALTL.

gracilis KRAATZ, 1859 (*Eucibdelus*)

(Arch. Nat. 25, 71)

Syntypen, Nord-Indien, leg. BACON.

DEI: 2 Syntypen, India spt., leg. BACON.

gracilis LETZNER, 1847 (*Philonthus*)

(Übers. Arb. Veränd. Schles. Ges. 1846 (1847), 79–80)

Holotypus, Schlesien, in Sammlung LETZNER, im DEI.

gracilis SACHSE, 1852 (*Silusa*)

(Stett. Ent. Ztg. 13, 119)

Syntypen, N. Amerika, Georgia, leg. GERHARDT.

DEI: 1 Syntypus, Georgia, GERH.

gracilis KRAATZ, 1859 (*Sunius*)

(Arch. Nat. 25, 147–148)

Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.

graeca KRAATZ, 1857 (*Lithocharis*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 717 nota)

Syntypen, Griechenland, leg. v. KIESENWETTER.

DEI: 2 Syntypen, Graecia, leg. v. KIESENWETTER.

graeucus KRAATZ, 1858 (*Xantholinus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 2, 64–65)

Syntypen: Attica, Nauplia, leg. v. KIESENWETTER; Creta, leg. ZEBE; Athen, leg. v. KIESENWETTER, v. HELDREICH und SCHAUER.

DEI: 1 Syntypus, Graecia; 1 Syntypus, Attica.

grandiceps KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)

(Arch. Nat. 25, 95–96)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 2 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

grandiceps KRAATZ, 1879 (*Quedius*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 23, 122)

Holotypus, Amur, leg. CHRISTOPH, im DEI.

granulata BERNHAUER, 1940 (*Eudera*)

(Arb. morph. tax. Ent. 7, 159)

Syntypen, Costa Rica, La Caja, 8 km w. von San José, 1930, leg. SCHMIDT, im DEI und Sammlung BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.***granulata*** CAMERON, 1922 (*Myllaena*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. 9, 9, 652)

Holotypus, Paratypen, Jamaica; Holotypus in Sammlung CAMERON.

DEI: 1 Paratypus, Jamaica, W. Indies.

granulifera KRAATZ, 1859 (*Gyrophaena*)

(Arch. Nat. 25, 48–49)

Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELPER.

DEI: 9 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; 3 Syntypen, Indien, leg. HELPER.

gredleri KRAATZ, 1870 (*Coryphium*)

(Berl. Ent. Ztschr. 14, 416)

2 Syntypen, Tyrol, Kreuzjoch, leg. GREDLER.

DEI: 1 Syntypus, Kreuzjoch, leg. GREDLER.

grisea KRAATZ, 1856 (*Aleochara*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 96–97 nota)

Syntypen, Schweden, leg. THOMSSON.

DEI: 1 Syntypus, Schweden, leg. THOMSSON.

guineensis BERNHAUER, 1912 (*Eulissus*)

(Ent. Mitt. 1, 183)

Syntypen, Guinea, in DEI und in Sammlung BERNHAUER.

DEI: 1 Syntypus, Guinea.

guttatus FAUVEL, 1895 (*Stenus*)

(Rev. d'Ent. 14, 212)

Syntypen: Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12.; Carin Asciuui Ghécu, 1400–1500 m, 3.–4.; Tienzo, 5.; Bhamo, 7.; alle leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Birmanie, Bhamo, 8. 1885, leg. FEA.

hackeri LEA, 1906 (*Surius*)

(Proc. Linn. Soc. N.S.W. 31, 200)

Syntypen, Australien, Queensland, Cairns, leg. HACKER.

DEI: 9 Syntypen, Mulgrave R., leg. HACKER.

hadrocera KRAATZ, 1857 (*Haploglossa*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 1056)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Thüringen, leg. KELLNER.

DEI: 1 Syntypus, Thüringen, leg. KELLNER.

haematopterus KRAATZ, 1857 (*Lamprinus*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 429–430)

Holotypus, Heidelberg, im Herbst, unter Spreu, im Wald, leg. KRAATZ, im DEI.

haematoxyga KRAATZ, 1859 (*Aleochara*)

(Arch. Nat. 25, 15)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

haemopterus KRAATZ, 1856 (*Aleochara*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 101–102)

Syntypen, Deutschland.

DEI: 1 Syntypus, Cassel; 1 Syntypus, Heidelberg.

hampei KRAATZ, 1862 (*Myrmedonia*)

(Berl. Ent. Ztschr. 6, 267)

Syntypen, Croatiens, leg. HAMPE.

DEI: 1 Syntypus, Croatiens, leg. HAMPE.

hauseri BERNHAUER, 1908 (*Falagria*)

(Verh. zool. bot. Ges. Wien 58, 38)

2 Syntypen, Turkestan, Mts. Ghissar, 1898, leg. HAUSER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

heinzi SMETANA, 1965 (*Ocypus*)

(Reichenbachia 5, 30–31)

♂ Holotypus, 16 Paratypen, Anatolia bor., Ilgaz-dagl., 1800–2200 m, 23. 7. 63, leg. HEINZ, in Sammlung SMETANA; 15 Ex., mit den selben Angaben, leg. KORGE, in Sammlung KORGE; 12 Ex., Ilgaz-dagliari, 1200 m, „6“, leg. MUČHE, im Mus. Tierkunde Dresden; 2 Ex., Ilgaz Dagh, Papah Ture, leg. STANĚK, im Mus. Prag.

DEI: 1 Paratypus, Anatolia bor., Ilgaz-dagl., 1800–2200 m, 23. 7. 63, leg. KORGE.

henricischmidti WASMANN, 1929 (*Xenocephalus*)

(Wien. Ent. Ztg. 46, 81–82)

3 Syntypen, Costarica, La Caja, 8 km westlich von San José, leg. SCHMIDT, im DEI und in Sammlung WASMANN.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

heterocera CAMERON, 1925 (*Peltiptera*)

(Treubia 6, 195)

3 Syntypen, Sumatra, Wai Lima.

DEI: 1 Syntypus, Z. Sumatra, Wai Lima, Lampongs No. 59, 11.–12. 1921, leg. KARNY.

heurni CAMERON, 1924 (*Priocnirus*)

(Nova Guinea Zool. 15, 1, 83, 85)

8 Syntypen, Neu Guinea, Doormanpadivak, 1410, 10. 1920.

DEI: 3 Syntypen, N. Guinea, Dormanpadivak, 1410, 10. 1920, leg. VAN HEURN.

heynei BERNHAUER, 1915 (*Ctenopeuca*)

(Stett. Ent. Ztg. 76, 300–301)

Mehrere Syntypen, Chanchamayo in Peru, leg. HEYNE.

DEI: 3 Syntypen, Chanchamayo, Peru, leg. HEYNE.

heynei WENDELER, 1926 (*Paederus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1926, 202)

Syntypen, Costa Rica, Turrialba, 800 m, in Sammlung WENDELER.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Costa Rica, Turrialba, 800 m.

hilfi BENICK, 1915 (*Stenus*)

(Ent. Bl. 11, 225–228)

1 ♂, 2 ♀♀ Syntypen, Bulgarien, Samokov, 1911, leg. HILF.
DEI: 2 Syntypen, Bulgarien, Samokov, 1911, leg. HILF.**hilleri WEISE, 1877 (*Hadrotes*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr. 21, 93–94)

Syntypen, Japan, Hagi, 6. 1874, leg. HILLER.
DEI: 11 Syntypen, Japan, leg. HILLER.**hilleri WEISE, 1877 (*Homalota*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr. 21, 90)

Syntypen, Japan, Hagi, leg. HILLER.
DEI: 1 Syntypus, Japon., leg. HILLER.**himalayica CAMERON, 1924 (*Phyllodrepa*)**

(Trans. Ent. Soc. London 1924, 166)

Syntypen, Indien, Chakrata District, 6500–8000 Fuß; Simla Hills, 9000 Fuß.
DEI: 1 Syntypus, Gahan, Simla Hills, 7000 Fuß, 9. 1921, leg. CAMERON.**hirta KRAATZ, 1859 (*Acanthoglossa*)**

(Arch. Nat. 25, 144–145)

Holotypus, ohne Fundortangaben.
DEI: Holotypus, Ceylon.**hirta KRAATZ, 1859 (*Myrmecodia*)**

(Arch. Nat. 25, 25)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

hispidulus KRAATZ, 1857 (*Bledius*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 825 nota)

Syntypen, Fontainebleau, Compiegne, la Tete, im Sande am Ufer der eisenhaltigen Quellen.
DEI: 2 Syntypen, La Tete.**hoffmanni BERNHAUER, 1928 (*Xantholinus*)**

(Kol. Rundsch. 14, 11–12)

Syntypen, Tientsin, leg. HOFFMANN, im DEI und Sammlung BERNHAUER.

DEI: 2 Syntypen, Tientsin, leg. HOFFMANN.

hoptonota KRAATZ, 1857 (*Myrmecodia*)

(Linnaea 11, 49)

Syntypen, Ceylon, Termitenhügel bei Colombo, 1855, leg. NIETNER.

DEI: 6 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

horni BERNHAUER, 1922 (*Actobius*)

(Arch. Nat. 88 A 7, 231–232)

Syntypen, Formosa, Kankau, leg. SAUTER.

DEI: 5 Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), 7. 1909, leg. SAUTER.

horni BERNHAUER, 1927 (*Brachydirus*)

(Mem. Soc. Ent. Ital. 5 (1926), 168–169)

Syntypen, Kolumbien, Magdalena, leg. THIEME, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

horni BERNHAUER, 1902 (*Cafius*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1902, 28–29)

Syntypen, Ceylon, Weligama, leg. HORN, in Sammlung BERNHAUER.

DEI: 10 Syntypen, Weligama, 1899, leg. HORN.

horni BERNHAUER, 1939 (*Calodera*)

(Arb. morph. tax. Ent. 6, 15)

Syntypen; Isla Calbuco, Süd-Chile, 3. 10. 1937; Puerto Puyuhuapi, leg. SCHWABE, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.

DEI: 1 Syntypus, Puerto Puyuhuapi, Süd-Chile, 23. 12. 1937, leg. SCHWABE; 1 Syntypus, Isla Calbuco, Süd-Chile, 6. 11. 1937, leg. SCHWABE.

horni BERNHAUER, 1922 (*Coproporus*)

(Arch. Nat. 88 A 7, 234)

Syntypen, Formosa, Kosempo, 7. 7. 1911, leg. SAUTER.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

horni BIERIG, 1933 (*Dibolophacus*)

(Rev. d'Ent. 3, 509–511, Fig. 6)

Holotypus, Costa Rica, Vara Blanca, 2000 m, zwischen Barba und Poas, leg. SCHMIDT, im DEI.

horni BERNHAUER, 1932 (*Leptusa*)

(Kol. Rundsch. 17 (1931), 236–237)

Syntypen, Schweiz, Rothorn, im DEI und Sammlung BERNHAUER.

DEI: 2 Syntypen, Rothorn.

horni BIERIG, 1934 (*Oligota*)

(Mem. Soc. Cuban. Hist. Nat. Poey 8, 117–119, Fig. 8)

Holotypus, 1 Paratypus, Costa Rica, La Caja, 1931, leg. SCHMIDT; Holotypus im DEI, Paratypus in Sammlung BIERIG.

DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

horni BERNHAUER, 1902 (*Paederus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1902, 38–39)

6 Syntypen, Ceylon, Nalanda, leg. HORN, in Sammlung BERNHAUER.

DEI: 4 Syntypen, Nalanda, 1899, leg. HORN.

horni BERNHAUER, 1935 (*Polylobus*)

(Stylops 4, 95)

Syntypen, Chile, ex Coll. SOLIER & FAIRMAIRE, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.

DEI: 4 Syntypen, Chile.

horni BERNHAUER, 1927 (*Pygostenus*)

(Rev. Zool. Bot. Afr. 15, 232–233)

Syntypen; Togo; Kamerun, Lolodorf, leg. CONRADT, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.

DEI: 1 Syntypus, Togo.

horni KOCH, 1839 (*Throbalium*)

(Arb. morph. tax. Ent. 6, 111–118)

♂ Holotypus, Sarepta, leg. BECKER, im DEI; 1 ♂ Paratypus, Repetek, Ost-Buchara, in Sammlung FREY.

DEI: ♂ Holotypus, Sarepta, leg. BECKER.

hostilis BERNHAUER, 1936 (*Oxytelus*)

(Phil. Journ. Sci. 61, 82—83)

Syntypen; Mindoro, Subaan; Luzon, Mount Maquiling, Mount Isarog, Imugan, Balbalan, Bayombong, Los Baños, Limay, Pagsanjan; Mindanao, Surigao; Biliran.
DEI: 1 Paralectotypus, Limay, Luzon; 2 Paralectotypen, Imugan, Luzon; 1 Paralectotypus, Subaan, Mindoro; von HAMMOND festgelegt.

hubenthali BERNHAUER, 1908 (*Leptoglossa*)

(Arch. Nat. 74, 346—347)

Syntypen, Chile, leg. HUBENTHAL.

DEI: 1 Syntypus, Chile, Süd-Amerika.

humeralis KRAATZ, 1859 (*Gyrophaena*)

(Arch. Nat. 25, 46—47)

Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELPER.

DEI: 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER.

humeralis KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 278)

Syntypen, Schlesien, Heuscheuer, an Baumstümpfen, an der Unterseite der dort befindlichen Löcherschwämme, leg. KRAATZ.
DEI: 6 Syntypen, Silesia.

humeralis ROTTENBERG, 1870 (*Sunius*)

(Berl. Ent. Ztschr. 14, 34)

18 Syntypen, Sizilien, Palermo, 7. 12. 1868—20. 2. 1869, leg. ROTTENBERG.

DEI: 9 Syntypen, Palermo, leg. ROTTENBERG.

hummeli BERNHAUER, 1912 (*Anthophagus*)

(Ent. Ztschr. Frankf. a. M. 25, 259)

Zahlreiche Syntypen, Asturien, Cancas, leg. HUMMLER-PAGANETTI.

DEI: 1 Syntypus, Cancas Ast., PAGANETTI.

hummeli BERNHAUER, 1914 (*Stenus*)

(Münch. Koll. Ztschr. 4, 265)

Syntypen, Kephallenia, leg. HUMMLER.

DEI: 1 Syntypus, Kephallenia, leg. PAGANETTI.

idiocerus KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)

(Arch. Nat. 25, 85)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 5 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

imitator FAUVEL, 1895 (*Philonthus*)

(Rev. d'Ent. 14, 265—266)

Syntypen; Birma, Carin Asciuii Ghécu, 1400—1500 m, 3.—4., leg. FEA. Sikkim, Darjeeling, leg. CHRISTIE.

DEI: 2 Syntypen, Carin Asciuii Ghécu, 1400—1500 m, 3.—4. 1888, leg. FEA.

immaculata BIERIG, 1933 (*Monista*)

(Rev. d'Ent. 3, 505—506)

Holotypus, Costa Rica, Vara Blanca, 2000 m, zwischen Barba und Poas, im DEI; Paratypen, La Caja, bei Sn. José, 1931, leg. SCHMIDT, in Coll. BIERIG.

DEI: Holotypus, 5 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

innatura KRAATZ, 1859 (*Gyrophaena*)

(Arch. Nat. 25, 47—48)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 3 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

innaturus BERNHAUER, 1922 (*Coproporus*)

(Arch. Nat. 88 A 7, 235)

Syntypen, Formosa, Kosempo, Akau und Takao, leg. SAUTER.

DEI: 10 Syntypen, Formosa, Akau, 12. 1907, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Takao, 15. 12. 1907, leg. SAUTER.

impressicollis KRAATZ, 1857 (*Myrmedonia*)

(Linnaea 11, 53—54)

Syntypen, Ceylon, Termitenhügel bei Colombo, 1855, leg. NIETNER.

DEI: 9 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

improbus PUTZ, 1970 (*Stenus*)

(Mem. Nat. Mus. Victoria Melb. 31, 70—71)

♂ Holotypus, Cairns, HACKER, im DEI.

inaequalis FAUVEL, 1895 (*Hesperus*)

(Rev. d'Ent. 14, 258—259)

Syntypen; Birma, Carin Cheba, 900—1100 m, 5.—12.; Carin Ghécu, 1300—1400 m, 2.—3.; leg. FEA.

DEI: 12 Syntypen, Carin Ghécu, 1300—1400 m, 2.—3. 1888, leg. FEA.

incisa PEYERIMHOFF, 1900 (*Atheta*)

(Bull. Soc. Ent. France 1900, 9—10)

Syntypen; Frankreich Bezirk Digne: Barre des Dourbes, 1600 m; Archaril, 1100 m; Montagne du Cheval Blanc, 2000 m; Forêt de Faillfeu, 1500 m.

DEI: 1 ♀ Syntypus, Besses Alpes.

incola FAUVEL, 1904 (*Astilbus*)

(Rev. d'Ent. 23, 63)

Syntypen; Nilghiris, Birma, Carin Cheba, 900—1000 m, 5.—12.; Carin Asciuii Ghecu, 1400—1500 m, 3.—4.; leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Carin Asciuii Ghecu, 1400—1500 m, 3.—4. 1888, leg. FEA.

indica CAMERON, 1920 (*Apocellagria*)

(Ent. Monthly Mag. 56, 144)

Holotypus, Paratypen, Indien, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES; Holotypus in Coll. CAMERON.

DEI: 1 Paratypus, Nilgiris, S. India.

indica KRAATZ, 1859 (*Ocalea*)

(Arch. Nat. 25, 12)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELPER.

DEI: 3 Syntypen, Ind. post., leg. HELPER.

indica KRAATZ, 1859 (*Oligota*)

(Arch. Nat. 25, 44)

Holotypus, Ost-Indien, leg. HELPER.

DEI: Holotypus, Ind. post., leg. HELPER.

indica KRAATZ, 1859 (*Phloeopora*)
(Arch. Nat. 25, 42)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, Ind. post., leg. HELFER.

indicum KRAATZ, 1859 (*Cryptobium*)
(Arch. Nat. 25, 121)

Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. BACON.
DEI: 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER; 2 Syntypen, Ostindien.

indicum KRAATZ, 1859 (*Dolicaon*)
(Arch. Nat. 25, 118)

Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Nord-Indien, leg. BACON.
DEI: 1 Syntypus, Ind. bor.

indicus KRAATZ, 1859 (*Cephalochetus*)
(Arch. Nat. 25, 124)

Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, Ceylon; 2 Syntypen, India or.

indicus KRAATZ, 1859 (*Diochus*)
(Arch. Nat. 25, 113)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 3 Syntypen, Ostindien; 1 Syntypus, Indien, leg. HELFER.

indicus KRAATZ, 1859 (*Isomalus*)
(Arch. Nat. 25, 183)

Syntypen; Ost-Indien, leg. HELFER; Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 9 Syntypen, Ceylon.

indicus KRAATZ, 1859 (*Mitomorphus*)
(Arch. Nat. 25, 107)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 2 Syntypen, Ostindien, leg. HELFER.

indicus KRAATZ, 1859 (*Palaminus*)
(Arch. Nat. 25, 153–154)

Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.

indicus KRAATZ, 1859 (*Staphylinus*)
(Arch. Nat. 25, 75)

Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Nord-Indien, leg. BACON.
DEI: 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER; 1 Syntypus, Ind. bor., leg. BACON; 2 Syntypen, Ostindien (Etikettierungs- oder Druckfehler?).

indicus KRAATZ, 1859 (*Sunius*)
(Arch. Nat. 25, 148–149)

Syntypen; Ost-Indien, leg. HELFER; Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: Lectotypus, Ceylon; 3 Paralectotypen, India or., von ISRAELSON (Commentat. biol. 37, 22–23; 1971) festgelegt.

indicus KRAATZ, 1859 (*Trogophloeus*)
(Arch. Nat. 25, 179)

Syntypen; Ost-Indien, leg. HELFER; Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 3 Syntypen, India or.; 2 Syntypen, Ceylon.

inducta FENYES, 1914 (*Gnypeta*?)
(Arch. Nat. 80 A 2, 49)

Holotypus, Formosa, Akau, leg. SAUTER, det. Nr. 4398, im DEI.

inermis CAMERON, 1925 (*Peltopiera*)
(Treubia 6, 196)

18 Syntypen, Java, Tjibodas, 1400 m.

DEI: 3 Syntypen, Java, Tjibodas, 1400 m, leg. DAMMERMAN.

infans ROTTENBERG, 1870 (*Bledius*)
(Berl. Ent. Ztschr. 14, 36–37)

Syntypen, Sizilien, Syracus, 6.–21. 4. 1869, leg. ROTTENBERG.

DEI: 3 Syntypen, Syrakus, ROTTENBERG; 3 Syntypen, ohne Fundortangabe.

infuscata KRAATZ, 1853 (*Myllaena*)
(Stett. Ent. Ztg. 14, 373)

Syntypen, Österreich.

DEI: 6 Syntypen, Austr., leg. FRRR.

infuscata KELLNER, 1844 (*Oxypoda*)
(Stett. Ent. Ztg. 5, 413–414)

Syntypen, Thüringer Wald, unter Moos und abgefallenem Laub.

DEI: 1 Syntypus, Thüringen, leg. KELLNER.

infuscatus BENICK, 1916 (*Stenus*)
(Ent. Mitt. 5, 246–247)

Holotypus, (leicht beschädigt), SO-Brasilien, S. Catharina, Teresopolis, im DEI.

inhabitans KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 251–252)

Syntypen, Barmen, leg. STACHELHAUSEN.

DEI: 2 Syntypen, Barmen.

inornata KRAATZ, 1859 (*Homalota*)
(Arch. Nat. 25, 39)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER.

insignis BIERIG, 1934 (*Lathrobium*)
(Arb. morph. tax. Ent. 1, 115–116)

♀ Holotypus, Paratypen, Costa Rica, La Caja, 8 km w. San José, 1931, leg. SCHMIDT. Holotypus, 1 Paratypus, im DEI.

Paratypen, in Sammlung BIERIG.

DEI: ♀ Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

insperatus PUTHZ, 1972 (*Stenus*)
(Great Lakes Ent. 5, 14–15, Fig. 3)

♂ Holotypus, Michigan, Grand ledge, ex Coll. HUBBARD & SCHWARZ; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: ♂ Paratypus, Amer. bor.

insularis FENYES, 1914 (*Aleochara*)
(Arch. Nat. 80 A 2, 53—54)

Holotypus, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER, det. Nr. 4364, im DEI; 2 Paratypen, vom selben Fundort.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Formosa, Kosempo, 5. 1911, leg. SAUTER.

insularis FENYES, 1914 (*Myllaena*)
(Arch. Nat. 80 A 2, 45)

Holotypus, Formosa, Anping, leg. SAUTER, det. Nr. 4378, im DEI.

interposita BENICK, 1970 (*Atheta*)
(Ent. Bl. 66, 98—99)

♀ Holotypus, 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, Bosnia, Bjelasnia planina. Holotypus, in Coll. BENICK, 1 ♂ Paratypus, in Coll. BERNHAUER, 1 ♀ Paratypus, im DEI.

DEI: 1 Paratypus, Bjelasnia planina, Bosnien, Coll. LEONHARD.

inutilis KRAATZ, 1859 (*Homalota*)
(Arch. Nat. 25, 35—36)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

investigatorum KRAATZ, 1864 (*Oxypoda*)
(Berl. Ent. Ztschr. 8, 130)

4 Syntypen, Swinemünde, Strand, 20. 9. 1863, leg. KRAATZ, im DEI.

irregularis WEISE, 1877 (*Bolitobius*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 21, 93)

Syntypen, Japan, bei Hagi und Yokuhama, in Pilzen.

DEI: 3 Syntypen, Japonia.

irritans CHAPIN, 1926 (*Paederus*)

(Arch. Schiffs- u. Trop.-Hygiene 30, 370—371)

♂ Holotypus, 5 ♂, 14 ♀, Paratypen, Ancon, Santa Elena, St. Elena Peninsula, Ecuador, leg. SARGENT. Holotypus, im U. S. Nat. Mus. Nr. 29095.

DEI: 2 Paratypen, St. Elena nr. Gulf of Guayaquil, Ecua, 2. 1926, leg. SARGENT.

istandica KRAATZ, 1857 (*Homalota*)

(Stett. Ent. Ztg. 18, 284)

3 Syntypen, hoher Norden, Island, leg. KRÜPER.

DEI: 2 Syntypen, Island, leg. KRÜPER.

istandica KRAATZ, 1857 (*Oxypoda*)

(Stett. Ent. Ztg. 18, 285)

Mehrere Syntypen, Island, Juni, Juli, unter toten Vögeln.

DEI: 4 Syntypen, Island, leg. STAUDINGER.

istriensis BREIT, 1911 (*Mayetia*)

(Wien. Ent. Ztg. 30, 169—170)

Syntypen, Mte. Maggiore bei Abazzia, leg. CURTI und BREIT.

DEI: 4 Syntypen, Mte. Maggiore, Istrija, leg. BREIT.

italicus BAUDI, 1869 (*Stenus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 13, 387—398 nota)

Syntypen, Pedemont; 1 Syntypus, Raven na.

DEI: 2 Syntypen, Piemont, leg. BAUDI.

italiensis BENICK, 1943 (*Atheta*)

(Ent. Bl. 39, 67)

♀ Holotypus, Italien, Monte Graeco, leg. PAGANETTI, in Coll. LEONHARD, im DEI.

jarrigei PUTHZ, 1970 (*Stenus*)

(Mitt. schweiz. ent. Ges. 43, 111—115)

♂ Holotypus, Spanien, Lerida, Trempl, 15. 6. 1969, leg. COMELLINI; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung. Holotypus, im Mus. Genève, Paratypen in den Mus. Genève, Budapest, Mailand, Prag, München, Berlin, im DEI und in den Sammlungen BENICK, COIFFAET, FRANZ, JARRIGE und PUTHZ.

DEI: 1 ♂ Paratypus, Andalusien, leg. KRAATZ; 1 ♀ Paratypus, Gallia; 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, Gall. mer.

kahufi SCHEERPELTZ, 1935 (*Leptusa*)

(Kol. Rundsch. 21, 135—137)

Zahlreiche Syntypen, aus den Kalkalpen und anderen Gebirgen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 2 Syntypen, Reisalp A. i., unter Buchenkrummholz, 22. 5.—24. 5. 1920, leg. SCHEERPELTZ.

kahrtii KRAATZ, 1857 (*Compsochilus*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 897 nota)

Syntypen, Dalmatien, leg. KAHR.

DEI: 2 Syntypen, Dalmatien, leg. KAHR.

kahuiziensis FAGEL, 1954 (*Paederus*)

(Volume Jubilaire VICTOR VAN STAELLEN Inst. Royal Sc. Nat. Belg., Bruxelles, Band 2, 915—916)

♂ Holotypus, Congo Belge, Kivu, Gebiet Kalehe, südlich von Kahuzi, 2850 m, 27. 7. 1951, leg. LELEUP, im Mus. Tervueren; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, vom Fundort des Holotypus.

kamerunensis BERNHAUER, 1912 (*Eleusis*)

(Ent. Mitt. 1, 177—178)

Syntypen, Südost-Kamerun, Lolodorf, leg. CONRADT, im DEI und Coll. BERNHAUER.

DEI: 2 Syntypen, S.O. Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT.

karnyi CAMERON, 1925 (*Gyrophaena*)

(Treubia 6, 188—189)

3 Syntypen, Sumatra, Wai Lima, 11.—12. 1921, leg. KARNY.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, als Typus ausgezeichnet.

karnyi CAMERON, 1925 (*Leucocraspedum*)

(Treubia 6, 198)

3 Syntypen, Sumatra, Wai Lima, 11.—12. 1921, leg. KARNY.

DEI: 1 Syntypus, Z. Sumatra, Wai Lima, Lampongs No. 14, 11.—12. 1921, leg. KARNY.

karnyi CAMERON, 1925 (*Oligota*)

(Treubia 6, 188)

17 Syntypen, Sumatra, Wai Lima, 11.—12. 1921, leg. KARNY.

DEI: 4 Syntypen, Wai Lima, Z. Sumatra, Lampongs No. 456. 11.—12. 1921, leg. KARNY, 1 Ex., als Typus ausgezeichnet.

kayseri BERNHAUER, 1927 (*Sterculia*)

(Mem. Soc. Ent. Ital. 5 (1926), 163)

Syntypen, Venezuela, leg. KAYSER, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.

DEI: 1 Syntypus, Venezuela, leg. KAYSER.

kellneri KRAATZ, 1875 (*Lithocharis*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 19, 123)

1 ♂, 2 ♀ Syntypen, Thüringen, am Ufer der Apfelstedt bei Dietendorf, leg. KELLNER, in Coll. KELLNER, 1 ♀, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Thüring., leg. KELLNER.

kentiae LEA, 1925 (*Heterothops*)

(Trans. Proc. R. Soc. S. Austr. 49, 238–239)

Lord Howe Island, Gipfel des Mount Gower, an *Kentia canterburyana*, leg. LEA, Holotypus Nr. I. 12690, Paratypen, im Australian Mus.

DEI: 5 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

kiesenwetteri KRAATZ, 1870 (*Otenomasiaz*)

(In: VON HEYDEN, L., Entomologische Reise nach dem südlichen Spanien, 85)

Holotypus, Spanien, Umgebung von Sevilla, leg. KRAATZ, im DEI.

kiesenwetteri KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 245–246 nota)

Holotypus, Griechenland, leg. V. KIESENWETTER, im DEI.

kocsi BERNHAUER, 1910 (*Sipalia*)

(Ent. Bl. 6, 260)

Syntypen, Trencsins, Žižlavnik, Nagy Szyklaš, Szelecz, leg. KOCSI.

DEI: 1 Syntypus, Hung. Trencsen, Žižlavnik, leg. KOCSI.

kohle WASMANN, 1904 (*Dorylominus*)

(Zool. Jahrb. Suppl. 7, 622–625, Fig. 3a–e)

8 Syntypen, oberer Congo bei Stanleyville, leg. KOHL, aus Zügen von *Anomma wilverthi* EMERY.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

kosempoensis BERNHAUER, 1922 (*Bledius*)

(Arch. Nat. 88 A 7, 225)

Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER.

DEI: 2 Syntypen, Formosa, Kosempo, 4. 1912, leg. SAUTER.

kosempoensis BERNHAUER, 1922 (*Paederus*)

(Arch. Nat. 88 A 7, 228)

Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER.

DEI: 3 Syntypen, Formosa, Kosempo, 1911, leg. SAUTER.

kraatzi JACQUELIN DU VAL, 1857–1859 (*Anthobium*)

(Abbildung: Genera Coléoptères d'Europe 2, Taf. 27, Fig. 134.)

Beschreibung: BRISOUT, Matériaux pour la Faune Française, p. 43; 1863. In: GRENIER: Catalogue des Coléoptères de France (1863)

Syntypen, Pyrénées-Orientales, ev. leg. DUVAL.

DEI: 1 Syntypus, Ht. Pyren.

kraatzi BERNHAUER, 1902 (*Astenus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1902, 36–37)

Zahlreiche Syntypen, Ceylon, Nalanda, Anuradhapura und Trincomalee, leg. HORN, in Coll. BERNHAUER.

DEI: 9 Syntypen, Nalanda; 4 Syntypen, Trincomali; 1 Syntypus, Anuradhapura; alle 1899, leg. HORN.

kraatzi PANDELLE, 1869 (*Boitobius*)

(Ann. Soc. Ent. France IV. 9, 356)

Syntypen, Hungaria, Sicilia, Corsica.

DEI: 3 Syntypen, Hungaria, leg. KAHR.

kraatzi FAUVEL, 1895 (*Calliderma*)

(Rev. d'Ent. 14, 235–236)

Syntypen, Carin Asciiii Ghéci, 3., 4., leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Carin Ghéci, 1300–1400 m, 2. – 3. 1888, leg. FEA.

kraatzi FAUVEL, 1878 (*Eleusis*)

(Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 12, 207, nom. nov. pro *apicipennis* KRAATZ, 1859, Arch. Nat. 25, 183–184)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 3 Syntypen, Ceylon.

kraatzi BERNHAUER & SCHUBERT, 1911 (*Osorius*)

(Coleopterorum Catalogus Pars 29, 144, nom. nov. pro *rugiceps* KRAATZ, 1859, Arch. Nat. 25, 166)

Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.

kraatzi BERNHAUER, 1908 (*Pinophilus*)

(Arch. Nat. 74, 303–304)

Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.

DEI: 2 Syntypen, Paraguay, DRAKE.

kraatzi BERNHAUER, 1908 (*Platyprosopus*)

(Arch. Nat. 74, 326)

Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.

DEI: 2 Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.

kraatzi FAUVEL, 1899 (*Pygostenus*)

(Rev. d'Ent. 18, 18)

Syntypen, Nord-Cameroun.

DEI: 2 Syntypen, Kamerun.

kraatzi BERNHAUER, 1908 (*Stenaesthetus*)

(Arch. Nat. 74, 300)

Holotypus, Paraguay, leg. DRAKE, im DEI.

kraatzi BERNHAUER, 1907 (*Stenopsis*)

(Wien. Ent. Ztg. 26, 287)

Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.

DEI: 1 Syntypus, Paraguay, DRAKE.

kraatzi KIRSCH, 1865 (*Xantholinus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 9, 44–45)

Syntypen, Bogotá.

DEI: 2 Syntypen, Bogotá, leg. KIRSCH.

kraatzi FUSS, 1862 (*Borboropora*)

(Berl. Ent. Ztschr. 6, 406)

6 Syntypen, Ahrweiler, 6., 7. 1862, leg. FUSS.

DEI: 2 Syntypen, Ahrweiler.

kreyenberghi BERNHAUER, 1928 (*Scopaeus*)

(Kol. Rundsch. 14, 11)

Syntypen, Schantung, Jentschoufu, 22. 5. 1912, leg. KREYENBERG, im DEI und in Coll. BERNHAUER.
DEI: 11 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

kreyenberghi BERNHAUER, 1928 (*Trogophloeus*)

(Kol. Rundsch. 14, 8)

Syntypen, Schantung, Jentschoufu, 1911—1912, leg. KREYENBERG, im DEI und in Coll. BERNHAUER.
DEI: 2 Syntypen, Jentschoufu, Schant. 22. 5. 1911—12, leg. KREYENBERG.

küninemanni BENICK, 1975 (*Atheta*)

(Stuttgarter Beitr. Naturk. A Nr. 273, 18)

♀ Holotypus, Hérault, Südfrankreich, aus Sammlung KÜNNEMANN, im DEI.

lacajana BERNHAUER, 1940 (*Atheta*)

(Arb. morph. tax. Ent. 7, 160—161)

Syntypen, Costa Rica, La Caja bei San José, 1930, leg. SCHMIDT, im DEI und in Coll. BERNHAUER.
DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

taceritosus BENICK, 1917 (*Stenus*)

(Ent. Bl. 13, 311—312)

♀ Holotypus, Sumatra, Si-Rambé, 12. 1890 bis 3. 1891, leg. MODIGLIANI, im DEI.

laesicollis MÄKLIN, 1852 (*Omalium*)

(Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 25/2, 322)

Syntypen, Insel Sikkim, leg. PIPPINGSKÖLD, FRANKENHÄUSER & HOLMBERG.
DEI: 1 Syntypus, Sikkim.

laevicollis KRAATZ, 1854 (*Gyrophaena*)

(Stett. Ent. Ztg. 15, 186)

3 Syntypen, Heidelberg, an Baumschwämmen.

DEI: 1 Syntypus, Heidelberg.

laevicollis KRAATZ, 1859 (*Platyprosopus*)

(Arch. Nat. 25, 114)

Syntypen, Nord-Indien, leg. BACON.

DEI: 2 Syntypen, Indien or., leg. BACON. (Etikettierungs- oder Druckfehler?).

laevigata KRAATZ, 1859 (*Myrmedonia*)

(Arch. Nat. 25, 26)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 1 Syntypus, Ind. post., leg. HELFER.

laevigatus FAUVEL, 1895 (*Hesperus*)

(Rev. d'Ent. 14, 259—260)

Syntypen; Birma, Carin Cheba, 900—1100 m, 5.—12., leg. FEA. Pulo-Penang; Malacca; Singapore; Sumatra; Borneo; Java.

DEI: 1 Syntypus, Carin Cheba, 900—1100 m, 5., 12. 1888, leg. FEA.

laevigatus KRAATZ, 1859 (*Lispinus*)

(Arch. Nat. 25, 188)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

laevipennis KRAATZ, 1859 (*Lispinus*)

(Arch. Nat. 25, 185—186)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 15 Syntypen, Ceylon.

laminata KRAATZ, 1859 (*Gyrophaena*)

(Arch. Nat. 25, 45—46)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 4 Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

languida SACHSE, 1852 (*Aleochara*)

(Stett. Ent. Ztg. 13, 117—118)

Holotypus, N. Amerika, Georgia, leg. GERHARDT, im DEI.

lata chinensis BERNHAUER, 1933 (*Aleochara*)

(Wien. Ent. Ztg. 50, 48)

Syntypen; Ostgrenze Thibet's, Tatsienlu; Tatsienlu, Tjiji, Urwald-Rodungen und Giufu-Shan.

DEI: 1 Syntypus, China Szechuan, Tatsienlu, Tjiji, Urwald-Rodung, leg. REITTER; 2 Syntypen, Tatsien-lu, Grenze Thibet Ost, leg. REITTER.

lateritia KRAATZ, 1859 (*Myllaena*)

(Arch. Nat. 25, 50)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 2 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

laticeps FAUVEL, 1895 (*Eleusis*)

(Rev. d'Ent. 14, 190)

Syntypen; Birma, Carin Cheba, 500—1100 m, 5., 12., leg. FEA. Sumatra, tabacs, leg. GROUVELLE; ile Nias, leg. EPPESHEIM.

DEI: 1 Syntypus, Carin Cheba, 500—1000 m, 12. 1887, leg. FEA.

laticolle KRAATZ, 1857 (*Omalium*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 993)

Syntypen, Thüringen, unter faulendem Laub, leg. KELLNER.

DEI: 2 Syntypen, Thüring., leg. KELLNER.

laticollis MÄKLIN, 1853 (*Micropenitus*)

(Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 26/III, 199—200)

Zahlreiche Syntypen, Inneres der Halbinsel Kenai, leg. FRANKENHÄUSER.

DEI: 1 Paralectotypus, Kenai, Am. russ. von NOHEL (im Druck) festgelegt.

laticollis CAMERON, 1925 (*Scopaeus*)

(Treubia 6, 183—184)

3 Syntypen, Java, Tibobas, 1400 m, 8. 1921, leg. DAMMERMAN.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

laticornis KRAATZ, 1856 (*Aleochara*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 88)

Syntypen, Tyrol, leg. KAHR.

DEI: 1 Syntypus, Styria (Fundortverwechslung?), leg. KAHR.

latinus GRIDELLI, 1938 (*Quedius*)

(Bol. Soc. Ent. Ital. 70, 15–16)

Holotypus, Toscana, Lippiano, Arezzo, leg. ANDREINI; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 9 Paratypen, Calabria, Aspromonte, leg. PAGANETTI; 1 Ex., Ponferrada, leg. PAGANETTI; 2 Ex., Mte. Conero, Prov. di Ancona, leg. PAGANETTI; 1 Ex., San Brasilio, Murgien, leg. PAGANETTI; 2 Ex., Monte Gargano, 17. 4. und 7. 5. 1907, leg. HILF; 1 Ex., Lusitania, Evora V., 1910, leg. SCHATZMAYR; 2 Ex., Sicilia, Ficuzza, leg. LEONHARD; 1 Ex., Sicilia.

latiusculus KRAATZ, 1859 (*Oxytelus*)

(Arch. Nat. 25, 178–177)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: ♂ Lectotypus 3♂♂, 2♀♀ Paralectotypen, Ceylon, von HAMMOND festgelegt.

latiusculus niticeps BERNHAUER, 1935 (*Oxytelus*)

(Ent. Nachrichtenbl. Tropau 9, 5)

Syntypen, C. China, Tempelberg, 900 m, Ginyün bei Bébé, leg. REITTER.

DEI: 5 Paralectotypen, mit den Angaben der Beschreibung, von HAMMOND festgelegt.

lativentris WENDELER, 1926 (*Paederus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1926, 200)

Syntypen, Nord Palawan, Philippinen, Binaluan, 11. 1913, leg. BOETTCHER, in Coll. WENDELER.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

lepioides KRAATZ, 1877 (*Arimimetus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 21, 105–106)

Holotypus, Japan, Hagi, leg. HILLER, im DEI.

teleupi FAGEL, 1955 (*Geomimopsis*)

(Explor. Parc nat. Upemba Miss. DE WITTE, fasc. 39, 83)

♂ Holotypus, Congo Belge, Kivu, Terr. Kabare, Nyakasiba, 1900 m, 6. 1951, leg. LELEUP, im Mus. Congo Belge Tervueren; 6♀♀ Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben des Holotypus.

lenensis POPPIUS, 1908–09 (*Athela*)

(Oefv. Finska Vet. Soc. Förh. 51 nr. 4, 39–40)

Mehrere Syntypen; bei Bulkur, auf Tundren der unteren Lena, unter Moos, 6. 9. 1901; Insel Tit-ary, 4. 9. 1901; alle leg. POPPIUS.

DEI: 1 Syntypus, Bulkur, Lena arct., leg. POPPIUS.

leonhardi BREIT, 1912 (*Lathrobium*)

(Ent. Mitt. 1, 200–201)

3 Syntypen, Bulgarien, Tschamkorija, 27. 6. und 13. 7. 1911, leg. HILF.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

leonhardi BERNHAUER, 1908 (*Leptusa*)

(Verh. zool.-bot. Ges. Wien 58, 37–38)

2 Syntypen, Korsika, Gravonetal, Mte. Renoso, 1400–1500 m, 17. 7. 1905, leg. LEONHARD.

DEI: 1 Syntypus, Korsika, Mte. Renoso, 1905, leg. LEONHARD.

leonhardi BERNHAUER, 1905 (*Niphetodes*)

(Verh. zool.-bot. Ges. Wien 55, 588)

2 Syntypen, Bjelašnica-Planina an der Grenze Bosnien und der Herzegowina, hochalpin, aus Graswurzeln.

DEI: 1 Syntypus, Bosnien, Bjelašnica, Gipfelregion, leg. LEONHARD.

leonhardi BERNHAUER, 1912 (*Ocyusa*)

(Ent. Ztschr. Frankfurt a. M. 25, 263–264)

2 Syntypen, auf Kephallenia am Eleutherios-Pass, 1905, leg. LEONHARD; 1 Ex., in Sammlung BERNHAUER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

leonhardi BERNHAUER, 1908 (*Sipalia*)

(Münch. Kol. Ztschr. 3, 325–326)

Mehrere Syntypen, am Mte. Gargano, Mte. S. Angelo, 4. 4. 1907, Cagnano, 13. 4. 1907 und So. Offrizzo, 22. 4. 1907, in Kastanienwäldern.

DEI: 2 Syntypen, Monte Gargano, Mte. St. Angelo, 4. 4. 1907; 1 Syntypus, Monte Gargano, So. Offrizzo, 22. 4. 1907; 1 Syntypus, Monte Gargano, Cagnano, 13. 4. 1907; alle leg. HILF.

leonhardi BERNHAUER, 1914 (*Stenus*)

(Münch. Kol. Ztschr. 4, 2)

Mehrere Syntypen, Sizilien, bei Misilmeri, aus Kastanienlaub, 13. 4. 1906, leg. LEONHARD.

DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

leonhardi BERNHAUER, 1912 (*Zyras*)

(Ent. Bl. 8, 110)

2 Syntypen, Sizilien, Monte Cola, in einer Seehöhe von ca. 800 m, in einer Macchie, 12. 4. 1906, leg. LEONHARD.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

lepidia KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 309–311)

Syntypen, bei Berlin und in Thüringen, in Pilzen.

DEI: 1 Syntypus, Berlin; 1 Syntypus, Schönwalde; 1 Syntypus, Thüringen; 1 Syntypus, Thüringen, leg. KELLNER.

lepidus WEISE, 1875 (*Stenus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 19, 367–368)

Syntypen, Griechenland, leg. KRÜPFER, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Graecia.

letzneri SCHWARZ, 1873 (*Coryphium*)

(Jahres-Ber. Schles. Ges. 1872 (1873), 183–184)

Holotypus, Schlesien, Altvatergebirge, leg. LETZNER, im DEI.

letzneri GERHARDT, 1869 (*Lathrobium*)

(Berl. Ent. Ztschr. 13, 257–258)

Syntypen; Liegnitz; Vorberge der Sudeten; Breslau; Dresden; Magdeburg.

DEI: 10 Syntypen, Liegnitz, leg. LETZNER.

leucocnemis KRAATZ, 1859 (*Metoponcus*)

(Arch. Nat. 25, 107–108)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

leucopus KRAATZ, 1859 (*Pinophilus*)

(Arch. Nat. 25, 158)

Holotypus, Tranquebar, WESTERMANN.

DEI: Holotypus, Tranquebar, DOHRN.

leucopygus KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)

(Arch. Nat. 25, 90—91)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 1 Syntypus, Ostindien.

leuthneri BERNHAUER, 1928 (*Gnypeta*)

(Kol. Rundsch. 14, 14)

Syntypen, Syrien, Beirut, 4. 1885, leg. LEUTHNER, im DEI und in Coll. BERNHAUER.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

limbatum KRAATZ, 1859 (*Cryptobium*)

(Arch. Nat. 25, 121)

Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.

limbatus MÄKLIN, 1852 (*Proteinus*)

(Bull. Soc. Imp. Nat. Moskau 25/II, 323—324)

Syntypen, Insel Sítka, leg. PIPPINGSKÖLD, FRANKENHÄUSER & HOLMBERG.

DEI: 1 Syntypus, Sítka.

lineatus KRAATZ, 1859 (*Scopaeus*)

(Arch. Nat. 25, 130—131)

Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 9 Syntypen, Ceylon; 5 Syntypen, India orient.

linearis KRAATZ, 1859 (*Platyprosopus*)

(Arch. Nat. 25, 115)

Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.

linearis KRAATZ, 1857 (*Thinobius*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 883—884)

Syntypen; Baiern, leg. WALTL; Beaujolais, leg. REY.

DEI: 1 Syntypus, Baiern, leg. WALTL.

lineatocollis KRAATZ, 1859 (*Myrmedonia*)

(Arch. Nat. 25, 26—27)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 1 Syntypus, Ind. post., leg. HELFER.

littorale KRAATZ, 1857 (*Omalium*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 980)

2 Syntypen, Swinemünde, leg. SCHAUER.

DEI: 1 Syntypus, Swinemünde.

littoratus KRAATZ, 1857 (*Anthophagus*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 928—929)

Syntypen, Tirol, leg. KAHR.

DEI: 2 Syntypen, Tirol, leg. KAHR.

longiceps BERNHAUER, 1901 (*Paederus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1901, 247)

Syntypen, Margelan.

DEI: 1 Syntypus, Margelan, Centralasien.

longicornis KRAATZ, 1857 (*Quedius*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands, Abt. 1, 2, 494—495)

Syntypen; 1 Ex., Pommern; Thüringer Wald, leg. KELLNER.

DEI: 1 Syntypus, Thüringia, leg. KELLNER.

longimanus SMETANA, 1965 (*Ocypterus*)

(Reichenbachia 5, 33—34)

♂ Holotypus, 6 Paratypen, Anatolia bor., Kulakkaya bei Giresun, 1450 m, 27. 7. 1963, leg. HEINZ, in Coll. SMETANA; 2 Ex., vom selben Fundort, leg. KORGE; 14 Ex., vom selben Fundort, 25. 5. 64; 2 Ex., Akkus bei Ünye, 1400 m, 28. 5. 1964, leg. KORGE; 1 Ex., Tamdere bei Giresun, 1700 m, 25. 5. 64, leg. KORGE; in den Sammlungen SMETANA und KORGE.

DEI: 1 ♀ Paratypus, Anatolia bor., Kulakkaya bei Giresun, 1450 m, 25. 5. 64, leg. KORGE.

longipennis BERNHAUER, 1908 (*Apocellus*)

(Arch. Nat. 74, 287—288)

Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.

DEI: 2 Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.

longipennis KRAATZ, 1859 (*Micropeplus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 3, 69)

Syntypen, Germania.

DEI: 2 Syntypen, Bonn.

longipennis KRAATZ, 1859 (*Oedichirus*)

(Arch. Nat. 25, 154)

Holotypus, Nord-Indien, leg. BACON.

DEI: Holotypus, India or. (Etikettierungs- oder Druckfehler?).

longulus KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)

(Arch. Nat. 25, 99—100)

Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 8 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; 1 Syntypus, Ostindien.

tugubris KRAATZ, 1856 (*Oxyropa*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 166)

Syntypen, Grafschaft Glatz, in sehr feuchtem Laub und Moos, leg. ZEBE und KRAATZ.

DEI: 1 Syntypus, Schlesien.

tuteipennis KRAATZ, 1859 (*Stilicus*)

(Arch. Nat. 25, 126)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

tuteipennis FENYES, 1914 (*Tachysius*)

(Arch. Nat. 80 A 2, 47)

Holotypus, Formosa, Hoozan, leg. SAUTER, det. Nr. 4399, im DEI; 2 Paratypen, vom selben Fundort.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

lygaea KRAATZ, 1862 (*Aleochara*)

(Berl. Ent. Ztschr. 6, 317)

Syntypen; Rhein, leg. SCRIBA, KRAATZ; Ahrweiler, leg. FUSS.

DEI: 1 Syntypus, Ahrweiler.

macrocerus THOMSON, 1856 (*Homalota*)
 (Öfvers. K. Vet.-Akad. Förh. 1856, 106)

Syntypen, Schweden, Lund.

DEI: 1 Syntypus, Scania, THOMS.

macropterum KRAATZ, 1857 (*Anthobium*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 1015 nota)

Syntypen, Piemont, leg. GHILIANI.

DEI: 1 Syntypus, Piemont.

macropterus WEISE, 1875 (*Platystethus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 19, 368)

Syntypen, Malaga, leg. WEHNCKE, in Coll. WEISE.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀ Paralectotypus, Malaga, leg. WEHNCKE, von HAMMOND festgelegt.

maculiger WEISE, 1875 (*Stenus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 19 (1–2), 367)

Syntypen, Griechenland, leg. LUDY, im DEI.

DEI: 2 Syntypen, Graecia.

maculipennis KRAATZ, 1859 (*Aleochara*)

(Arch. Nat. 25, 17–18)

Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER; 2 Syntypen, Ind. post., leg. HELFER.

maculipennis KRAATZ, 1859 (*Staphylinus*)

(Arch. Nat. 25, 77)

Syntypen, Nord-Indien, leg. BACON.

DEI: 2 Syntypen, India spt., leg. BACON.

maculipennis KRAATZ, 1859 (*Sunius*)

(Arch. Nat. 25, 148)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 2 Syntypen, Ceylon.

märkeli KRAATZ, 1857 (*Mycetoporus*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 457)

Syntypen, Sächsische Schweiz, leg. MÄRKEL.

DEI: 2 Syntypen, Saxonia.

magniceps BERNHAUER, 1927 (*Agerodes*)

(Mem. Soc. Ent. Ital. 5 (1926), 159–160)

Syntypen, Brasilien, S. Catharina, Rio Capivary, 1888, leg. FRUHSTORFER, im DEI und in Coll. BERNHAUER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

major BERNHAUER, 1902 (*Arpedium*)

(Verh. zool. bot. Ges. Wien 52, 702–703)

Syntypen, Griechenland, Veluchi, am Rand von Schneefeldern, leg. APFELBECK.

DEI: 3 Syntypen, Veluchi, leg. APFELBECK.

major KRAATZ, 1857 (*Thinobius*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 883)

Holotypus, Süddeutschland, ohne nähere Fundortangabe, im DEI.

mandibularis KRAATZ, 1859 (*Leptochirus*)

(Arch. Nat. 25, 189–191)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 11 Syntypen, Ceylon.

marginalis KRAATZ, 1857 (*Quedius*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 512)

Syntypen, Freienwalde, leg. CALIX.

DEI: 2 Syntypen, German. b., leg. CALIX.

marginatum MÄKLIN, 1853 (*Olophrum*)

(Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 26/III, 196)

Syntypen; Inneres der Halbinsel Kenai, leg. FRANKENHAEUSER; Halbinsel Kenai, Mündung des Flusses Kaktnu, leg. HOLMBERG.

DEI: 1 Syntypus, Kenai.

marginatus WEISE, 1877 (*Oxytelus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 21, 96–97)

Syntypen, Japan, Jedo, leg. HILLER.

DEI: Lectotypus, Japonia, leg. HILLER, von HAMMOND festgelegt.

marginicollis KRAATZ, 1857 (*Leucoparryphus*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 394 nota)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 5 Syntypen, Ceylon.

marmorellus FAUVEL, 1895 (*Staphylinus*)

(Rev. d'Ent. 14, 253–254)

Syntypen; Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12.; Carin Asciuii Ghéu, 1400–1500 m, 3.–4.; leg. FEA. Sumatra, Ajer Mantcior, 8., leg. BECCARI. Java orient. und occid., monts Tengger et Gedé, 1300 m, leg. FRUHSTORFER.

DEI: 6 Syntypen, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12. 1888, leg. FEA.

maure SACHSE, 1852 (*Aleochara*)

(Stett. Ent. Ztg. 13, 117)

Syntypen, Vorgeb., d. g. Hoffnung.

DEI: 1 Syntypus, Cap. b. Esp.

melanomerus KRAATZ, 1859 (*Pinophilus*)

(Arch. Nat. 25, 160–161)

Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.

melanopus WENDELER, 1942 (*Paederus*)

(Arb. morph. tax. Ent. 9, 102)

♂ Holotypus, Guatemala, leg. CONRADT, im DEI.

melanurus KÜSTER, 1853 (*Sunius*)

(Kaf. Eur. 26, 76)

Syntypen; Spanien bei Carthagena; Dalmatien bei Fort Opus.

DEI: Lectotypus, Carthagena, von ISRAELSON (Commentat. biol. 37, 18–19; 1971) festgelegt.

merditana APPFELBECK, 1907 (*Leptusa*)

(Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien 116 Abt. I, 509—510)

Syntypen, Merdita, Munela- und Zebia-Gebirge, bei Fandi, unter Rotbuchenlaub.

DEI: 3 Syntypen, Merdita, Munela, 1906, leg. WINNEGUTH.

metasternalis EICHELBAUM, 1913 (*Elephromniusa*)

(Arch. Nat. 79 A 3, 156—157)

3 ♂♂, 6 ♀♀ Syntypen, Ost-Afrika, Berg Bonome, 11. & 13. 10. 1903, leg. EICHELBAUM.

DEI: 2 Syntypen, Amani, 10. 1903, leg. EICHELBAUM.

meyeri BERNHAUER, 1928 (*Hesperus*)

(Wien. Ent. Ztg. 45, 119)

Syntypen, Uganda, leg. MEYER, in DEI und in Coll. BERNHAUER.

DEI: 2 Syntypen, Uganda, leg. MEYER.

micans KRAATZ, 1855 (*Oxypoda*)

(Stett. Ent. Ztg. 16, 331)

Holotypus, Griechenland, leg. KIESENWETTER, im DEI.

micans KRAATZ, 1859 (*Oxytelus*)

(Arch. Nat. 25, 175—176)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Ceylon, von HAMMOND festgelegt.

micans KRAATZ, 1857 (*Pelioptera*)

(Linnaea 11, 56)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 9 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

microcerus KRAATZ, 1858 (*Pygostenus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 2, 362; Taf. 3a, b)

Syntypen, Guinea, Goldküste.

DEI: 1 ♀ Syntypus, Guinea.

micros KRAATZ, 1859 (*Scopaeus*)

(Arch. Nat. 25, 132—133)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

milleri KRAATZ, 1862 (*Aleochara*)

(Berl. Ent. Ztschr. 6, 316—317)

Syntypen, Wien, leg. MILLER.

DEI: 1 Syntypus, Wien, leg. MILLER.

minima KRAATZ, 1853 (*Myllaena*)

(Stett. Ent. Ztg. 14, 374)

Syntypen, Bayern.

DEI: 2 Syntypen, Bavar., leg. WALTL.

minimus KRAATZ, 1859 (*Trogophloeus*)

(Arch. Nat. 25, 180—181)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

minuta SACHSE, 1852 (*Oxypoda*)

(Stett. Ent. Ztg. 13, 116—117)

Syntypen, N. Amerika, Georgia, leg. GERHARDT.

DEI: 1 Syntypus, Georgia, leg. GERHARDT.

minutissima KRAATZ, 1859 (*Aleochara*)

(Arch. Nat. 25, 19)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER.

minutum BERNHAUER, 1922 (*Leucocraspedum*)

(Arch. Nat. 88 A 7, 236)

Syntypen, Formosa, Anping, 6. 1911, leg. SAUTER.

DEI: 8 Syntypen, Formosa, Anping, 6. 1911, leg. SAUTER.

mirabilis KRAATZ, 1899 (*Phocasoma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1899, 363—364)

Holotypus, Kamerun, Johann Albrechts-Höhe, leg. CONRADT, im DEI.

misella KRAATZ, 1856 (*Oxypoda*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 190)

Syntypen, bei Berlin, unter feuchtem Laub, leg. KRAATZ.

DEI: 1 Syntypus, Berlin.

modestus KRAATZ, 1857 (*Quedius*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 509—510)

Syntypen, 1 Ex. Schlesien; einige Ex. aus Norddeutschland.

DEI: 1 Syntypus, Silesia.

molochinus dalmatinus KORGE, 1960 (*Quedius*)

(Mitt. dtsch. ent. Ges. 19, 68—69)

♂ Holotypus, Castelnuovo, Dalmatia, 1910, leg. HILF, im DEI.

monachorum BERNHAUER, 1912 (*Leptusa*)

(Ent. Ztschr. Frankfurt a.M. 25, 263)

Einige Syntypen, Makedonien, Berg Athos, leg. SCHATZMAYER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

montana KRAATZ, 1856 (*Oxypoda*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Col. 2, 187)

Syntypen,, „in gebirgigen Theilen Oesterreichs“.

DEI: 1 Syntypus, „alpe“.

montenegrinus PUTZH, 1972 (*Stenus*)

(Wiss. Mitt. Bosn.-herz. Landesmus. 1 (1971) Nat., 272—273)

♂ Holotypus, 2 ♀♀ Paratypus, Montenegro, Ubli, 1903, leg. LEONHARD, im DEI (auf den Etiketten ist Ubli noch unter der Landesbezeichnung „Herzegovina“ eingetragen).

DEI: 3 Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Herzegovina, Ubli, 1903, leg. LEONHARD.

monticola CAMERON, 1924 (*Ancyrophorus*)

(Trans. Ent. Soc. London 1924, 174—175)

Syntypen, Indien, Simla Hills, Gahan, 7000 Fuß.

DEI: 2 Syntypen, Gahan, 7000 Fuß, Simla Hills, 9. 1921, leg. CAMERON.

monticola CAMERON, 1924 (*Lathrimaeum*)

(Trans. Ent. Soc. London 1924, 169–170)

Syntypen, Indien, Chakrata und Simla Distrikt, 7000–9000 Fuß.

DEI: 1 Syntypus, Gahan, Simla Hills, 7000 Fuß, 9. 1921, leg. CAMERON.

monticola CAMERON, 1930 (*Phyllodrepa*)

(Fauna Brit. Ind. Col. Staph. 1, 137)

Syntypen, Indien, Chakrata district, Bodyar, 8300 Fuß, leg. CAMERON.

DEI: 1 Syntypus, Chakrata Dist., Bodyar, 8300 Fuß, 3.–12. 5. 1922, leg. CAMERON.

moratus L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Espeson*)

(Ann. Soc. Ent. France VI. 2, 45)

Syntypen, St. Thomas.

DEI: 2 Syntypen, S. Thomas.

morstatti SCHEERPELTZ, 1956 (*Eleusis*)

(Rev. Zool. Bot. Afr. 53, 492)

Holotypus, Paratypen, Kamerun, Franz. Kongo, im DEI.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Kamerun, Victoria Co., 10. 1929.

mortuorum BERNHAUER, 1922 (*Osorius*)

(Arch. Nat. 88 A 7, 226–227)

Syntypen, Formosa, Suisharyo, leg. SAUTER.

DEI: 3 Syntypen, Formosa, Suisharyo, 10. 1911, leg. SAUTER.

mucronata KRAATZ, 1859 (*Homalota*)

(Arch. Nat. 25, 29–30)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 6 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

müllerii BERNHAUER, 1927 (*Holotrochus*)

(Ent. Mitt. 16, 123)

Syntypen, Afrika, Lagos, im DEI und Coll. BERNHAUER.

DEI: 11 Syntypen, Lagos.

munelensis APFELBECK, 1907 (*Leptusa*)

(Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien 116 Abt. 1, 508–509)

Syntypen, Albanien, Merdita, Munela-Berge bei Fandi, unter Eichenlaub.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Merdita, Munela.

mustela ROTTENBERG, 1870 (*Myrmecodia*)

(Berl. Ent. Ztschr. 14, 25–26)

3 Syntypen, Sizilien, Catania, am Fuß eines Baumes, in Gesellschaft von Ameisen, 26. 2.–5. 4. 1869, leg. ROTTENBERG.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundangaben.

mutator FAUVEL, 1895 (*Cryptobium*)

(Rev. d'Ent. 14, 236–237)

Syntypen; Birma, Carin Ghècu, 1300–1400 m, 2.–3.; Carin Asciuii Ghècu, 1400–1500 m, 3.–4.; Tienzo, 5.; Tenasserim, Meetan, 4.; alle leg. FEA.

DEI: 2 Syntypen, Carin Asciuii Ghècu, 1400–1500 m, 3.–4. 88, leg. FEA; 1 Syntypus, Teinzo, Birmania, 5. 1886, leg. FEA.

myagrus ROTTENBERG, 1870 (*Quedius*)

(Berl. Ent. Ztschr. 14, 29–30)

Syntypen; Sizilien, Syracuse, 6.–21. 4. 1869 und Nicolosi, 9.–13. 5. 1869; Rom; alle leg. ROTTENBERG.

DEI: 2 Syntypen, Nicolosi; 2 Syntypen, Syracuse; 4 Syntypen, Rom; alle leg. ROTTENBERG.

mycetophaga KRAATZ, 1856 (*Aleochara*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 102–103)

Syntypen; Grafschaft Glatz, leg. ZEBE und KRAATZ, aus Gichtpilz; Frankreich, leg. AUBÉ.

DEI: 1 Syntypus, Gall., leg. AUBÉ.

myops KIESENWETTER, 1850 (*Homalota*)

(Stett. Ent. Ztg. 11, 219)

Syntypen, Pyrenaei orientales.

DEI: 1 Syntypus, Pyren.

myrmecobia KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 285)

Syntypen, Sachsen, Schlesien, in Gesellschaft von *Formica rufa*.

DEI: 3 Syntypen, Silesia.

myrmecoccephalum LEA, 1904 (*Cryptobium*)

(Proc. Linn. Soc. N.S.W. 29, 71–72; Taf. 4, Fig. 3)

Syntypen, Australien, N.S.W., Clarence River.

DEI: 1 Syntypus, N.–S. Wales.

nalandensis BERNHAUER, 1902 (*Belonuchus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1902, 30)

2 Syntypen, Ceylon, Nalanda, leg. HORN, in Coll. BERNHAUER.

DEI: 1 Syntypus, Nalanda, 1899, leg. HORN.

nana KRAATZ, 1859 (*Homalota*)

(Arch. Nat. 25, 36)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

nevermanni REICHENSPERGER, 1935 (*Ecitonomorpha*)

(Arb. morph. tax. Ent. 2, 211–212)

Holotypus, zahlreiche Paratypen, Costa Rica, Hamburg-Farm, Ebene Limon, bei *Eciton burchelli*, 7.–12. 1933, 1934, leg. NEVERMANN. Holotypus in Coll. REICHENSPERGER, Paratype, im DEI.

DEI: 1 Paratype, Costa Rica, Hamburg Farm, Reventazon, Ebene Limon, 31. 10. 1934, leg. NEVERMANN.

nevermanni BENICK, 1938 (*Stenus*)

(Mitt. Münch. Ent. Ges. 28, 277)

Syntypen; Costa Rica, Hamburgfarm, Reventazon, Ebene Limon, von 1922–1934; Lasmerce des Santa Clara, 300–400 m, 15. 11. 1922; Peralta, 400 m, 26. 1. 33, an *Heliconia*-Blatt, leg. NEVERMANN. (Genaue Beschreibung und Typenfestlegung in Mitt. Münch. Ent. Ges. 29, 623–626).

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Costa Rica, Lasmercedes, 200–300 m, 15. 6. 1922; 2 Syntypen, Costa Rica, Hamburgfarm, Reventazon, Ebene Limon, 28. 1. & 22. 8. 1933, leg. NEVERMANN.

nietneri KRAATZ, 1857 (*Myrmecodia*)

(Linnaea 11, 52–53)

Syntypen, Ceylon, Termitenbügel bei Negombo, 1855, leg. NIETNER.

DEI: 8 Syntypen, Ceylon, Negombo, leg. NIETNER.

niger CAMERON, 1925 (*Astilbus*)
(Treubia 6, 194)

16 Syntypen, Pangrango, 2400 m, 8. 1921, leg. DAMMERMAN.

DEI: 6 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1 Ex., als Typus von CAMERON ausgezeichnet.

niger KRAATZ, 1858 (*Glyphesthus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 2, 365—366, Taf. 3e)

Syntypen, Senegambia, leg. BOCANDE.

DEI: 1 Syntypus, Sénégál.

niger KRAATZ, 1868 (*Heterothops*)
(Berl. Ent. Ztschr. 12, 352)

Holotypus, Thüringen, unter feuchtem Laub, leg. KELLNER, im DEI.

niger BERNHAUER, 1906 (*Styngetus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1906, 197—198)

Syntypen; Brasilien, Espírito Santo; Brasilien, ohne nähere Angaben; Paraguay, leg. DRAKE.

DEI: 1 Syntypus, Paraguay, leg. DRAKE; 2 Syntypen, Espírito-Santo, Brasil; 2 Syntypen, Brasil.

nigerrima KRAATZ, 1856 (*Aleochara*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 104 nota)

Syntypen, Spanien, leg. HANDSCHUCH.

DEI: 1 Syntypus, Spanien, leg. HANDSCHUCH.

nigerrima KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)

(Arch. Nat. 25, 141—142)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 4 Syntypen, Ceylon.

nigerrimus KRAATZ, 1859 (*Xantholinus*)

(Arch. Nat. 25, 103—104)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 3 Syntypen, Ostindien.

nigra KRAATZ, 1859 (*Aleochara*)

(Arch. Nat. 25, 13—14)

Syntypen, Insel Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

nigra CAMERON, 1925 (*Amaurodera*)

(Treubia 6, 191—192)

Holotypus, Tjibodas, 1500 m, 8. 7. 1920, leg. DAMMERMAN; Tobameer, Sumatra, 3. 1922, leg. DAMMERMAN. Die Typenserie besteht aus 9 Ex., aus der Beschreibung ist nicht ersichtlich, wieviel Exemplare von den beiden Fundorten vorlagen.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Tjibodas, 1500 m, 8. 7. 1920, leg. DAMMERMAN.

nigra KRAATZ, 1859 (*Gyrophaena*)

(Arch. Nat. 25, 49)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 9 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

nigra KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 287—288)

Syntypen, Deutschland, ohne nähere Fundortangabe.

DEI: 5 Syntypen, Berlin; 1 Syntypus, Barmen; 1 Syntypus, Misdroy.

nigra KRAATZ, 1858 (*Lesteva*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 934 nota)

Holotypus, Sizilien, leg. GROHMANN, im DEI.

nigriceps KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)

(Arch. Nat. 25, 139)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 6 Syntypen, Ceylon.

nigriceps KRAATZ, 1859 (*Myrmecodia*)

(Arch. Nat. 25, 22)

♀ Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: Holotypus, Ind. post., leg. HELFER.

nigriceps KRAATZ, 1859 (*Oxytelus*)

(Arch. Nat. 25, 171—172)

Syntypen; Ost-Indien, leg. HELFER; Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: ♂ Holotypus, 1 Paralectotypus, India or; 5 Paralectotypen, Ceylon, von HAMMOND festgelegt.

nigriceps KRAATZ, 1857 (*Quedius*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 510—511)

Syntypen, Crefeld, leg. MINK.

DEI: 3 Syntypen, Germ., Crefeld.

nigripennis BERNHAUER, 1936 (*Oxytelus*)

(Phil. Journ. Sci. 61, 82)

Syntypen; Luzon, Los Baños; Mindanao, Surigao und Momungan.

DEI: 2 Paralectotypen, Momungan, Mindanao, von HAMMOND festgelegt.

nigroaeonus KRAATZ, 1859 (*Mitolomorphus*)

(Arch. Nat. 25, 106—107)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

nitens KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)

(Arch. Nat. 25, 82)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 2 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

nitida PETRI, 1891 (*Lithocharis*)

(Verh. u. Mittg. Siebenbürg. Ver. Nat. Hermannstadt 41, 14—15)

5 Syntypen, Siebenbürgen, Schässburg, unter Blättern am Waldrande, 15., 19. 3., leg. PETRI.

DEI: 2 Syntypen, Siebenbürgen.

nitidula KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 211—212)

Zahlreiche Syntypen; aus ganz Deutschland; Berlin, unter feuchtem Laub und Moos.

DEI: 3 Syntypen, Berlin; 1 Syntypus, Bonn; 2 Syntypen, Rauden; 1 Syntypus, Darmstadt, Klingeth?.

nitidula KRAATZ, 1859 (*Myllaena*)

(Arch. Nat. 25, 50)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 6 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

nitidulus KRAATZ, 1857 (*Megarthurus*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 1028–1029)

Syntypen; Schlesien, Grafschaft Glatz, leg. ZEBE; Cassel, leg. RIEHL.

DEI: 1 Syntypus, Mollenfelde, leg. RIEHL.

nitouensis SCHEERPELTZ, 1962 (*Atheta*)

(Beitr. Ent. 12, 600–601)

♀ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Nitou Tatsienlu, Szechuan, China, leg. REITTER. Holotypus, im DEI, 1 ♀ Paratypus, in Coll. SCHEERPELTZ.

DEI: ♀ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

nitouensis BERNHAUER, 1935 (*Oxytelus*)

(Ent. Nachrichtenbl. Tropau 9, 4)

Syntypen; China, Szechuan, Nitou Tatsienlu; Ginyün b. Bébé, Tempelberg, 900 m.

DEI: 1 Paralectotypus, Nitou Tatsienlu, Szechuan, China, leg. REITTER, von HAMMOND festgelegt.

nodipes PUTHZ, 1972 (*Stenus*)

(Wiss. Mitt. Bosn.-herz. Landesmus. 1 (1971) Nat., 250–251, Fig. 3)

♂ Holotypus, Bulgarien, Sofia, Sv. Ivan, 5. 8. 08, leg. RAMBOUSEK; 1 ♀ Paratypus, Sofia, leg. APFELBECK; 2 ♂♂, 3 ♀♀, Samokov, 1911, leg. HILF.; 1 ♂, Jugoslawien, Strumica, 19. 5. 1937, leg. LIEBMANN, im DEI.

DEI: 1 ♂, 2 ♀♀ Paratypen, Bulg. Samokov, 1911, leg. HILF.

notabilis KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)

(Arch. Nat. 25, 79–80)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 3 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; 1 Syntypus, Ostindien.

novoteutonicus WENDELER, 1956 (*Hesperus*)

(Dusenia 7, 232)

Holotypus, Paratyphen, Brasilien, Nova Teutonia, aus faulendem Laub von *Phytolocca doica* L. gesiebt, leg. PLAUMANN, in den Sammlungen FRANCKE und WENDELER.

DEI: 1 Paratypus, Brasilien, Nova Teutonia, leg. PLAUMANN.

novoteutonicus WENDELER, 1955 (*Lispinus*)

(Dusenia 6, 191)

Syntypen, Brasilien, Nova Teutonia, in den Sammlungen FRANCKE und WENDELER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

nubigena KIESENWETTER, 1861 (*Leptusa*)

(Berl. Ent. Ztschr. 5, 375)

Syntypen, Schweiz, Monte Moro.

DEI: 2 Syntypen, M. Moro.

oberbergeri RAMBOUSEK, 1928 (*Lathrobium*)

(Časopis 25, 32, Fig. 5)

Mehrere Syntypen, Montenegro, Maglič, 9. 1913, leg. OBENBERGER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

obliquestriatus BERNHAUER, 1920 (*Megalops*)

(Neue Beitr. syst. Insektk. 2, 11)

Syntypen, Caracas.

DEI: 1 ♀ Syntypus, Caracas.

obscure BERNHAUER, 1901 (*Eleusis*)

(Dtch. Ent. Ztschr. 1901, 172)

Syntypen, Madagaskar, Port Daufin.

DEI: 1 Syntypus, Madagaskar, Port Daufin, Plason.

obscure KRAATZ, 1857 (*Oxypoda*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 1057)

Syntypen, Thüringer Wald, bei Georgenthal, an Sumpfstelle, leg. KELLNER.

DEI: 2 Syntypen, Thüringen, leg. KELLNER.

obscuricornis BENICK, 1949 (*Stenus*)

(Rev. d'Ent. 20, 562–564, Fig. 3)

Syntypen, Brasilien: 1 Ex., Mae d'agua, am Rio Pajehú, vom Grase (Nun. Floresta, Staat Pernambuco), 2. 9. 1937; einige Ex., Rio São Francisco bei Belém (actual Jatiná), am Ufer vom Grase (Mun. Belém, actual Jatiná, Staat Pernambuco), 3. 9. 1937; einige Ex., vom selben Fundort, auf einer kleinen Insel im Rio São Francisco, von Gebüsch und Gras, 3. 9. 1937; zahlreiche Ex., Barra da Boa Vista (actual Coripós), am eintrocknenden Uferstrand eines Nebenarmes des Rio São Francisco (Mun. Boa Vista, actual Coripós, Staat Pernambuco), 8. 9. 1937; Acude Quixabá, am von Viehritten durchfurchten Uferrand (Mun. Ouricuri, Staat Pernambuco), 16. 11. 1937; alle leg. SCHUBART.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Pernambuco, Boa Vista, 8. 9. 1937, leg. SCHUBART.

obscurum KRAATZ, 1859 (*Omalium*)

(Arch. Nat. 25, 181–182)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 12 Syntypen, Ceylon.

obscurus SOLIER, 1849 (*Physognathus*)

(In: GAY, Historia física y política de Chile Zoología 4, 304)

Syntypen, Valdivia.

DEI: 1 Syntypus, Chili, Valdivia.

ocellata BENICK, 1937 (*Megalopsidia*)

(Arb. morph. tax. Ent. 4, 81–82)

Holotypus, Costa Rica, La Caja, 8 km w. San José, leg. SCHMIDT, im DEI.

ochracea KRAATZ, 1857 (*Hoplandria*)

(Linnaea 11, 6–7)

Syntypen, Georgia, leg. GERHARD.

DEI: 4 Syntypen, Georgia, GERHARD.

ochraceus KRAATZ, 1859 (*Sclerochiton*)

(Arch. Nat. 25, 134)

Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.

oreatus PUTHZ, 1970 (*Stenus*)

(Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg. 46 (18). 11–13, Abb. 11)

♂ Holotypus, 4 ♂♂, 3 ♀♀ Paratypen, Indien, Arni Gad, Mussoorie, 16. 10. 1921, leg. CAMERON; Holotypus, Paratypen, im British Mus.; Paratypen im DEI, in Coll. BENICK und PUTHZ.

DEI: 1 ♂ Paratypus, Arni Gad., Mussoorie, 16. 11. 1920, leg. CAMERON.

ocularis FENYES, 1914 (*Astibulus*?)

(Arch. Nat. 80 A 2, 50–51)

Holotypus, Formosa, Kankau (Koshun), leg. SAUTER, det. Nr. 4376, im DEI.

oculorum BENICK, 1943 (*Atheta*)

(Ent. Bl. 39, 67–68)

♀ Holotypus, Gad pecina, Volujak, O. LEONHARD, im DEI.

oedypus ROTTENBERG, 1870 (*Oedichirus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 14, 34–35)

2 Syntypen, Sizilien, Piano di Catania, am Fuß von Weißpappeln, 26. 2.–5. 4. 1869, leg. ROTTENBERG.
DEI: 1 Syntypus, Catania, leg. ROTTENBERG.

oertzeni EPPELSHHEIM, 1888 (*Homalota*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 32, 405–406)

Syntypen, Griechenland, Attika und Parnass.

DEI: 4 Syntypen, Griechenland, Insel Ingistri, leg. v. OERTZEN.

opaca FENYES, 1914 (*Homalota*?)

(Arch. Nat. 86 A 2, 46)

♀ ? Holotypus, Formosa, Taihorin, leg. SAUTER, det. Nr. 4392, im DEI; 1 Paratypus, vom selben Fundort.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

opaca KRAATZ, 1857 (*Peltioplera*)

(Linnaea 11, 56)

Syntypen, Ceylon, in Termiten- und Ameisennestern, leg. NIETNER.

DEI: 8 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

opacicollis KRAATZ, 1859 (*Falagria*)

(Arch. Nat. 25, 4)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER.

opacus KRAATZ, 1857 (*Oxytelus*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 851–852)

1 ♂, 2 ♀ Syntypen, Wien, leg. VON FERRARI.

DEI: 3 Lectotypus, 2 ♀ Paralectotypen, Austr., leg. FERRARI, von HAMMOND festgelegt.

opacus CAMERON, 1924 (*Phloeonomus*)

(Trans. Ent. Soc. London 1924, 168)

Syntypen, Indien, Chakrata District; Simla Hills, 7000–8000 Fuß.

DEI: 1 Syntypus, Gahan, Simla Hills, 7000 Fuß, 9. 1921, leg. CAMERON.

oppidana KRAATZ, 1857 (*Lithocharis*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 711–712)

Mehrere Syntypen, Berlin, Garten von Monbijou, unter feuchtem Laub, leg. MAYER und CALIX.

DEI: 1 Syntypus, Berlin, leg. CALIX; 1 Syntypus, Berlin, leg. MAYER; 1 Syntypus, Umgeb. Berlin.

oraria KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 209–210 nota)

Syntypen, Ufer des Mittelmeeres.

DEI: 1 Syntypus, Mare mediterr.

orbis KIESENWETTER, 1850 (*Philonthus*)

(Stett. Ent. Ztg. 11, 220)

Syntypen, Perpiniacum, Gerona.

DEI: 2 Syntypen, Perpignan.

oxyctycea KOCH, 1934 (*Schatzmayrina*)

(Bull. Soc. Roy. Ent. Egypte 18, 69–70)

Syntypen, Ägypten, Pyramiden von Ghizeh, 29. 7. 1933; Sykkorah, 15. und 23. 9. 1933; 1 Ex., im Feld unter einem Stein; mehrere Ex., aus Ufererde des Nils geschwemmt.

DEI: 1 Syntypus, Cairo, Pyramidi, 29. 7. 33, leg. WITTMER.

oxypodooides BRUNDIN, 1952 (*Atheta*)

(Ent. Tidskr. 73, 106–108, Fig. 13–15)

♂ Holotypus, 6 Paratypen, Marokko, leg. ROLPH, im DEI; 3 Paratypen, Oran, Tlemcen, im DEI.

DEI: Holotypus, 6 Paratypen, Marocco, leg. ROLPH; 3 Paratypen, Tlemcen, Oran.

padana WEISE, 1878 (*Homalota*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 22, 38–39 nota)

Syntypen, Monte Viso, leg. THIEME.

DEI: 1 ♂ Syntypus, M. Viso, leg. THIEME.

paganetti BERNHAUER, 1909 (*Atheta*)

(Ent. Bl. 5, 200–201)

Syntypen, Mittelitalien, Mte. Pagano, leg. HUMMLER PAGANETTI.

DEI: 1 Syntypus, Mte. Pagano, leg. PAGANETTI.

palawanensis WENDELER, 1928 (*Priochirus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1928, 120)

Syntypen, Palawan, Binaluan, 11. 1913, leg. BOETTCHER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

pallidulus KRAATZ, 1859 (*Scopaeus*)

(Arch. Nat. 25, 131)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

palliolatus KRAATZ, 1857 (*Tachinus*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 408–409)

Syntypen; Seligenstadt, leg. SCRIBA; Frankfurt a.M., leg. HAAG.

DEI: 3 Lectotypus, Germ.mer., hiermit festgelegt.

pallipes KRAATZ, 1859 (*Pinophilus*)

(Arch. Nat. 25, 156–157)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 3 Syntypen, Ceylon.

patudatum KRAATZ, 1858 (*Calodera*)

(Berl. Ent. Ztschr. 2, 50–51)

Syntypen, auf Sumpfwiesen in Nauplia, leg. v. KIESENWETTER.

DEI: 1 Syntypus, Graecia, Nauplia, leg. v. KIESENWETTER.

pangrangoensis CAMERON, 1925 (*Atheta*)

(Treubia 6, 192)

4 Syntypen, Pangrango, 300 m.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Pangrango, 300 m, 8. 1921.

pangrangoensis CAMERON, 1925 (*Stenus*)
(Treubia 6, 179)

11 Syntypen, Pangrango, 3000 m. 8. 1921, 5. 1922, leg. DAMMERMAN.

DEI: 3 Syntypen, Pangrango, 1 Ex., 5. 1922, 2 Ex., 8. 1921, leg. DAMMERMAN.

papuana CAMERON, 1924 (*Aleochara*)
(Nova Guinea Zool. 15, 1, 87)

5 Syntypen, Neu Guinea, Doormanpadbivak, 1410 m, 10. 1920.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

papuanus CAMERON, 1931 (*Philonthus*)
(Rec. South Austr. Mus. 4, 362)

Syntypen, Neu Guinea, Mount Lamington, leg. MC.NAMARA.

DEI: 1 Syntypus, Papua.

papuanus CAMERON, 1924 (*Priochirus*)
(Nova Guinea Zool. 15, 1, 84, 86)

24 Syntypen, Neu Guinea, Doormanpadbivak; Mamberano Riv.

DEI: 4 Syntypen, N. Guinea, Dormanpadbivak, 1410 m, 10. 1920, leg. VAN HEURN; 2 Syntypen, N. Guinea, Mamberamo Riv., Pionerbivak, 1 Ex., 1920, 1 Ex., 1. 1921, leg. VAN HEURN.

paraguayanus WENDELER, 1942 (*Paeaderus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 9, 102–103)

♂ Holotypus, Paraguay, im DEI.

parapicipennis BRUNDIN, 1954 (*Atheta*)
(Ark. Zool. (N. F.) 5, 386, Fig. 34, 35)

♂ Holotypus, 2 ♂♂ Paratypen, Schweden, Jämtland, Gem. Undersåker, Hottöfjället, 7. 9. 1938, in Elchmist in der oberen Waldregion, leg. BRUNDIN, in Coll. BRUNDIN; 1 ♂, Nordnorwegen, Målselvgebiet, Framnes, leg. STRAND; 1 ♂, Lakselv in Porsanger, leg. STRAND, in Coll. STRAND; Transsylvania, 1887, leg. BRENSKE, im DEI.

DEI: 1 Paratypus, Transsylvania, 1887, leg. BRENSKE.

parva KRAATZ, 1859 (*Falagria*)
(Arch. Nat. 25, 6–7)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 3 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

parva KRAATZ, 1862 (*Oligota*)

(Berl. Ent. Ztschr. 6, 300; nom. nov. pro *pygmaea* KRAATZ, 1858, Berl. Ent. Ztschr. 2, 352)

Syntypen, Rouen.

DEI: Lectotypus, Nevires de Rouen, leg. AUBÉ, von WILLIAMS 1972 (Ent. monthly Mag. 108, 20) festgelegt.

parviceps KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)

(Arch. Nat. 25, 86–87)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 6 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

parvicollis KRAATZ, 1859 (*Myllaena*)

(Berl. Ent. Ztschr. 3, 15–16)

Holotypus, Chile, leg. DEUROLLE, im DEI.

parvipennis BERNHAUER, 1908 (*Apocellus*)

(Arch. Nat. 74, 288)

Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.

DEI: 2 Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.

parcipennis BERNHAUER, 1922 (*Astenus*)

(Arch. Nat. 88 A 7, 229–230)

Syntypen, Formosa, Takao, leg. SAUTER.

DEI: 1 Syntypus, Takao, Formosa, 12. 1907, leg. SAUTER.

parvipennis WENDELER, 1956 (*Medon*)

(Dusenia 7, 224)

Holotypus, Paratypen, Brasilien, Nova Teutonia, leg. PLAUMANN.

DEI: 1 Paratypus, Brasilien, Nova Teutonia, 27°11' B, 52°23' L, 300–500 m, leg. PLAUMAN.

parvula BRISOUT, 1868 (*Oxyoda*)

(In: GRENIER, A., Catalogue des Coléoptères de France, 20–21)

Syntypen, Collioure, leg. DELAROUZÉE.

DEI: 2 Syntypen, Collioure.

parvulus KRAATZ, 1860 (*Diochus*)

(Wien. ent. Monatsschr. 4, 27)

Holotypus, Bahia, im DEI.

petiomerus KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)

(Arch. Nat. 25, 82–88)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

petioptera KRAATZ, 1859 (*Homalota*)

(Arch. Nat. 25, 30)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 2 Syntypen, Ind. post., leg. HELFER.

peitata ERICHSON, 1840 (*Aleochara*)

(Genera et Species Staphylinorum, 172)

Syntypen, Mexico.

DEI: 1 Syntypus, Mexico.

pendleburyi CAMERON, 1933 (*Paroxypodinus*)

(Journ. Fed. Malay States Mus. 17, 351–352)

130 Syntypen, Brit. N. Borneo, Mount Kinabalu, Kamborangah, 7200 Fuß, 28. 3. 29, 4. 4. 29, leg. PENDLEBURY.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

pensylvanicus KRAATZ, 1857 (*Philotermes*)

(Linnaea 11, 15)

Syntypen, Pensylvanien, leg. SCHAUM.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.

peraffinis FAUVEL, 1895 (*Stenus*)

(Rev. d'Ent. 14, 209–210)

Syntypen, Birma, Carin Asciuli Ghéou, 1400–1500 m, 3.–4., leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

peratus CAMERON, 1930 (*Stenus*)

(Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 344 - 345, Fig. 80)

Syntypen, Simla Hills, Chakrata district; Konain; Kanasar, alt. 7000 - 8000 Fuß.

DEI: 1 Syntypus, Chakrata Distr., Konain, 8000', 24. - 30. 5. 1922, leg. CAMERON.

percisa ERICHSON, 1840 (*Falagria*)

(Genera et Species Staphylinorum, 52)

Syntypen, Brasilien, in Coll. GERMAR.

DEI: 1 Syntypus, Bras. L.

peregrina KRAATZ, 1859 (*Homalota*)

(Arch. Nat. 25, 39 - 40)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 6 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

pervagata BENICK, 1975 (*Atheta*)

(Stuttgarter Beitr. Naturk. A Nr. 273, 16 - 17)

♀ Holotypus, Vöslau, Austria; 1 ♀ Paratypus, Deutschland, Höxter Weserbergland, 8. 8. 56; in Coll. BENICK; 1 ♂ Paratypus, Mte. Gargano, 9. 5. 1907, leg. HILF.

DEI: 1 ♂ Paratypus, Monte Gargano, 6., 7. 5. 1907, leg. HILF.

peusi WAGNER, 1949 (*Aleochara*)

(Kol. Ztschr. (Horion) 1, 18 - 29, Fig. 2, 6, 10, 13)

Einige Ex., Schönefeld, Teltov-Plateau, in Hamsterbauen, 19. 8. 1947, leg. WAGNER; Köthen (Anhalt), in Hamsterbauen, 1921, leg. HEIDENREICH; 2 Ex., Thale im Harz, in Hamsterbau, leg. FEHSE; 1 Ex., Leipzig, coll. HORION. Holotypus, Paratypen in der Märkischen Coleopteren Sammlung der Naturschutzzstelle des Magistrats Berlin. Paratypen, in den Sammlungen WAGNER, HEIDENREICH und HORION.

DEI: 1 Paratypus, Mark, Umgebung Schönefeld.

philippine BERNHAUER, 1914 (*Eleusis*)

(Verh. zool. bot. Ges. Wien 64, 76 - 77)

Syntypen, Philippinen. Los Banos, leg. BAKER.

DEI: 1 Syntypus, Los Banos, leg. BAKER.

picea KRAATZ, 1858 (*Lithocaris*)

(Bull. Soc. Ent. France III, 6, CXCI - CXCII)

Syntypen, Umgeb. Paris.

DEI: 4 Syntypen, Paris.

pictinus BERNHAUER, 1901 (*Medon*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1901, 245)

Zahlreiche Syntypen, Margelan und Turkestan, Aulie Ata.

DEI: 1 Syntypus, Margelan, REITTER.

picipes CAMERON, 1928 (*Masuria*)

(Ent. Monthly Mag. 64, 52)

Syntypen, Indien, Chakrata district, Sainj Khud, 6500 Fuß.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

picticornis KRAATZ, 1859 (*Pinophilus*)

(Arch. Nat. 25, 158 - 159)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 2 Syntypen, Ceylon.

pictipenne KRAATZ, 1859 (*Conosoma*)

(Arch. Nat. 25, 63)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 2 Syntypen, Ceylon.

pilosa KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 241 - 242)

Syntypen, Schlesien; südliches Deutschland.

DEI: 6 Syntypen, Silesia.

pilosus KRAATZ, 1857 (*Philotermes*)

(Linnaea 11, 14)

2 Syntypen, N. Amerika, Tennessee, in Termitennestern, leg. FUCHS.

DEI: 1 Syntypus, Tennessee, MÄRKEL.

pitus SCHUBERT, 1911 (*Stenus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1911, 7 - 8)

Syntypen, D.O.Afrika, Kenia, 2000 m, leg. V. VARENDORFF.

DEI: 2 ♀♀ Paraclectotypen, Kenia, 2000 m, VARENDORFF, von PUTHZ (Ent. Abh. Mus. Tiere. Dresden 31, 548; 1965) festgelegt.

pisciformis KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 317 - 318)

Syntypen, Norddeutschland, ohne nähere Fundortangaben.

DEI: 1 Syntypus, Misdro.

plagiatus FAUVEL, 1895 (*Conurus*)

(Rev. d'Ent. 14, 282 - 283)

Syntypen, Birma, Carin Asciuii Ghécu, 1400 - 1500 m, 3. - 4., leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

plane KRAATZ, 1859 (*Lithocaris*)

(Arch. Nat. 25, 136 - 137)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELPER.

DEI: 2 Syntypen, India oriental.

planaticollis KRAATZ, 1857 (*Myrmecodia*)

(Linnaea 11, 51 - 52)

Syntypen, Ceylon, Umgeb. von Negambo, 1855, leg. NIETNER.

DEI: 3 Syntypen, Ceylon, Negambo, leg. NIETNER.

planicollis BERNHAUER, 1902 (*Trogophloeus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1902, 45)

3 Syntypen, Ceylon, Anuradhapura, leg. HORN, in Coll. BERNHAUER.

DEI: 2 Syntypen, Ceylon, Anuradhapura, 1899, leg. HORN.

planifrons robustus BENICK, 1914 (*Stenus*)

(Ent. Mitt. 3, 151 - 152)

Syntypen, Syrien, 1 ♀, Kaifa, 1 ♀, Bairut, im DEI, leg. LEUTHNER.

DEI: 1 Syntypus, Beirut, Syrien, 4. 85, leg. LEUTHNER.

planipenne MÄKLIN, 1853 (*Omalium*)
(Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 26 (2), 198)

Syntypen, Insel Sitkha, leg. HOLMBERG und COLLAN; Halbinsel Kenai, leg. FRANKENHÄUSER.

DEI: 1 Syntypus, Sitkha.

planipennia BIERIG, 1933 (*Stilomedon*)
(Rev. d'Ent. 3, 489–491)

Holotypus, Paratypus, Costa Rica, La Caja, 1931, leg. SCHMIDT; Holotypus im DEI, Paratypus in Coll. BIERIG.

DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

planiusculus KRAATZ, 1859 (*Scopaeus*)
(Arch. Nat. 25, 132)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELPER.

DEI: 2 Syntypen, India orient.

platygaster KRAATZ, 1859 (*Homalota*)
(Arch. Nat. 25, 33)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

plaumanni REICHENSPERGER, 1935 (*Dinardopsis*)
(Arb. morph. tax. Ent. 2, 216–217)

Holotypus, Paratypen, Nova Teutonia, S. Catherine, Brasilien, in Nestern von *Solenopsis saevissima*, 1934, leg. PLAUMANN.
Paratypus im DEI.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

plicatus L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Tetralarsus*)
(Pselaphidens Siams, 25)

Syntypen, Siam.

DEI: ♂ Lectotypus, Siam, Bangkok; 1 ♂ Paralectotypus, Siam; von PUTHZ (Philippia 2, 83–84; 1973) festgelegt.

polita KRAATZ, 1857 (*Tetrasticta*)
(Linnaea 11, 55)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 6 Syntypen, Ceylon.

polita EICHELBAUM, 1913 (*Pseudotetrastricta*)
(Arch. Nat. 79 A 3, 149–150)

8 Syntypen, Ost-Afrika, Amani, in Laublagen des Urwaldes, am Fuße des Berges Bomole, 11. u. 13. 10. 1903, leg. EICHELBAUM.

DEI: 2 Syntypen, Amani, 10. 1903.

polystictipersoonii EICHELBAUM, 1913 (*Gyrophaena*)
(Arch. Nat. 79 A 3, 140–141)

Ca. 50 Syntypen, Ost-Afrika, Amani, nur in *Polystictus persoonii* FRIES, 4. 10. 1903, leg. EICHELBAUM.

DEI: 1 Syntypus, Amani, 4. 10. 1903.

polystiptorum EICHELBAUM, 1913 (*Gyrophaena*)
(Arch. Nat. 79 A 3, 140)

6 Syntypen, Ost-Afrika, Amani, in faulenden Polyporeen, 8. 1903, leg. EICHELBAUM.

DEI: 1 Syntypus, Amani, 8. 1903.

posticus FAUVEL, 1895 (*Stenus*)
(Rev. d'Ent. 14, 209)

Syntypen, Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12.; Carin Asciuii Ghècu, 1400–1500 m, 3.–4., leg. FEA.

DEI: 1 Paralectotypus, Carin Asciuii Ghech, 1400–1500 m, 3. u. 4. 1888, leg. FEA, von PUTHZ (Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg. 45 (9), 38; 1969) festgelegt.

praenobilis KRAATZ, 1879 (*Bolitobius*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 23, 121; Taf. 2, Fig. 1)

Holotypus, Amur, leg. CHRISTOPH, im DEI.

pratti SCHEERPELTZ, 1962 (*Staphylinus*)
(Beitr. Ent. 12, 593–596, Fig. 4)

♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Kiukiang, June 1887, leg. PRATT; Holotypus im DEI, Paratypus, in Coll. SCHEERPELTZ.

DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

princeps FAUVEL, 1895 (*Medon*)
(Rev. d'Ent. 14, 227)

Syntypen, Birma, Carin Cheba, 500–1000 m, 12.; Carin Asciuii Ghécu, 1400–1500 m, 3.–4., leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Carin Asciuii Ghech, 1400–1500 m, 3.–4. 1888, leg. FEA.

procera KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 307–308)

Syntypen, Thüringen, leg. KELLNER.

DEI: 1 Syntypus, Thüringen, leg. KELLNER.

procera KRAATZ, 1859 (*Myrmedonia*)
(Arch. Nat. 25, 20–21)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 2 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

procerus KRAATZ, 1879 (*Oxyporus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 23, 122; Taf. 2, Fig. 3)

Holotypus, Amur, leg. CHRISTOPH.

DEI: Holotypus, Amur, 1877, leg. CHRISTOPH.

procerus KRAATZ, 1859 (*Scopaeus*)
(Arch. Nat. 25, 127)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELPER.

DEI: 2 Syntypen, India orient.

productus KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 89)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 6 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

profundepunctatus BENICK, 1916 (*Stenus*)
(Ent. Mitt. 5, 241–242)

Holotypus, S-O-Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT, im DEI.

prolongatum ROTTENBERG, 1873 (*Lathrimaeum*)
(Berl. Ent. Ztschr. 17, 203–204)

Syntypen, Schlesien, Riesengebirge, Melzer-Grund, 5. 1871, leg. ROTTENBERG; 1 Ex., Breslau, Sommer 1871, leg. SCHWARZ; Schlesien, Altvater-Gebirge.

DEI: 1 Syntypus, Altvater.

***prosequens* REICHENSPERGER, 1935 (*Tetradonia*)**

(Arb. morph. tax. Ent. 2, 215—216)

Holotypus, mehrere Paratypen, Costa Rica, Hamburg-Farm und Ramal, Parismia, S. Clara, im Zuge von *E. hamatum*, 8, 26, 8, 28, leg. NEVERMANN. Paratypen im DEI.

DEI: 1 Paratypus, Costa Rica, Hamburgfarm, Reventazon, Ebene Limon, 28. 8. 1926, leg. NEVERMANN.

***proxima* KRAATZ, 1856 (*Homalota*)**

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 314—315)

Syntypen, Süddeutschland, ohne nähere Fundortangaben.

DEI: 1 Syntypus, Germ.m.

***proximus* KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)**

(Arch. Nat. 25, 80)

Holotypus, Nord-Indien, leg. BACON.

DEI: Holotypus, India or., leg. BACON (Druck- oder Schreibfehler?).

***proximus* KRAATZ, 1855 (*Tachinus*)**

(Stett. Ent. Ztg. 16, 25)

Syntypen; Habitat in Germania, prope Bonn, (ipse legi); in Galliae montosis, leg. REV.

DEI: 1 Syntypus, Cassel; 1 Syntypus, Barmen.

***pruina* KRAATZ, 1856 (*Homalota*)**

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 228—229 nota)

Syntypen, Ufer des Mittelmeeres, besonders an der italienischen Küste.

DEI: 1 Syntypus, Sicil. ?, leg. SCHIÖDTE.

***pruinosus* CAMERON, 1925 (*Stiliclus*)**

(Treubia 6, 182)

7 Syntypen, Java, Tjibodas, 1400 m, 23. 5. 1922, leg. DAMMERMAN.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***pseudoalpestris* SCHEERPETZ, 1935 (*Leptusa*)**

(Kol. Rundsch. 21, 142—143)

Syntypen, Sudalpen, Mte. Cadria, Mte. Pari, leg. STRUPI; Mte. Tenera.

DEI: 1 Ex. Mt. Guglielmo, 1. b. Breit, von SCHEERPETZ als Cotypus ausgezeichnet, aber in der Originalbeschreibung nicht extra aufgeführt.

***pseudocoreuleus* PUTZH, 1970 (*Stenus*)**

(Mem. Nat. Mus. Victoria Melb. 31, 70)

♂ Holotypus, 5 ♂♂, 8 ♀♀ Paratypen, Cairns, HACKER, BALOGH, WILLIAMS und CHUI CHONG; 2 ♂♂, 2 ♀♀ Paratypen, Hambleton, 11. 1921, PEMBERTON; 2 ♂♂, Babinda, 18. 4. 1919, WILLIAMS; 1 ♀, Eungai, N.S.W., 11. 1928, CARTER und DEANE; 3 ♂♂, 1 ♀, New Guinea, N.E. Papua, Mt. Lamington, 1300—1500 ft, MC.NAMARA; 1 ♀, Cairns district, LEA (SAM). Holotypus, im DEI.

DEI: ♂ Holotypus, 3 ♀♀ Paratypen, Cairns, HACKER.

***pseudopsis* FAUVEL, 1895 (*Oxytelopis*)**

(Rev. d'Ent. 14, 201)

Syntypen; Birma, Carin Ascii Ghéou, 1400—1500 m, 3.—4., leg. FEA. Malacca, Perak, leg. STAUDINGER. Borneo, Sarawak, leg. WALLACE. Java, Kemangle, Tegal, 7., Mus. Leiden.

DEI: 1 Syntypus, Carin Ascii Ghéou, 1400—1500 m, 3.—4. 1888, leg. FEA.

***pseudotruncorum* FAGEL, 1959 (*Afrorosarius*)**

(Explor. Parc Nat. Garamba, Miss. DE SAEGER, fasc. 12, 92—93)

♂ Holotypus, Congo Belge, Parc National de la Garamba, Morubia, 8.—14. 6. 1951, leg. DE SAEGER im Inst. des Parcs Nationaux du Congo Belge; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 2 Paratypen, SO Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT.

***pterobrachys* GEMMINGEN & HAROLD, 1868 (*Stenus*)**(Catalogus Coleopterorum 2, 639; nom. nov. *probrevipennis* MÄKLIN, 1852, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 25, 318)

Syntypen, Insel Sitkha, leg. FRANKENHAEUSER und HOLMBERG.

DEI: 1 Syntypus, Sitkha, MÄKLIN.

***pubicollis* *truncicola* Wasmann, 1911 (*Atemeles*)**

(Mem. Congr. internat. Ent. Brüssel 2 (1910), 270)

Syntypen, Westfalen, Lippespringe, 1909, leg. Wasmann.

DEI: 1 Syntypus, Lippespringe, 8. 09, leg. Wasmann.

***puellaris* BERNHAUER, 1899 (*Atethla*)**

(Verh. zool. bot. Ges. Wien 49, 21)

Syntypen, Dalmatien, Castelnuovo, leg. PAGANETTI-HUMMLER.

DEI: 1 Syntypus, Dalmatien.

***puellaris* HAMPE, 1863 (*Leptusa*)**

(Wien. Ent. Monatschr. 7, 285)

Syntypen, Agram, leg. HAMPE.

DEI: 2 Syntypen, Croat.

***pulchellum* KRAATZ, 1859 (*Lathrobium*)**

(Arch. Nat. 25, 116)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 4 Syntypen, Ceylon.

***pulchellum* KRAATZ, 1859 (*Leucocraspedon*)**

(Arch. Nat. 25, 53)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 6 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

***pulchellus* KRAATZ, 1859 (*Eledius*)**

(Arch. Nat. 25, 169—170)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

***pulchellus* KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)**

(Arch. Nat. 25, 92—93)

Syntypen; Ost-Indien, leg. HELFNER; Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 6 Syntypen, Ostindien; 2 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

***pulchellus* KRAATZ, 1859 (*Sunius*)**

(Arch. Nat. 25, 147)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 9 Syntypen, Ceylon.

***pulcher* BERNHAUER, 1908 (*Bolitobius*)**

(Verh. zool. bot. Ges. Wien 58, 35)

2 Syntypen, Turkestan, Mts. Karategchin, Sary-pul, 1482 m, leg. HAUSER, 1 Ex., in Coll. BERNHAUER.

DEI: 3 Syntypen (an einer Nadel), mit den Angaben der Beschreibung.

pulchra KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 321)

Syntypen, Österreich; Rheingegend; Parnaf, leg. v. KIESENWETTER.

DEI: 1 Syntypus, Austr.; 1 Syntypus, Crefeld?

pulla ROTTENBERG, 1870 (*Myrmecodia*)

(Berl. Ent. Ztschr. 14, 26)

Holotypus, Sicilien, Catania, im DEI.

pumila KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 258–259)

Syntypen, Berlin und Leipzig.

DEI: 2 Syntypen, Berlin; 1 Syntypus, Leipzig.

punctatissima KRAATZ, 1857 (*Myrmecodia*)

(Linnaea 11, 52)

Holotypus, Ceylon, Termitenhügel bei Negambo, 1855, leg. NIETNER, im DEI.

puncticeps KRAATZ, 1858 (*Oculea*)

(Berl. Ent. Ztschr. 2, 50)

Syntypen, Aetolisches Gebirge, an einem Waldstrom, leg. v. KIESENWETTER.

DEI: 1 Syntypus, Aetol. Alp., leg. v. KIESENWETTER.

puncticeps KRAATZ, 1859 (*Oxytelus*)

(Arch. Nat. 25, 176)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

puncticeps KRAATZ, 1859 (*Scopaeus*)

(Arch. Nat. 25, 132)

Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.

puncticollis WEISE, 1875 (*Anthophagus*)

(Dttsch. Ent. Ztschr. 19, 364)

Syntypen, Ungarn, in einem Bach bei Luhy.

DEI: 1 Syntypus, Ungarn, Luhy.

puncticollis KRAATZ, 1857 (*Coenonica*)

(Linnaea 11, 46–47)

Syntypen, Ceylon, bei Colombo, in Termitenhügeln, 1855, leg. NIETNER.

DEI: 3 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

puncticollis KRAATZ, 1858 (*Homorocerus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 2, 363)

Syntypen, Senegambia, leg. BOCANÉ.

DEI: 1 Syntypus, Sénégal.

puncticollis BENICK, 1942 (*Megalopsidia*)

(Arb. morph. tax. Ent. 9, 140–142)

Holotypus, Costa Rica, La Caja, 8 km westlich von San José, 1930, leg. SCHMIDT, im DEI.

DEI: ? Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

puncticollis KRAATZ, 1859 (*Osorius*)

(Arch. Nat. 25, 168)

Syntypen, Ost-Indien, leg. BACON.

DEI: 1 Syntypus, India or., leg. BACON.

punctipennis KRAATZ, 1859 (*Coproporus*)

(Arch. Nat. 25, 57)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 1 Syntypus, Indien, leg. HELFER.

punctipennis BIRIG, 1934 (*Ehomalolinus*)

(Mem. Soc. Cuban. Hist. Nat. Poey 8, 18–20; Taf. 1, Fig. 8)

Holotypus, Paratypen, Costa Rica, Vara Blanca, 2000 m, zwischen Barba und Poas, leg. SCHMIDT. Holotypus und Paratypen, im DEI; Paratypus, in Coll. BIERIG.

DEI: Holotypus, 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

punctipennis THOMSON, 1860 (*Gyrophaena*)

(Skandinavien Coleoptera II, 269–270)

Syntypen, Glimakra im nordöstlichen Skåne, leg. THOMSON.

DEI: 1 Syntypus, Scania, leg. THOMSON.

punctipennis KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 231–232)

1 Syntypus, bei Crefeld, leg. MINK; 1 Syntypus, Thüringen, leg. KELLNER.

DEI: 1 Lectotypus, Crefeld, leg. MINK, von LIKOVSKÝ (Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov. Bratislava 21, 159; 1975) festgelegt.

punctipennis FAUVEL, 1895 (*Osorius*)

(Rev. d'Ent. 14, 195)

Syntypen; Birma, Carin Gheciu, 1300–1400 m, 2., 3.; Carin Cheba, 900–1100 m, 1.; Carin Asciului Cheba, 800–1400 m, 12.; alle leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Carin Gheciu, 1300–1400 m, 5. 1888, leg. FEA.

punctiventris KRAATZ, 1859 (*Aleochara*)

(Arch. Nat. 25, 18–19)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

punctiventris KRAATZ, 1857 (*Philonthus*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 578)

Syntypen, Baiern, leg. WALTL.

DEI: 1 ♀ Syntypus, Bavar., leg. WALTL.

punctus BERNHAUER, 1922 (*Osorius*)

(Arch. Nat. 88 A 7, 226)

Syntypen, Formosa, Suisharyo und Fuhosho, leg. SAUTER.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Suisharyo, 10. 1911, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Fuhosho, 7. 9., leg. SAUTER.

pusillimus KRAATZ, 1859 (*Leptacinus*)

(Arch. Nat. 25, 112)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

pusillimus KRAATZ, 1859 (*Oxytelus*)

(Arch. Nat. 25, 177)

Syntypen, Indien, leg. BACON.

DEI: 3 Lectotypus, 1 Paralectotypus, India or., von HAMMOND festgelegt.

pustulatus BERNHAUER, 1904 (*Troglophloeus*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 54, 20—21)

Mehrere Syntypen, Annam, Phuc-Son, 11., 12., leg. FRIEDEMANN.
DEI: 12 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

putrida KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 300)

Syntypen, Deutschland, ohne nähere Fundortangabe.
DEI: 2 Syntypen, Bavar., leg. WALTL.

putridula KRAATZ, 1859 (*Homalota*)

(Arch. Nat. 25, 35)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 7 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

pygiale KRAATZ, 1859 (*Cryptobium*)

(Arch. Nat. 25, 121—122)

Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 5 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; 1 Syntypus, Ostindien.

pygmaea KRAATZ, 1859 (*Palagria*)

(Arch. Nat. 25, 7)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 7 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

pygmaea KRAATZ, 1859 (*Gyropaphaena*)

(Arch. Nat. 25, 49—50)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

pygmaea KRAATZ, 1859 (*Placusa*)

(Arch. Nat. 25, 44)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 2 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

pygmaea KRAATZ, 1859 (*Thinocharis*)

(Arch. Nat. 25, 143)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 4 Syntypen, Ceylon.

pygmaeus KRAATZ, 1859 (*Coproporus*)

(Arch. Nat. 25, 58)

Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ostindien, leg. HELFER.

DEI: 8 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

pygmaeus KRAATZ, 1857 (*Hypocyptus*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 388)

Syntypen, bei Berlin, leg. KRAATZ.

DEI: 2 Syntypen, Berol.

pygmaeus KRAATZ, 1859 (*Leptocheirus*)

(Arch. Nat. 25, 191)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 1 Syntypus, India or.

pygmaeus KRAATZ, 1859 (*Oxytelus*)

(Arch. Nat. 25, 176)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 3 Lectotypus, 4 Paralectotypen, Ceylon, von HAMMOND festgelegt.

pygmaeus KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)

(Arch. Nat. 25, 93)

Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; 3 Syntypen, Ostindien.

pygmaeus KRAATZ, 1859 (*Stilicus*)

(Arch. Nat. 25, 126—127)

♂ Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER.

quadratus KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)

(Arch. Nat. 25, 96)

Syntypen, India boreali, leg. BACON.

DEI: 2 Syntypen, Ostindien (Etikettierungs- oder Druckfehler?).

quadrituberculata CAMERON, 1925 (*Pelioptera*)

(Treibia 6, 195)

6 Syntypen, Java, Tjibodas, 1400 m.

DEI: 1 Syntypus, Tjibodas, 1400 m.

quedenfeldti WEISE, 1879 (*Platystethus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 23, 147)

Syntypen, Japan.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂, 2 ♀ Paralectotypen, Japan, von HAMMOND festgelegt.

quinquedentata EICHELBAUM, 1913 (*Pronomaea*)

(Arch. Nat. 79 A 3, 134)

8 ♂, 2 ♀ Syntypen, Ost-Afrika, Amani, am Berg Bomole, 11. und 13. 10. 1903, leg. EICHELBAUM.

DEI: 1 Syntypus, Amani, 10. 1903, leg. EICHELBAUM.

quinquemaculatus BERNHAUER, 1920 (*Megalops*)

(Neu. Beitr. syst. Insektenk. 2, 10)

Syntypen, Caracas, Bittagebirge, in einem modrigen Baume, leg. THIEME, in Sammlung BERNHAUER und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung; 1 Syntypus, Caracas.

recondita KRAATZ, 1856 (*Oxypoda*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 182)

Holotypus, Misdray, leg. HABELMANN, im DEI.

regalis BERNHAUER, 1915 (*Eurycnenus*)

(Ann. Mus. Nat. Hung. 13, 150)

♂ Holotypus, Kamerun.

DEI: Holotypus, Kamerun, Lolodorf, 95, leg. CONRADT.

reissi BENICK, 1936 (*Atheta*)

(Kol. Rundsch. 22, 41–42)

Holotypus, zahlreiche Paratypen: Lechitaler Alpen, Krabachjoch, 30. 7. 1933, 16. 9. 1934; Krabachtal, 3. 10. 1934; Stubai Alpen, Berglas, 17. 9. 1933, 9. 9. 1934; Villerrgrube, 24. 9. 1934; Silvretta, Getschner Kar, 2. 9. 1935; alle in Marmortiefenbauen, leg. PECHLANER; Berglas, 25. 9. 1933, leg. WÖRNDLE. Holotypus, in Coll. BENICK, Paratypen, in Coll. PECHLANER.

DEI: 1 Paratypus, Nördl. Tirol, Stubai-Alpen, Marmortiefen, 25. 9. 1933, leg. WÖRNDLE.

reitteri EPPELSHHEIM, 1879 (*Lepisma*)

(Verh. zool. bot. Ges. Wien 29, 38–39)

Syntypen, Croatian, Capella-Gebirge, leg. REITTER.

DEI: 3 Ex., vielleicht Typen, Croatiae.

reitteri BERNHAUER, 1933 (*Piestoneus*)

(Wien. Ent. Ztg. 50, 25)

Syntypen, Szetschwan, Tatsienlu Tiji, Urwald-Rodung.

DEI: 1 Syntypus, Szechuan, China, Tatsienlu Tiji, Urwald-Rodung, leg. REITTER.

reitteri WEISE, 1875 (*Stenus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 19, 357–358)

Syntypen, Ungarn, an feuchten Felsblöcken, in den Bächen der Marmarosch.

DEI: 1 Syntypus, „Hooverla“?; 2 Syntypen, „Raho“?.

renkoneni PUTHZ, 1964 (*Stenus*)

(Ann. Ent. Fenn. 30, 227–229, Abb. 1, 2)

♂ Holotypus, Herzegovina, Capljine dolnjie blato, coll. RENKONEN; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Dalmatien, Almissa, 1911, leg. SCHATZMAYR.

reticulatus PUTHZ, 1970 (*Stenus*)

(Mem. Nat. Mus. Victoria Melb. 31, 61)

♂ Holotypus, N. W. Old. Charters Towers, W. of Hughenden, HACKER; 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, Adelaide R., N. T. im BM;

Holotypus im DEI.

DEI: ♂ Holotypus, Queensland, Chartas Towers, Hughenden, HACKER.

rhyssoptera KRAATZ, 1859 (*Homalota*)

(Arch. Nat. 25, 37–38)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 2 Syntypen, Ind. post., leg. HELFER.

ripicola KRAATZ, 1854 (*Lithocharis*)

(Stett. Ent. Ztg. 15, 127)

Syntypen, Ufer der Ahr, unter Steinen.

DEI: 1 Syntypus, Germ.; 1 Syntypus, Ahrweil.

robustum KRAATZ, 1859 (*Dolicaon*)

(Arch. Nat. 25, 117)

Holotypus, Tranquebar, leg. WESTERMANN, im DEI.

robustum BERNHAUER, 1902 (*Medon*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1902, 33–34)

10 Syntypen, Ceylon, Trincomalee und Nalanda, leg. HORN, in Coll. BERNHAUER.

DEI: 6 Syntypen, Trincomali, 1899, leg. HORN.

rogeri KRAATZ, 1857 (*Stenus*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 764)

Einige ♂♂ Syntypen, Oberschlesien, unweit Rauden, leg. ROGER.

DEI: 2 Syntypen, Oberschlesien, leg. ROGER.

rotundicollis KRAATZ, 1859 (*Pinophilus*)

(Arch. Nat. 25, 160)

Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.

rubricollis KRAATZ, 1857 (*Myrmedonia*)

(Linnaea 11, 51)

Syntypen, Ceylon, Umgeb. von Negambo, 1855, leg. NIETNER.

DEI: 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER.

rubicollis MOTSCHULSKY, 1858 (*Philonthus*)

(Bull. Mosc. 31 (1), 665)

Syntypen, Indes orientales.

DEI: 1 Syntypus, Ind. or.

rufa KRAATZ, 1859 (*Acanthoglossa*)

(Arch. Nat. 25, 146)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

rufa KRAATZ, 1859 (*Ecoptogenia*)

(Arch. Nat. 25, 9)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 7 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

rufa CAMERON, 1925 (*Mimozypoda*)

(Treubia 6, 190–191)

8 Syntypen, Wai Lima, Sumatra, 11. und 12. 1921, leg. KARNY.

DEI: 1 Syntypus, Z. Sumatra, Wai Lima, Lampungs No 385, 11.–12. 1921, leg. KARNY.

rufa KRAATZ, 1856 (*Oxypoda*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 170)

Syntypen; Österreich; Thüringen.

DEI: 1 Syntypus, Österreich.

rufescens KRAATZ, 1856 (*Caloderia*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 144)

Syntypen, bei Berlin, an feuchten Orten, leg. KRAATZ.

DEI: 1 Syntypus, Berlin.

rufescens KRAATZ, 1856 (*Oxypoda*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 186)

Holotypus, Sächsische Schweiz, leg. MAERKEL, im DEI.

ruficeps CAMERON, 1925 (*Conosoma*)

(Treubia 6, 187)

8 Syntypen, Java, Tribadas, 1400 m, 8. 1921, 5. 1922, leg. DAMMERMAN.

DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 2 Ex., 3. 1921, 1 Ex., 23. 5. 1922.

ruficeps KRAATZ, 1859 (*Oedichirus*)

(Arch. Nat. 25, 155–156)

Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.

ruficeps KRAATZ, 1857 (*Tachyporus*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 422—423)

Syntypen, bei Berlin, leg. WEINDEBACH; bei Wien, leg. Graf v. FERRARI und SCHEFFLER.

DEI: 1 Syntypus, Berol.; 2 Syntypen, Umgebung Berlin.

ruficollis KRAATZ, 1857 (*Lithocharis*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 717—718)

Syntypen, Berlin, Garten von Monbijou, leg. MAYER und CALIX.

DEI: 5 Syntypen, Umgebung Berlin.

ruficollis KRAATZ, 1859 (*Tanygnathus*)

(Arch. Nat. 25, 64—65)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 4 Syntypen, Ceylon.

ruficornis KRAATZ, 1857 (*Mycetoporus*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 461—462)

Syntypen, Sachsen und Schlesien.

DEI: 2 Syntypen, Saxonia; 1 Syntypus, Silesia.

ruficoxis KRAATZ, 1859 (*Paederus*)

(Arch. Nat. 25, 151—152)

Syntypen, Ceylon.

DEI: 6 Syntypen, Ceylon.

rufipennis FAUVEL, 1895 (*Anisolinus*)

(Rev. d'Ent. 14, 271)

Syntypen, Birma, Rangoon, 3.; Tainzo, 5.; Bhamo, 6.; Shwego-myo, 10.; alle leg. FEA. Cochinchine, Long-Xuyen, leg. DOR.

DEI: 1 Syntypus, Birmania, Shwego-myo, 10. 1885, leg. FEA.

rufipennis KRAATZ, 1858 (*Glypheusthus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 2, 365)

Holotypus, Senegambia, leg. BOCANDÉ, im DEI.

rufipennis KRAATZ, 1858 (*Oligota*)

(Berl. Ent. Ztschr. 2, 352)

Syntypen, Lyon, leg. REY.

DEI: 1 Syntypus, Gall. m., leg. REY (als *brunneipennis* m. *apicata* mihi (olim) von KRAATZ ausgezeichnet); 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.*rufipes* KRAATZ, 1857 (*Hypocyptus*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 386)

Syntypen, bei Berlin, leg. KRAATZ.

DEI: 2 Syntypen, Berol.

rufipes KRAATZ, 1859 (*Pinophilus*)

(Arch. Nat. 25, 155—156)

Syntypen, Nordindien, östlicher Teil, leg. BACON.

DEI: 2 Syntypen, India orient.

rufobasalis BERNHAUER, 1935 (*Atheta*)

(Ent. Nachrichtenbl. Tropau 9, 10—11)

Syntypen, China, Ginyin bei Bébé, Tempelberg, 900 m, leg. REITTER.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

rufomarginatus KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)

(Arch. Nat. 25, 90)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 10 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

rufula KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)

(Arch. Nat. 25, 140—141)

Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.

rufulus WEISE, 1884 (*Eudectus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1884, 270—271)

(als var. von WEISE bereits 1877 in Berl. Ent. Ztschr. 21, 96, beschrieben)

Syntypen, Japan.

DEI: 1 Syntypus, Japonia, leg. HILLER.

rufus KRAATZ, 1859 (*Coproporus*)

(Arch. Nat. 25, 59)

Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.

rufus KRAATZ, 1856 (*Ityobates*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 135—136)

Syntypen, mittleres und südliches Deutschland.

DEI: 1 Syntypus, Germ., leg. v. BRUCK.

rufus KRAATZ, 1859 (*Oxytelus*)

(Arch. Nat. 25, 174)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 3 Lectotypus, 6 Paralectotypen, Ceylon, von HAMMOND festgelegt.

rugatipennis KRAATZ, 1859 (*Homalota*)

(Arch. Nat. 25, 40—41)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 2 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

rugatipennis KRAATZ, 1855 (*Oxypoda*)

(Stett. Ent. Ztg. 16, 332—333)

Holotypus, leg. MONTPELLIER.

DEI: Holotypus, Gall. mer., leg. MONTPELLIER.

rugicollis KRAATZ, 1859 (*Osorius*)

(Arch. Nat. 25, 167—168)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 8 Syntypen, Ceylon.

rugicollis KRAATZ, 1856 (*Oxypoda*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 183)

Syntypen, Österreich.

DEI: 1 Syntypus, Österreich.

rugicollis KRAATZ, 1859 (*Stenus*)

(Arch. Nat. 25, 162)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFNER.

DEI: 2 Syntypen, India or.

rugifrons BERNHAUER, 1900 (*Plathysthetus*)

(Wien. Ent. Ztg. 19, 55)

Einige Syntypen, Bulgar Maaden, leg. v. BODEMEYER.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Paralectotypen, Asia minor, Bulgar Maaden, leg. v. BODEMEYER, von HAMMOND festgelegt.

rugosa WENDELER, 1930 (*Diestola*)

(Neu. Beitr. syst. Insektenk. 4, 250)

Syntypen, Philippinen, Mindanao, Mommugan, 3. 1915; Tabla, 26. 10. 1916, leg. BÖTTCHER, in Coll. WENDELER.

DEI: 1 Syntypus, Philippinen, Tabla, 26. 10. 1916, leg. BOETTCHER.

rugulosa KRAATZ, 1856 (*Oxypoda*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 179–180)

Syntypen, bei Berlin und Leipzig.

DEI: 1 Syntypus, Saxon.

rutilipennis KRAATZ, 1859 (*Aleochara*)

(Arch. Nat. 25, 17)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER.

sachtlebeni BRUNDIN, 1954 (*Atheta*)

(ARK. Zool. (N. S.) 5, 389–390, Fig. 40, 41)

♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, Sizilien, im DEI.

sachtlebeni BERNHAUER, 1935 (*Pinophilus*)

(Kol. Rundsch. 21, 42)

Syntypen, Formosa, Taihorin, Sokutsu, leg. SAUTER, im DEI und Coll. BERNHAUER.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Banshoryo Distr., Sokutsu, 1912, leg. SAUTER.

sacrimontis PUTHZ, 1970 (*Stenus*)

(Beitr. Ent. 20, 590–592)

♂ Holotypus, 2 ♂♂, 5 ♀♀ Paratypen, Mazedonien, Athos, leg. SCHATZMAYR; 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, Saloniki, leg. SCHATZMAYR; 3 ♂♂ Paratypen, Calcidice; Holotypus, Paratypen, im DEI; Paratypen, im Mus. Milano, Mus. Berlin und Coll. PUTHZ.

DEI: ♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Macedonia, Athos, leg. SCHATZMAYR; 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, Saloniki, leg. SCHATZMAYR.

saegeri FÄGEL, 1959 (*Neosorius*)

(Explor. Parc Nat. Garamba Miss. DE SÄGER, fasc. 12, 130–132)

♂ Holotypus, Congo Belge, Parc National de la Garamba, Bagbélé, 16. 12. 1949, leg. DE SÄGER, im Inst. des Parcs Nationaux du Congo Belge; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, SO Kamerun, Loloendorf, 1895, leg. CONRADT.

scutzi PUTHZ, 1972 (*Stenus*)

(Studies on the Neotropical Fauna 7, 125–128, Fig. 14)

♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Chile, Reed, ex Coll. FRY; 2 ♀♀, Concepción, P. HERBST, 1903; 1 ♀, Umg. Coyhaique (SA 59), leg. FRANZ, Coll. FRANZ; 1 ♂, Nuble, 40 km E. of San Carlos, 24. 12. 1950, leg. ROSS & MICHELBACHER (CAS).

DEI: 1 ♀ Paratypus, Chile, Concepc., 1903, leg. HERBST.

sallei KRAATZ, 1868 (*Cyrtothorax*)

(Berl. Ent. Ztschr. 2, 367–368; Taf. III, h)

Syntypen, Mexico, leg. SALLÉ.

DEI: 5 Syntypen, Mexico, leg. SALLÉ.

samoensis BERNHAUER, 1922 (*Osorius*)

(Arch. Nat. 88 A 10, 149)

Syntypen, Samoa, Apia.

DEI: 5 Syntypen, Samoa, Apia.

samojeda POPPIUS, 1909 (*Atheta*)

(Acta Soc. Fenn. Flor. Fenn. 31, nr. 8, 24–25)

Syntypen; Nord-Kanin: Bugranitza, 4. und 6. 7.; Sasariha, 9. 7.; Tarhanowa, 11. 7.; Kanin Noss, 13. 7.; Krinka, 6. 8.; Kambalniza, 20. 7.; alle 1903, leg. POPPIUS, im Mus. Helsinki.

DEI: 2 Syntypen, Kanin, leg. POPPIUS.

sanctus SCHEERPELTZ, 1962 (*Oxytelus*)

(Beitr. Ent. 12, 565–567)

♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, Tempelberg, 900 m, Ginyün bei Bébé, C. China, RTTR.; Holotypus, im DEI, Paratypus, in Coll. SCHEERPELTZ.

DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

sanguinipennis KRAATZ, 1859 (*Aleochara*)

(Arch. Nat. 25, 17)

Syntypen, Ceylonnlin Nesterin von Termiteh, leg. NIETNER.

DEI: 11 Syntype, Ceylon, leg. NIETNER.

sardoum SCHEERPELTZ, 1961 (*Lathrimaeum*)

(Mitt. Münch. Ent. Ges. 51, 92–95)

♂ Holotypus, wenige Paratypen, Monte Genargentu, Sardinien, leg. KRÜGER, in Coll. SCHEERPELTZ.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

sardous KRAATZ, 1857 (*Stenus*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 786 nota)

Syntypen, Sardinien, leg. GENA & STAUDINGER.

DEI: 1 Syntypus, Sardinien, leg. STAUDINGER.

sauteri BERNHAUER, 1922 (*Asternus*)

(Arch. Nat. 88 A 7, 229)

Syntypen, Formosa, Akaau, leg. SAUTER.

DEI: 4 Syntypen, Formosa, Akaau, 12. 1907, leg. SAUTER.

sauteri BERNHAUER, 1922 (*Bledius*)

(Arch. Nat. 88 A 7, 224)

Syntypen, Formosa, Aiping, Talhorin und Suishadryo, leg. SAUTER.

DEI: 5 Syntypen, Formosa, Anping, 5. 1911; 1 Syntypus, Formosa, Suisharyo, 12. 1912?

sauteri BERNHAUER, 1922 (*Paragonus*)

(Arch. Nat. 88 A 7, 225–226)

Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), 7. 1909, leg. SAUTER.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

sautteri BERNHAUER, 1935 (*Pinophilus*)
(Kol. Rundsch. 21, 42)

Syntypen, Formosa, Takao, leg. SAUTTER (!) Druckfehler.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo (Fundortverwechslung ?), leg. SAUTTER (!). Druckfehler.

scabriuscum KRAATZ, 1857 (*Omalium*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 988—989)

Syntypen, 1 Ex., Oberbayern, leg. WALTL; 1 Ex., Schlesien, Grafschaft Glatz, leg. ZEBE.

DEI: 1 Syntypus, Silesia.

scabrosus KRAATZ, 1859 (*Trogophloeus*)
(Arch. Nat. 25, 179—180)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 1 Syntypus, Ceylon.

schaumi KRAATZ, 1860 (*Diochus*)
(Wien. Ent. Monatsschr. 4, 27)

Syntypen, Louisiana, leg. SCHAUM; Georgia, leg. GERHARD.

DEI: Lectotypus, Louisiana; 2 Paralectotypen, Louisiana; 1 Paralectotypus, Georgia; 1 Paralectotypus, Amer. bor., von SMETANA festgelegt.

scheldti SCHEERPELTZ, 1956 (*Eleusis*)

(Rev. Zool. Bot. Afr. 53, 492, 497—498)

Holotypus, Paratypen, Süd-Nigeria, Kamerun, leg. FRANZ und Belg. Kongo. Holotypus, Paratypen, im Musée Tervuren; Paratypen, aus Kamerun, im DEI.

DEI: 1 Paratypus, Kamerun, leg. CONRADT.

schenklingi BERNHAUER, 1922 (*Astenus*)
(Arch. Nat. 88 A 10, 149)

Syntypen, Indochina.

DEI: 1 Syntypus, Indochina, leg. FRIEDERICHS.

schenklingi BERNHAUER, 1922 (*Phytosus*)
(Arch. Nat. 88 A 7, 236—237)

Syntypen, Formosa, Alikang, leg. SAUTTER.

DEI: 2 Syntypen, Formosa, Alikang, 7. 8. 1810, leg. SAUTTER.

schenklingi BERNHAUER, 1912 (*Tympanophorus*)
(Ent. Mitt. 1, 204)

Syntypen, Südost-Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT, im DEI und Coll. BERNHAUER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

schmidti BERNHAUER, 1929 (*Apocellus*)

(Wien. Ent. Ztg. 46, 188—189)

Syntypen, Costa-Rica, San José, leg. SCHMIDT, im DEI und Coll. BERNHAUER.

DEI: 6 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

schmidti BIERIG, 1933 (*Didelotetes*)

(Rev. d'Ent. 3, 514—515)

Holotypus, Paratypen, Costa Rica, Vara Blanca, 2000 m, zwischen Barba und Poas, leg. SCHMIDT; Holotypus, im DIE, Paratypen, in Coll. BIERIG.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

schmidtii BIERIG, 1934 (*Oligota*)

(Mem. Soc. Cubana Hist. Nat. Poey 8, 116—117, Fig. 4)

Holotypus, 2 Paratypen, Costa Rica, La Caja, 8 km westlich von San José, 1931, leg. SCHMIDT; Holotypus, 1 Paratypus, im DEI, 1 Paratypus, in Coll. BIERIG.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

schuberti BERNHAUER, 1926 (*Oxyopoda*)

(Coleopterorum Catalogus Staphylinidae VI, p. 765)

[nom. nov. pro *cingulata* SCHUBERT, Dtsch. Ent. Ztschr. 1911, 38—39; 1911]

Holotypus, Chile, Concepcion, im DEI.

schuberti SCHEERPELTZ, 1933 (*Tropophloeus*)

(In: JUNG & SCHENKLING, Coleopterorum Catalogus VI, 1088)

[nom. nov. pro *aapicalis* SCHUBERT, Dtsch. Ent. Ztschr. 1911, 7; 1911]

3 Syntypen, Paraguay, leg. FIEBRIG.

DEI: 2 Syntypen, Paraguay.

schusteri BERNHAUER, 1908 (*Bolitochara*)

(Verh. zool. bot. Ges. Wien 58, 35—36)

Syntypen, Tunis, Ain Draham, leg. SCHUSTER.

DEI: 1 Syntypus, Ain Draham, Tunis.

schwabei BERNHAUER, 1939 (*Atheta*)

(Arb. morph. tax. Ent. 6, 14—15)

Syntypen, Puerto Puyuhuapi, Süd-Chile, 12. 1937. 1. 1938, leg. SCHWABE, im DEI und Coll. BERNHAUER.

DEI: 19 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

schwabaei BERNHAUER, 1939 (*Trogophloeus*)

(Arb. morph. tax. Ent. 6, 12)

Syntypen, Puerto Puyuhuapi, Süd-Chile, 5. 1. 1938, leg. SCHWABE, im DEI und Coll. BERNHAUER.

DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

scissus PUTHZ, 1968 (*Stenus*)

(Ark. Zool. 20, 448—451, Fig. 6—8)

♂ Holotypus, 5 ♂♂, 8 ♀♀ Paratypen, Brasilien, Sta. Catharina, Nova Teutonia, 12. 1938, leg. PLAUMANN; 8 ♂♂, 5 ♀♀ Paratypen, ibidem, 11. 1938; ♂ Paratypus, ibidem, ohne Datum; ♂ Paratypus, Brasilien, Petropolis, 3. 1928, leg. PLAUMANN; ♀ Paratypus, Brasilien, leg. SAHLBERG. Holotypus, Paratypen, im Mus. Stockholm; Paratypen, in Coll. KORGE, BENICK, PUTHZ und im British Mus.

DEI: 1 ♂ Paratypus, Sta. Catharina, Nova Teutonia, Brasil., 11. 1938, leg. PLAUMANN.

scitulus WEISE, 1877 (*Erichomus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 21, 91—92)

Syntypen, Japan, Hagi unter Baumrinde, leg. HILLER.

DEI: 1 Syntypus, Japan, leg. HILLER.

scrubicolis KRAATZ, 1859 (*Homalota*)

(Arch. Nat. 25, 31—32)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 1 Syntypus, Ind. post., leg. HELFER.

sculpticollis KRAATZ, 1859 (*Eupiestus*)
(Arch. Nat. 25, 182–183)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 11 Syntypen, Ceylon.

sculptipenne KRAATZ, 1859 (*Peilotrachelus*)
(Arch. Nat. 25, 125)

Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.

sculptus KRAATZ, 1859 (*Lispinus*)
(Arch. Nat. 25, 188–189)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

sejugatus BENICK, 1929 (*Stenus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1929, 263–264)

Syntypen; Philippinen, 69 Ex., Montalba; 26 Ex., Luzon, Los Baños; 4 Ex., Luzon, Zambales; 1 Ex., Luzon, Subuagrn; 1 Ex., Aroroy; 1 Ex., Palawan, Bacuit.
DEI: 2 Syntypen, Philippinen, Montalban.

semibrunnea KRAATZ, 1859 (*Oligota*)
(Arch. Nat. 25, 45)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER.

semichaleucus HELLER, 1910 (*Leucilus*)

(Abh. u. Ber. Zool. Mus. Dresden 13, Nr. 3, 9)

8 Syntypen, Kaiser-Wilhelmsland, Torricelligebirge, 1. 9.–Mitte 11. 1909, leg. SCHLAGINHAUFEN.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

semifuscus KRAATZ, 1859 (*Scopaeus*)
(Arch. Nat. 25, 128)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

semigrinum KRAATZ, 1859 (*Lathrobium*)

(Arch. Nat. 25, 117)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 3 Syntypen, Ceylon.

semipurpureus KRAATZ, 1859 (*Staphylinus*)

(Arch. Nat. 25, 73–74)

Holotypus, Nord-Indien, leg. BACON, im DEI.

semirufus FAUVEL, 1895 (*Leptochirus*)

(Rev. d'Ent. 14, 181)

Syntypen Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5., 12.; Asciuii Cheba, 12.; alle leg. FEA.

DEI: 3 Syntypen, Carin Chebà, 900–1100 m, 5., 12. 1888, leg. FEA.

semistriatum SCHEERPELTZ, 1962 (*Lathrobium*)

(Beitr. Ent. 12, 577–580, Fig. 1)

♂ Holotypus, 2 ♀ Paratypen, Jentschoufu, Schantung, 12., 22. 5. 1911, leg. KREYENBERG. Holotypus, 1 ♀ Paratypus, im DEI, 1 ♀, in Coll. SCHEERPELTZ.

DEI: ♂ Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

sericea KRAATZ, 1856 (*Ocidea*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 53 nota)

Holotypus, Sicilien, im DEI.

serraticornis KRAATZ, 1857 (*Myrmedonia*)

(Linnaea 11, 48–49)

2 Syntypen, Ceylon, in Gesellschaft von Termiten, 1855, leg. NIETNER.

DEI: 8 Ex. Ceylon, leg. NIETNER. Neben den 2 Syntypen sind weitere 6 Exemplare vom gleichen Fundort vorhanden. Da alle 8 Tiere als „Cotypus“ bezettelt sind, ist nicht feststellbar, welche beiden Tiere KRAATZ bei der Beschreibung vorgelegen haben.

serrulata BERNHAUER, 1935 (*Atheta*)

(Ent. Nachrichtenbl. Troppau 9, 9–10)

Syntypen, China, Szechuan, Nitou Tatsienlu; Ginytin bei Bébé, Tempelberg, 900 m, leg. REITTER.

DEI: 1 Syntypus, Nitou Tatsienlu, Szechuan, China, leg. REITTER. Das Exemplar wurde von SCHEERPELTZ zum Holotypus von *Atheta nitouensis* (siehe diese) gewählt.

sharpii FAUVEL, 1895 (*Cryptobium*)

(Rev. d'Ent. 14, 238)

Syntypen, Birma, Bhamo, 4., 7.; Semnigion, 2.; alle leg. FEA. Bengalen, Barway, Mus. Brüssel.

DEI: 1 Syntypus, Bhamo, Birmanie, 6. 1888, leg. FEA.

sibiricus SAHLBERG, 1880 (*Stenus*)

(Kongl. Svenska Vetensk. Akad. Handl. (N. F.) 17, nr. 4, 79–80)

Syntypen, Novo Saljevsk, leg. TRYBOM; Imbatisk; Tolstoinos, leg. TRYBOM; Kurejka; Turuchansk; Alinsk; Sortenge; Spirina; in zahlreichen Museen und Sammlungen.

DEI: 1 Syntypus, Kurejka; 1 Syntypus, Imbatsk.

sicula KRAATZ, 1857 (*Lithocharis*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 716–717 nota)

Holotypus, Sicilien, leg. GROHMANN, im DEI.

siculus ROTTENBERG, 1870 (*Atemeles*)

(Berl. Ent. Ztschr. 14, 24–25)

2 Syntypen, Sizilien, Catania, bei Ameisen unter einem Stein, 26. 2.–5. 4. 1868, leg. ROTTENBERG.

DEI: 1 Syntypus, Catania, leg. ROTTENBERG.

siculus STIERLIN, 1867 (*Stenus*)

(Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 2, 221–222)

Syntypen, Sizilien.

DEI: 2 ♂, 2 ♀ Syntypen, Sizilien.

sieberi CAMERON, 1925 (*Medon*)

(Treubia 6, 183)

4 Syntypen, Kei Eil., 1922, leg. SIEBERS.

DEI: 1 Syntypus, Kei Eil., 22, leg. SIEBERS.

silvestris CAMERON, 1918 (*Troglophloeus*)

(Trans. Ent. Soc. London 1918, 61–62)

Syntypen, Singapore, Bukit Timah, Mandai und Sembawang.

DEI: 1 Syntypus, Mandai, Singapore, leg. CAMERON.

silvicola FUSS, 1868 (*Homalota*)
(Berl. Ent. Ztschr. 12, 353—354)

Syntypen, 1 Ex., Ahrgegend; ca. 10 Ex., Cleve, unter feuchtem Laub, in Waldgräben.
DEI: 1 Syntypus, Cleve, 1868.

similis CAMERON, 1925 (*Pelioptera*)
(Treubia 6, 197)

15 Syntypen, Java, Tjibodas, 1400 m.
DEI: 4 Syntypen, Java, Tjibodas, 1400 m, leg. DAMMERMAN.

simoni EPPELSHEIM, 1878 (*Leptusa*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 22, 211—212)

Syntypen, Schwarzwald, Kniebis bei Buhlbach, 2600—2700 Fuß, 11. 1877, leg. SIMON.
DEI: 1 Syntypus, Schwarzwald, Buhlbach, 8. 12. 1877, leg. SIMON.

simplex BAUDI, 1869 (*Leptusa*)
(Berl. Ent. Ztschr. 13, 372—373 nota)

Syntypen, Hügel bei Turin.

DEI: 13 Syntypen, Coll. Taurin.

singulare KRAATZ, 1859 (*Omalium*)
(Arch. Nat. 25, 181)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 4 Syntypen, Ceylon.

socius BERNHAUER, 1922 (*Platyprosopus*)
(Arch. Nat. 88 A 10, 150)

Syntypen; Kambodja; 1 Ex., Pnom-Penh.
DEI: 13 Syntypen, Kambodja; 1 Syntypus, Kambodja, Pnom-Penh; leg. FRIEDERICHS.

sodenata KRAATZ, 1857 (*Lathrobium*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 687—688)

Holotypus, Baiern, leg. WALTL, im DEI.

solaris BERNHAUER, 1902 (*Sipalia*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 52, 696—697)

Syntypen, Südtalien, Vallo Lucania, leg. SOLARI.

DEI: 1 Syntypus, Vallo Lucano, leg. SOLARI.

solenopsisidis WASMANN, 1909 (*Myrmecosaurus*)
(Zool. Anz. 34, 767, 3 Fig.)

Zahlreiche Syntypen, Brasilien, Staat S. Catharina, Joinville.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

solitaria BERNHAUER, 1925 (*Apocellus*)
(Arch. Nat. 91 A 12, 232)

Syntypen, Chile, leg. FAIRMAIRE, ex Coll. KRAATZ, im DEI und Coll. BERNHAUER.

DEI: 13 Syntypen, Chile, leg. FAIRMAIRE et SOLIER.

solitaria KRAATZ, 1856 (*Oxypoda*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 180)

Syntypen, Österreich und Baiern.

DEI: 1 Syntypus, Österreich.

sordida KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 268)

Syntypen, Österreich.

DEI: 1 Syntypus, Austria.

sordida KRAATZ, 1859 (*Myrmedonia*)
(Arch. Nat. 25, 23—24)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

sordidulum KRAATZ, 1857 (*Antobium*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 1013—1014)

5 Syntypen, Umgebung von Bonn, leg. KRAATZ.

DEI: 2 Syntypen, Bonn.

sordidus CAMERON, 1930 (*Oxytelus*)
(Fauna Brit. Ind. Col. Staph. 1, 216—217)

Syntypen, Dehra Dun; Bihar; Pusa; Assam, Naga Hills, 3000 Fuß.

DEI: 1 Paraclectotypus, Dehra Dun, 7. 10. 1922, leg. CAMERON, von HAMMOND festgelegt.

soror KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 257)

Holotypus, Bonn, leg. KRAATZ, im DEI.

sororecula KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)
(Arch. Nat. 25, 140)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 5 Syntypen, Ceylon.

sparsipenne BERNHAUER, 1927 (*Oedichirus*)
(Mem. Soc. Ent. Ital. 5 (1926), 155—156)

Syntypen, Brasilien, S. Catharina, Theresopolis, 1887, leg. FRUHSTORFER, im DEI und Coll. BERNHAUER.

DEI: 1 Syntypus, S. Catharina, Theresopolis, 1887, leg. FRUHSTORFER.

sparsus CAMERON, 1924 (*Priocnirus*)
(Nova Guinea Zool. 15, 1, 84, 86)

12 Syntypen, Neu Guinea, Mamberamo Riv., Idenburg Riv.

DEI: 2 Syntypen, N. Guinea, Mamberamo Riv., Pionierbivak, 5.—6. 1920, leg. VAN HEURN; 1 Syntypus, N. Guinea, Idenburg Riv., Prauwembivak, 9. 1920, leg. VAN HEURN.

sparsuta CAMERON, 1925 (*Gyrophaena*)
(Treubia 6, 188)

Syntypen, Sumatra, Wai Lima, 11. und 12. 1921, leg. KARNY.

DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, davon 1 Ex. als Typus ausgezeichnet.

spatuloides BENICK, 1939 (*Atheta*)
(Norsk Ent. Tidsskrift 5 (1938), 104)

♂ Holotypus, Rundhaug, Målselv, 24. 6. 1937, leg. STRAND; 1 ♀ Paratypus, Hinter Raut b. Gramais, Lechthal, Tirol, an totem Kalb, 20. 8. 1934, leg. KNABL, in Sammlung BENICK.

DEI: 1 ♀ Paratypus ?, Rundhaug M. elv, leg. STRAND.

spectabilis KRAATZ, 1859 (*Cryptobium*)
(Arch. Nat. 25, 118–119)

♂ Holotypus, Nord-Indien, leg. BACON.

DEI: ♂ Holotypus, Ostindien (Etikettierungs- oder Druckfehler?).

spectabilis KRAATZ, 1857 (*Bledius*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 821 nota)

Syntypen, Griechenland, leg. ZEBE.

DEI: 1 Syntypus, Creta, leg. ZEBE; 5 Syntypen, Graecia.

spectabilis germanicus WAGNER, 1935 (*Bledius*)

(Ent. Bl. 31, 109)

Syntypen, Mark Brandenburg, Mellen.

DEI: 5 Syntypen, Mark, Mellensee; 3 Syntypen, Umgeb. Sperenberg.

spectabilis KRAATZ, 1859 (*Coproporus*)

(Arch. Nat. 25, 55–56)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 4 Syntypen, India or., leg. HELFER.

spectabilis KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)

(Arch. Nat. 25, 135)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 7 Syntypen, Ceylon; 3 Syntypen, Ost-Indien.

spectabilis KRAATZ, 1859 (*Platysthetus*)

(Arch. Nat. 25, 170)

Syntypen, Indien or. und bor., leg. BACON.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂ Parataxotype, India spt., leg. BACON, von HAMMOND festgelegt.

speculifrons KRAATZ, 1857 (*Oxytelus*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 862 nota)

Syntypen, Hyères, leg. REY.

DEI: ♀ Lectotypus, Gall., leg. REY, von HAMMOND festgelegt.

speculiventris SCHEERPELTZ, 1962 (*Atheta*)

(Beitr. Ent. 12, 596–598)

♀ Holotypus, Hwayin-Shan, Mittelszechuan, 1600 m, leg. REITTER, im DEI.

speculum KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 246–247 nota)

Syntypen, Griechenland, leg. v. KIESENWETTER.

DEI: 1 Syntypus, Graecia, leg. v. KIESENWETTER.

spinicollis KRAATZ, 1862 (*Homalota*)

(Berl. Ent. Ztschr. 6, 267–268)

Syntypen, Croatia, leg. HAMPE.

DEI: 7 Syntypen, Croatia, leg. HAMPE.

spinifer FAUVEL, 1895 (*Eupiestus*)

(Rev. d'Ent. 14, 186–187)

Syntypen, Birma, Carin Ghéou, 1300–1400 m, 2., 3.; Carin Cheba, 900–1000 m, 5., 12.; Carin Asciuii Cheba, 1200–1300 m, 12.; alle leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Carin Asciuii Cheba, 1200–1300 m, 12. 1887, leg. FEA.

spinigera KRAATZ, 1859 (*Placusa*)

(Arch. Nat. 25, 43)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 10 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

spinosa SCHEERPELTZ, 1962 (*Atheta*)

(Beitr. Ent. 12, 601–603, Fig. 5)

♂ Holotypus, 2 ♀ Paratypen, Tempelberg, 900 m, Ginyün bei Bébé, C. China, leg. REITTER; Holotypus, 1 Paratype, im DEI; 1 Paratype, in Coll. SCHEERPELTZ.

DEI: ♂ Holotypus, 1 ♀ Paratype, mit den Angaben der Beschreibung.

splendens KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 246–247)

Syntypen, Deutschland, ohne nähere Angaben.

DEI: 1 Syntypus, Misdro.

splendida KRAATZ, 1859 (*Homalota*)

(Arch. Nat. 25, 38)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER.

squamosus BRONICK, 1917 (*Stenus*)

(Ent. Bl. 13, 312–313)

♀ Holotypus, Columbien, im DEI.

DEI: ♀ Holotypus, Nov. Gran.

stagophilum KRAATZ, 1856 (*Lathrobium*)

(Verh. zool. bot. Ges. Wien 6, 626)

Holotypus, Krain, leg. SCHMIDT, im DEI.

staphylinoides KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)

(Arch. Nat. 25, 134–135)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 3 Syntypen, Ceylon.

staudingeri KRAATZ, 1860 (*Diochus*)

(Wien. ent. Monatschr. 4, 27)

Holotypus, Andalusia, leg. STAUDINGER, im DEI.

stenocephalus EPPELSHEIM, 1881 (*Othius*)

(Verh. zool. bot. Ges. Wien 30 (1880), 506)

Syntypen, Kaukasus, Helenendorf, leg. LEDER.

DEI: 1 Syntypus, Kaukas., Helenendorf, leg. LEDER.

stercoraria KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 319–320)

Zahlreiche Syntypen, Bonn, im Mist.

DEI: 3 Syntypen, Bonn.

stramineum KRAATZ, 1857 (*Anthobium*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 1015 — 1016)

Syntypen, Thüringen, auf Apfelblüten, leg. KELLNER; Bonn, leg. KRAATZ.
DEI: 4 Syntypen, Bonn.***stricta*** ERICHSON, 1840 (*Falagria*)

(Genera et Species Staphylinorum, 51 — 52)

Syntypen, Columbiens, Caracas, in Coll. MORITZ.
DEI: 1 Syntypus, Caracas.***stricticollis*** FAUVEL, 1895 (*Osorius*)

(Rev. d'Ent. 14, 196)

Syntypen, Birma, Carin Ghécu, 1300 — 1400 m, 2., 3.; Tenasserim, mont Mooleyit, 1800 — 1900 m, 3.; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Tenasserim, M. Mooleyit, 1800 — 1900 m, 2. — 3. 1887.***strigellae*** FAUVEL, 1895 (*Stilicopeis*)

(Rev. d'Ent. 14, 223)

Syntypen, Birma, Carin Asciuii Ghécu, 1400 — 1500 m, 3. — 4., leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.***strigicollis*** BERNHAUER, 1928 (*Xantholinus*)

(Ent. Tidskr. 49, 46 — 47)

Syntypen, Brasilien, S. Catharina, Hammonia, 8. 1910, leg. LÜDERWALDT; Santos, leg. METZ; S. Paulo, Ribeirão Preto Penteado, 3. — 7. 1899, leg. RIEDEL; Bahia, Iguassú, 7. — 8., leg. ROMAN; Petropolis, 2. 1849, leg. SAHLBERG.
DEI: 2 Syntypen, Santos, leg. METZ.***strigipenne*** MÄKLIN, 1852 (*Omalium*)

(Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 25/II, 320 — 321)

Syntypen, Insel Sitkha, leg. FRANKENHAEUSER & HOLMBERG.
DEI: 1 Syntypus, Sitkha.***strigiventris*** KRAATZ, 1859 (*Lispinus*)

(Arch. Nat. 25, 186)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, India or.***styriaca*** SCHEERPELTZ, 1957 (*Leptusa*)

(Carinthia II 67, 133 — 135)

Syntypen, Bachergebirge; Koralpe, leg. MANDEL; südöstliche Teile des Koralpen-Massives, leg. HÖLZEL & STRUPI.
DEI: 1 Syntypus, Koralpal, Styr., Hochalpin, 2000 m, leg. MANDL.***subcostatum*** MÄKLIN, 1852 (*Lathriameum*)

(Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 25/II, 320)

Syntypen, Insel Sitkha, leg. PIPPINGSKÖLD, FRANKENHAEUSER & HOLMBERG.
DEI: 1 Syntypus, Sitkha.***subcylindricus*** SCRIBA, 1870 (*Stenus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 14 (Beilage), 83 — 84)

Syntypen, „Dom. de Heyden legit 2♀ prope Santas Albas“.
DEI: 1 ♂ Lectotypus, Albas, 18. 7., von PUTHZ (Eos 42 (1966), 535; 1967) festgelegt.***subdepressus*** KRAATZ, 1859 (*Coproporus*)

(Arch. Nat. 25, 57 — 58)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 5 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.***subjasciatus*** KRAATZ, 1859 (*Scopaeus*)

(Arch. Nat. 25, 129 — 130)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 3 Syntypen, Ceylon; 1 Syntypus, India orient.***subglaber*** BERNHAUER, 1922 (*Coproporus*)

(Arch. Nat. 88 A 7, 234)

Syntypen, Formosa, Hoozan, 1. 1910; Kankau (Koshun), 7. 1909; leg. SAUTER.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Hoozan, 1. 1910, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Kankau (Koshun), 7. 1909, leg. SAUTER.

subtrideus KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)

(Arch. Nat. 25, 81 — 82)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 7 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.***subtrideus*** KRAATZ, 1859 (*Staphylinus*)

(Arch. Nat. 25, 78)

Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.

subtinearis KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 275 — 276)

Syntypen, Deutschland, ohne nähere Fundortangaben.

DEI: 4 Syntypen, Barmen; 1 Syntypus, Germ.

sublucens FAUVEL, 1895 (*Lispinus*)

(Rev. d'Ent. 14, 184 — 185)

Syntypen, Tenasserim, Kawkareet, 1., 2., leg. FEA; Ille Bengkalis, leg. MAINDRON; Java, Teibodas, 10., leg. BECCARI; Pengalengan, 1300 m, leg. FRUHSTORFER.

DEI: 1 Syntypus, Tenasserim, Kawkareet, 2. 1887, leg. FEA.

submarginalis BERNHAUER, 1922 (*Stenus*)

(Arch. Nat. 88 A 7, 227)

Syntypen, Formosa, Taihoku, leg. SAUTER.

DEI: 1 Syntypus, Taihoku, Formosa, 1912, leg. SAUTER.

subnitidus ROUBAL, 1911 (*Leptusa*)

(Casopis 8, 13 — 15)

Syntypen, Kaukasus, Krasnaja Poljana, 1910.

DEI: 1 Syntypus, Caucasus occ., Krasnaja Poljana, 7. 1910, leg. ROUBAL.

subopacus KRAATZ, 1859 (*Lispinus*)

(Arch. Nat. 25, 187 — 188)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 3 Syntypen, Ceylon.

subrugosa KRAATZ, 1859 (*Falagria*)

(Arch. Nat. 25, 5)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 7 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

substratus KRAATZ, 1859 (*Homalotrichus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 3, 16)

Holotypus, Chile.

DEI: Holotypus, Chile, leg. DEYROLLE.

subtile KRAATZ, 1857 (*Omalium*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 987–988)

Holotypus, Sächsische Schweiz, leg. SCHÖNBACH.

DEI: Holotypus, Saxon.

subtiligranulata SCHEERPELTZ, 1958 (*Parapisalia*)

(Mitt. Münch. Ent. Ges. 48, 55–56)

Holotypus, Gebiet der Rattendorfer Alm, Karnische Alpen, 1948, leg. STRUPI & HÖLZEL, in Coll. SCHEERPELTZ; Paratypen, von der gesamten Kette der Karnischen Alpen, aber nur im Subalpinum und Alpinum.

DEI: 1 Paratypus, Karn. Alp., Zottachkopf, leg. STRUPI.

subtilicornis BENICK, 1943 (*Atheta*)

(Ent. Bl. 39, 66)

♂ ? Holotypus, Bulgarien, Rila Kloster, 1911, leg. HILF, im DEI.

subtilissima KRAATZ, 1854 (*Homalota*)

(Stett. Ent. Ztg. 15, 126)

Syntypen; 1 Ex., Ufer der Ahr; Kassel; Bayern; Leipzig; Lyon.

DEI: 2 Syntypen, Cassel, leg. RIEHL.

subviridipennis BERNHAUER, 1912 (*Pedinolinus*)

(Ent. Mitt. 1, 203)

Syntypen, Usambara, im DEI und Coll. BERNHAUER.

DEI: 2 Syntypen, Usambara.

sudanensis BERNHAUER, 1928 (*Paederus*)

(Verh. zool. bot. Ges. Wien 77 (1927), 113–114)

Syntypen, Ägyptischer Sudan, Ambadi-See, 2. 3. 1913, im DEI und in Coll. BERNHAUER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

sulcata KIESENWETTER, 1850 (*Tachysus*)

(Stett. Ent. Ztg. 11, 218)

Syntypen, Perpiñiacum, Venetia.

DEI: 1 Syntypus, Venedig, leg. v. KNW.

sulcicollis BERNHAUER, 1932 (*Leptusa*)

(Kol. Rundsch. 17 (1931), 236)

2 Syntypen, Sardinien, Mte. Genargentu, Arzito, leg. KRÜGER, in Coll. BERNHAUER und LEONHARD.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

sulcifer BERNHAUER, 1934 (*Atheta*)

(Ent. Nachrichtenbl. Tropbau 8, 18)

Syntypen, China, Mittel-Szechuan, Hwa-Yin-Shan, 1600 m, leg. REITTER.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

sumatrensis L. W. SCHAUFLER, 1887 (*Edaphus*)

(Horae Soc. Ent. Ross. 21, 110)

Syntypen, Sumatra.

DEI: ♀ Lectotypus, 1 ♀ Paralectotypus, Sumatra, Tabak, von PUTHZ (Philippia 2, 88; 1974) festgelegt.

suturalis KRAATZ, 1859 (*Scopaeus*)

(Arch. Nat. 25, 130)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 11 Syntypen, Ceylon; 2 Syntypen, India orient.

syticola KRAATZ, 1856 (*Oxyopoda*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 173–174)

Zahlreiche Syntypen, Brieselanger Forst bei Berlin, unter feuchtem Laub, leg. KRAATZ.

DEI: 6 Syntypen, Berlin.

syriacus REITTER, 1889 (*Paederus*)

(Ent. Nachr. 15, 170)

Syntypen, Syrien.

DEI: 1 Syntypus, Mesopotam., Assur.

tachyporoides KRAATZ, 1859 (*Coproporus*)

(Arch. Nat. 25, 60)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 5 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

tardus KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)

(Arch. Nat. 25, 84)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

tatsienluensis SCHEERPELTZ, 1962 (*Atheta*)

(Beitr. Ent. 12, 598–600)

♀ Holotypus, Nitou Tatsienlu, Szechuan, China, leg. REITTER, im DEI.

temporalis FAUVEL, 1895 (*Eupiestus*)

(Rev. d'Ent. 14, 188)

Syntypen, Birma, Carin Ghéou, 1300–1400 m, 2., 3.; Carin Ascuii Ghéou, 1400–1500 m, 3., 4., leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Carin Ascuii Ghéou, 1400–1500 m, 3.–4. 1888, leg. FEA.

temporalis APPFELBECK, 1907 (*Sipalia*)

(Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien 116, Abt. 1, 511–512)

Syntypen, Albanien, bei Oroshti, im Miriditengebiet, aus Eichenlaub gesiebt, 1905, leg. APPFELBECK.

DEI: 1 Syntypus, Merdita, Bulschari.

tenellus BENICK, 1916 (*Stenus*)

(Ent. Mitt. 5, 244–245)

Holotypus, Usambara, im DEI.

tenuis WEISE, 1877 (*Homalium*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 21, 95)

Syntypen, Japan, Hagi, leg. HILLER.

DEI: 1 Syntypus, Japonia.

tenuicornis KRAATZ, 1856 (*Aleochara*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 89 nota; nom. nov. pro *rufipes* MULSANT & REY, 1853, Opuscules Entomologiques 2, 63–64)

Syntypen, Languedoc, Provence.

DEI: 1 Syntypus, Gall.

tenuicornis BERNHAUER, 1912 (*Coproporus*)
(Ent. Mitt. 1, 207)

Syntypen, Südost-Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT, im DEI und Coll. BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, S.O. Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT.

tenuicornis KRAATZ, 1857 (*Hypoecypus*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 388 nota)

Holotypus, Griechenland, leg. VON KIESENWETTER.

tenuicornis KRAATZ, 1859 (*Leistotrophus*)

(Arch. Nat. 25, 68)

Holotypus, Nord-Indien, leg. BACON, im DEI.

tenuicornis KRAATZ, 1859 (*Lispinus*)

(Arch. Nat. 25, 187)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 2 Syntypen, Ceylon.

tenuipes KRAATZ, 1858 (*Haematodes*)

(Berl. Ent. Ztschr. 2, 363)

Syntypen, Brasilien, im Mus. DEYROLLE und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Brasil.

terrestris KRAATZ, 1856 (*Oxypoda*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 184 – 185)

Syntypen, Schönhause bei Berlin, unter Spreu, leg. KRAATZ.

DEI: 1 Syntypus, Berlin.

testacea KRAATZ, 1859 (*Bolitochara*)

(Arch. Nat. 25, 7 – 8)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 1 Syntypus, Ind. post., leg. HELFER.

testacea KRAATZ, 1859 (*Oligota*)

(Arch. Nat. 25, 44)

3 Syntypen, Ceylon, unter faulenden Früchten, leg. NIETNER.

DEI: 2 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

testaceipennis KRAATZ, 1859 (*Acanthoglossa*)

(Arch. Nat. 25, 145 – 146)

Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.

testaceum KRAATZ, 1859 (*Cryptobium*)

(Arch. Nat. 25, 120)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 4 Syntypen, Ostindien, leg. HELFER.

testaceum KRAATZ, 1857 (*Lathrobium*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 682 – 683)

Syntypen, Österreich, leg. Graf v. FERRARI; 1 Ex., Tirol, leg. GRIMMER, in Coll. SCHAUER.

DEI: 1 Syntypus, Austr., leg. FERRARI.

testaceum KRAATZ, 1859 (*Lispinus*)

(Arch. Nat. 25, 188)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

testaceum KRAATZ, 1859 (*Mycetoporus*)

(Arch. Nat. 25, 64)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 1 Syntypus, Ost-Indien.

tetragonocephalus NOTMAN, 1924 (*Philonthus*)

(Techn. Publ. N.Y. State Coll. For. Syrac. Univ. 17, 271 – 272)

Holotypus, Cranberry Lake, N.Y. C 110, 6. 25 – 1922, leg. HATCH, in Coll. NOTMAN; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Cranberry Lake, N.Y., 3. 7. 1922, leg. HATCH.

thinobioides KRAATZ, 1854 (*Homalota*)

(Stett. Ent. Ztg. 15, 125)

Mehrere Syntypen, Leipzig; bei Lyon, leg. REY.

DEI: 3 Syntypen, Leipzig.

thoracicus BAUDI, 1857 (*Sunius*)

(Berl. Ent. Ztschr. 1, 105)

Zahlreiche Syntypen, Cypern, leg. TRUQUI.

DEI: 1 Syntypus, Cypern.

thulea POPPIUS, 1909 (*Atheta*)

(Acta Soc. Fn. Flor. Fenn. 31, nr. 8, 25 – 26)

Zahlreiche Syntypen; Halbinsel, Kanin: Gorby, 24. 6.; Konuschin, 30. 6.; Bugranitza, 4., 6. und 8. 7.; Tarhanowa, 11. 7.; Kanin Noss, 13. 7.; Krinka, 15. 7. und 6. 8.; Madoha, 16. 7.; Kambalnitza, 19., 20. und 22. 7.; Ribnaja, 24. 7.; Mikulin, 26. 7.; alle 1903, leg. POPPIUS, im Mus. Helsinki.

DEI: 2 Syntypen, Kanin, leg. POPPIUS.

torrentum CAMERON, 1924 (*Lesteva*)

(Trans. Ent. Soc. London 1924, 171)

Syntypen, Mussorie District, 6500 – 7000 Fuß.

DEI: 1 Syntypus, Kemti Falls, Mussorie, 25. 3. 1921, leg. CAMERON.

torrentum CAMERON, 1930 (*Troglophloeus*)

(Fauna Brit. Ind. Col. Staph. 1, 196 – 197)

Syntypen, Mussorie district, Arni Gad.

DEI: 2 Syntypen, Arni Gad., Mussorie, 12. 6. 1921, leg. CAMERON.

toxopei WENDELER, 1926 (*Paederus*)

(Treubia 7, 329 – 330)

Syntypen; 1 ♂, Buru, Station 7, 800 – 1300 m, 26. 3. 1921; 1 ♂, Station 13, 31. 8. 1921; 1 ♀, 28. 2. – 3. 3. 1922; 1 ♀, Mt. Efharat, 1300 m, 3. 1922; 5 ♂♂, 4 ♀♀, Station 17, 22. – 30. 10. 1921.

DEI: 1 Syntypus, Buru, Station 17, 22. – 23. 10. 1921, leg. TOXOPEUS.

transadriaticus BREIT, 1911 (*Octavius*)

(Wien. Ent. Ztg. 30, 170 – 171)

Syntypen, Mte. Maggiore bei Abazzia, leg. BREIT und CURTI.

DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

transitoria BENICK, 1940 (*Atheta*)
(Ent. Bl. 36, 186)

♂ Holotypus, zahlreiche Paratypen, Tirol, Lechtal, Gramais, leg. KNABL, in Coll. BENICK; 1 Paratypus, Tirol, Hoher Tauern, Nabfeld, Quellmoos, 10. 6. 1936, leg. BERNHAUER.
DEI: 1 Paratypus, Gramais, Tirol, Hirschlesbrücke, Miomoos ?, leg. KNABL.

translucidum KRAATZ, 1857 (*Omalium*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 998–999)

Syntypen, mittleres und südliches Deutschland, ohne nähere Fundortangabe.
DEI: 2 Syntypen, Silesia.

transsylvaniaicus WEISE, 1875 (*Quedioides*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 19 (1–2), 356–357)

Syntypen, Ungarn, am Hoverla und Mencil.
DEI: 4 Syntypen, Carpathen, Hoverla.

transversicollis LUZE, 1905 (*Olophrum*)

(Verh. zool. bot. Ges. Wien 55, 41)

20 Syntypen, Osttirol, Taurers, 850 m, leg. LUZE.

DEI: 1 Syntypus, Taurers, Tir., leg. LUZE.

triangulum KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 273–274)

Syntypen, am Ufer des Mittelmeeres und der Ostsee.

DEI: 3 Syntypen, Mare mediterr.

tricarinatus KRAATZ, 1859 (*Stenus*)

(Arch. Nat. 25, 164–165)

Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.

tricolor KRAATZ, 1859 (*Leptacinus*)

(Arch. Nat. 25, 110–111)

Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Ceylon, leg. NIETNER; 2 Paralectotypen, Ostindien, leg. HELFER, von SMETANA festgelegt.

tricuspidata KRAATZ, 1857 (*Myrmedonia*)

(Linnaea 11, 49–50)

Syntypen, Ceylon, Termitenhügel bei Negambo, 1855, leg. NIETNER.

DEI: 15 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

tridentata KRAATZ, 1859 (*Homalota*)

(Arch. Nat. 25, 31)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

trigemina EPPELSHEIM, 1880 (*Homalota*)

(Verh. zool. bot. Ges. Wien 29 (1879), 459–460)

♂ Syntypen, Kaukasus, Ach-Bulach, von LEDER erhalten.

DEI: 1 Syntypus, Kaukasus, LEDER.

trigonocephalus KRAATZ, 1859 (*Leptacinus*)

(Arch. Nat. 25, 109–110)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: Lectotypus, 8 Paralectotypen, Ceylon, leg. NIETNER, von SMETANA festgelegt.

trinidadensis BERNHAUER, 1915 (*Paede*)

(Stett. Ent. Ztg. 76, 296)

Syntypen, Trinidad, Caparo, leg. HEYNE.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

trinotata KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 272–273)

Syntypen, ohne Fundortangaben.

DEI: 5 Syntypen, Berlin.

trinotatus KRAATZ, 1859 (*Sunius*)

(Arch. Nat. 25, 149–150)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

trivialis KRAATZ, 1859 (*Aleochara*)

(Arch. Nat. 25, 18)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 9 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

trivialis KRAATZ, 1857 (*Stenus*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 760–761)

Mehrere Syntypen, Tirol, leg. KAHR.

DEI: 3 Syntypen, Austr., leg. KAHR.

truncatus CAMERON, 1925 (*Osorius*)

(Treibia 6, 177)

Holotypus, 3 Paratypen, Verloten Eiland, 4. 1920; 2 Paratypen, Krakatau, 4. 1920, leg. DAMMERMANN.

DEI: 1 Paratypus, Krakatau, 4. 1920.

tuberculata KRAATZ, 1859 (*Homalota*)

(Arch. Nat. 25, 32)

Holotypus, India orientalis, leg. HELFER. — DEI: Holotypus, Ind. post., leg. HELFER.

tuberculicollis KRAATZ, 1859 (*Homalota*)

(Arch. Nat. 25, 33–34)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

tuberiventris KRAATZ, 1859 (*Aleochara*)

(Arch. Nat. 25, 14)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 1 Syntypus, Ind. post., leg. HELFER.

turkestanicum KORGE, 1968 (*Cryptobium*)

(Ent. Bl. 64, 56–57)

♂ Holotypus, Mts. Karategin, Sary-pul, 1482 m, 1898, leg. HAUSER, im DEI.

turrialbanus WENDELER, 1927 (*Paederus*)

(Neue Beitr. syst. Insektenk. 4, 2, Fig. 1–3)

Syntypen, Costa Rica, Turrialba, 800 m, in Coll. WENDELER.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Costa Rica, Turrialba, 900 m.

tylocephalus KRAATZ, 1857 (*Stenus*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 761—762 nota)

Holotypus, Dalmatien oder Tirol, leg. KAHR, im DEI.

tyrrhenius DODERO, 1908 (*Leptotyphlus*)

(Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 3, 638)

Syntypen, Monte Argentario, Isola del Giglio e dintorni di Grosseto; Toscana meridionale.

DEI: 1 Syntypus, Is. Giglio, G. Doria.

umbilicata FAUVEL, 1895 (*Stilocopeis*)

(Rev. d'Ent. 14, 223—224)

Syntypen; Carin Asciuii Ghéou, 1400—1500 m, 3.—4., leg. FEA. Pulo Penang, leg. RAFFRAY. Philippines, Dolores, Antipolo, leg. SIMON. Sumatra.

DEI: 3 Syntypen, Carin Asciuii Ghéou, 1400—1500 m, 3.—4. 1888, leg. FEA.

umbrieus BAUDI, 1869 (*Stenus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 13, 395)

Syntypen, Umbrien, Trasimener See.

DEI: 3 Paralectotypen, Lac. Trasimeno, von PUTHZ (Boll. Soc. ent. Ital. 102, 171; 1970) festgelegt.

umbrina KRAATZ, 1857 (*Hoplandria*)

(Linnaea II, 5—6)

Syntypen, Columbian, leg. MORITZ.

unicolor KRAATZ, 1859 (*Lathrobium*)

(Arch. Nat. 25, 117)

Syntypen, Ost-Indien, leg. BACON.

DEI: 5 Syntypen, India orient.

usambarae BERNHAUER, 1912 (*Coproporus*)

(Ent. Mitt. 1, 207—208)

Syntypen, Usambara, im DEI und Coll. BERNHAUER.

DEI: 3 Syntypen, Usambara, Nguelo.

usambarae BERNHAUER, 1912 (*Eleusis*)

(Ent. Mitt. 1, 177)

Syntypen, Usambara, im DEI und Coll. BERNHAUER.

DEI: 1 Syntypus, Usambara.

uvide KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)

(Arch. Nat. 25, 138)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 7 Syntypen, Ceylon.

vagans CAMERON, 1930 (*Trogophloeus*)

(Fauna Brit. Ind. Col. Staph. 1, 198—199)

Syntypen; Dehra Dun, Nun Nadi; Mussoorie, Ringal Gad; Almora, Dwarakhet, 5000—6000 Fuß.

DEI: 1 Syntypus, Kaligad, Dehra Dun, 10. 7. 1921, leg. CAMERON.

vagepunctata KRAATZ, 1856 (*Aleochara*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 99 nota)

Syntypen, Ungarn, leg. FRIWALDSKY.

DEI: 1 Syntypus, Ungarn, leg. FRIWALDSKY.

valida KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 274)

3 ♀ Syntypen, Kärnthner Alpen, im DEI.

validiuscula KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 261)

Syntypen, Sächsische Schweiz, leg. MÄRKEL.

DEI: 1 Syntypus, Saxonia, leg. MÄRKEL.

validum KRAATZ, 1857 (*Omalium*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 977—978)

Syntypen; 1 Ex., Schlesien, Grafschaft Glatz, leg. ZEBBE, in Coll. KRAATZ; 1 Ex., Sachsen, leg. MÄRKEL, „in den Königl. Sammlungen“ (Dresden).

DEI: 1 Syntypus, Silesia, Glatz.

variceps KRAATZ, 1859 (*Paederus*)

(Arch. Nat. 25, 152)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 7 Syntypen, Ceylon.

varicornis KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 292—293)

Syntypen, Deutschland, ohne nähere Fundortangaben.

DEI: 4 Syntypen, Hessen.

varicornis KRAATZ, 1859 (*Leptusa*)

(Arch. Nat. 25, 13)

Einige Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 2 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

variipennis KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)

(Arch. Nat. 25, 85—86)

Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 7 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; 2 Syntypen, Ostindien.

variolosus FAUVEL, 1895 (*Leptochirus*)

(Rev. d'Ent. 14, 183)

Syntypen; Birma, Carin Cheba, 500—1100 m, 1., 12.; Carin Asciuii Cheba, 1200—1300 m, 12.; Carin Ghéou, 1300—1400 m, 2., 3.; leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Carin Asciuii Cheba, 1200—1300 m, 12. 1887, leg. FEA.

varipennis KRAATZ, 1859 (*Oxytelus*)

(Arch. Nat. 25, 172)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: ♀ Lectotypus, 3 ♀ Paralectotypen, Ceylon, von HAMMOND festgelegt.

variventris KRAATZ, 1859 (*Homalota*)

(Arch. Nat. 25, 34)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

***telebiticus* BENICK, 1915 (*Stenus*)**

(Ent. Bl. 11, 230–231)

Zahlreiche Syntypen, Velebit, Ostaria, 1910, leg. HILF.

DEI: 10 Syntypen, Velebit, Ostaria, 1910, leg. HILF.

***velox* KRAATZ, 1856 (*Homalota*)**

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 201)

Syntypen; Ufer der Ahr, leg. KRAATZ; Thüringen, Tirol, Baiern und Österreich.

DEI: 2 Syntypen, Ahrweiler, leg. KRAATZ; 1 Syntypus, Thur., leg. MÜLLER; 1 Syntypus, Styria, leg. KAHR.

***velutinus* FAUVEL, 1895 (*Stiliculus*)**

(Rev. d'Ent. 14, 226)

Syntypen; Birma, Carin Asciuii Cheba, 1200–1300 m, 1.; Carin Asciuii Ghécu, 1400–1500 m, 3.–4., leg. FEA. Sikkim, Darjeeling, leg. CHRISTIE.

DEI: 1 Syntypus, Birma, Carin Cheba, 1888, leg. FEA.

***verberans* ERICHSON, 1840 (*Aleochara*)**

(Genera et Species Staphylinorum, 164)

Syntypen, Brasilien und Columbien.

DEI: 1 Syntypus, Bahia L.

***texanus* FENYES, 1914 (*Atheta*)**

(Arch. Nat. 80 A 2, 50)

Holotypus, Formosa, Taihorin, leg. SAUTER, det. Nr. 4431, im DEI; 1 Paratypus, vom selben Fundort; 2 Paratypen, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER.

DEI: Holotypus, Formosa, Taihorin, 7. 1911, leg. SAUTER; 1 Paratypus, Formosa, Kosempo, 1911, leg. SAUTER.

***vittatica* FAUVEL, 1904 (*Aleochara*)**

(Rev. d'Ent. 23, 67)

Syntypen; Nilghiris. Birma, Shwego-myo, 8.; Carin Asciuii Ghecu, 1400–1500 m, 3., 4.; Carin Asciuii Cheba, 1200–1300 m, 12.; alle leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Carin Asciuii Ghecu, 1400–1500 m, 3.–4. 1888, leg. FEA.

***vicaria* KRAATZ, 1859 (*Homalota*)**

(Arch. Nat. 25, 38–39)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 5 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

***vicina* KRAATZ, 1856 (*Homalota*)**

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 286–287)

Syntypen, bei Berlin und Leipzig, an feuchten Localitäten.

DEI: 1 Syntypus, Freienwalde; 1 Syntypus, Leipzig.

***vicina* KRAATZ, 1859 (*Lithocaris*)**

(Arch. Nat. 25, 137)

Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.

***vicina* KRAATZ, 1858 (*Oxyopoda*)**(Berl. Ent. Ztschr. 2, 51; nom. nov. pro *soror* KRAATZ, Stett. Ent. Ztg. 16, 331–332; 1855)

Holotypus, Griechenland, leg. v. KIESENWETTER, im DEI.

***vicinum* KRAATZ, 1859 (*Dolicaon*)**

(Arch. Nat. 25, 118)

Holotypus, India orientali, leg. HELFER, im DEI.

***viennense* SCHEERPELTZ, 1930 (*Olophrum*)**

(Verh. zool. bot. Ges. Wien 79 (1929), 90–94; Taf. 3, Fig. 23)

♂ Holotypus, Mariabrunn bei Wien, leg. SKALITZKY in Coll. SCHEERPELTZ; zahlreiche Paratypen aus Österreich, Südmähren, Slowakei, Nordwestungarn, Neusiedler See.

DEI: 2 Paratypen, Neusiedler See, leg. BERNHAUER.

***victus* PUTZ, 1974 (*Edaphus*)**

(Philippia 2, 85)

♂ Holotypus, 12 ♂♂, 23 ♀♀ Paratypen, Vietnam, Provinz Quang Tri, 7 mi. W of Dong Ha, Cam Lo, 17. 6. 1970, leg. GILLOGLY; 15 ♂♂, 42 ♀♀ Paratypen, 1 mi N Quang Tri, 7., 8. 1970, leg. GILLOGLY. Holotypus, Paratypen, im Mus. Genf, Paratypen, in Coll. PUTZ und im DEI.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, Vietnam, Quang Tri Prov., 1 mi. N. Quang Tri, 30. 7. und 24. 8. 1970, leg. GILLOGLY.

***vitis* KRAATZ, 1859 (*Palagria*)**

(Arch. Nat. 25, 5–6)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 1 Syntypus, Ind. post., leg. HELFER.

***vitis* KRAATZ, 1859 (*Lithocaris*)**

(Arch. Nat. 25, 139)

Syntypen Ceylon, leg. NIETNER; Ostindien, leg. HELFER.

DEI: 6 Syntypen, Ceylon; 2 Syntypen, India or.

***vitis* KRAATZ, 1859 (*Oxyopoda*)**

(Arch. Nat. 25, 28)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 1 Syntypus, Ind. post., leg. HELFER.

***vittipennis* KRAATZ, 1859 (*Creophilus*)**

(Arch. Nat. 25, 67)

Syntypen Nord-Indien, leg. BACON; Süd-Indien, Decan, leg. SAUNDERS.

DEI: 3 Syntypen, India sept., leg. BACON; 1 Syntypus, Decan, leg. SAUNDERS.

***villosula* KRAATZ, 1856 (*Homalota*)**

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 305–306)

Syntypen, Steiermark, leg. KAHR.

DEI: 1 Syntypus, Styria.

***virgata* FAUVEL, 1895 (*Stenus*)**

(Rev. d'Ent. 14, 210)

Syntypen; Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12.; Carin Ghécu, 1300–1400 m, 2., 3., 4.; Carin Asciuii Ghécu, 1400 bis 1500 m, 3.–4.; alle leg. FEA. Bengale, Kurseong, Sikkim, Darjeeling, leg. CHRISTIE.

DEI: 2 Syntypen, Carin Asciuii Ghécu, 1400–1500 m, 3.–4. 1888, leg. FEA.

***virgulatus* FAUVEL, 1895 (*Staphylinus*)**

(Rev. d'Ent. 14, 254–255)

Syntypen; Birma, Carin Cheba, 500–1000 m, 12.; Carin Asciuii Ghécu, 1400–1500 m, 3.–4., leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Carin Asciuii Ghécu, 1400–1500 m, 3.–4. 1888, leg. FEA.

viridans FAUVEL, 1895 (*Eleusis*)

(Rev. d'Ent. 14, 189—190)

Syntypen: Birma, Carin Cheba, 900—1100 m., 5.—12.; Carin Asciuii Cheba, 1200—1300 m., 1., 3., 4.; Tenasserim, Thagata, 4.; leg. FEA. Java, Teibodas, 10., leg. BECCARI; Pengalengan, 1300 m, leg. FRUHSTORFER.
DEI: 1 Syntypus, Carin Asciuii Cheba, 1200—1300 m., 1. 1888, leg. FEA.

vittatus KRAATZ, 1859 (*Tachinomorphus*)

(Arch. Nat. 25, 55)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELPER.

DEI: Lectotypus, India orient., von ULLRICH ausgewählt, hiermit festgelegt.

vulcanus WENDELER, 1926 (*Paederus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1926, 203)

Syntypen, Costa Rica, Turrialba, 800—900 m, in Coll. WENDELER, ex Coll. HEYNE.

DEI: 1 ♀ Syntypus, Costa Rica, Turrialba, 800 m, ex Coll. HEYNE.

wagneri BENICK, 1917 (*Stenus*)(Ent. Mitt. 6, 262—264: als var. zu *ampliventris* SAHLBERG beschrieben)

Holotypus, 1 Paratypus, Mark Brandenburg, am Rande eines Hochmoores bei Chorin-Tieröfen, 16. 4. 1916, leg. WAGNER; Holotypus, in Coll. BENICK, Paratypus, in Coll. WAGNER.

DEI: 1 Paratypus, Mark, Umgeb. Chorin, 16. 4. 16, Coll. NERESHEIMER.

wageneri SCHEERPELTZ, 1962 (*Sudanus*)

(Beitr. Ent. 12, 590—593, Fig. 2, 3)

♂ Holotypus, Aegypt. Sudan, Bahr el Zerat, 12. 3. 1913; 2 ♀ Paratypen, Ägypt. Sudan, Bahr el Ghazal b. Bahr el Arab, 4. 3. 1913; Holotypus, 1 ♀ Paratypus, im DEI, 1 ♀ Paratypus, in Coll. SCHEERPELTZ.

DEI: ♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

weiratheri BENICK, 1943 (*Atheta*)

(Ent. Bl. 39, 5—6)

♂ Holotypus, Tsumerka; zahlreiche Paratypen, epirotischer Pindus, im Hochgebirge bei Prevesa und Tsumerka; Veluchi-Gebirge, 7. 1936; leg. WEIRATHER; 1 ♀ Paratypus, Veluchi-Gebirge; 1 ♀ Paratypus, Parnaß alpin, 1. 7. 1909, leg. RAMBOUSEK.

DEI: 1 Paratypus, Griechenland, epir. Pindus, Tsumerka, 1936, Platz Nr. 197, Grundbach, leg. WEIRATHER.

wendeleri FAGEL, 1958 (*Pachypaederus*)

(Explor. Parc nat. Upemba Miss. DE WITTE, fasc. 51, 77—78, Fig. 46, 56)

♂ Holotypus, Durban, 1900, im Inst. roy. Sci. nat. Belgique; 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, Natal, in Coll. SCHEERPELTZ; 1 ♀, Natal, im Mus. Berlin; 1 ♀, Natal, im DEI; 1 ♀, Natal, in Coll. WENDELER; 1 ♀, Natal, im Mus. München; 1 ♀, Delagoa Bay; 1 ♀, Natal, Kloof, 1500 ft., 8. 1926, leg. TURNER, im Mus. London; 1 ♂, Harding, Natal; 2 ♀♀, Natal, im Inst. roy. Sci. nat. Belgique.

DEI: 1 ♀ Paratypus, Nat.

xanthocephalus KRAATZ, 1859 (*Staphylinus*)

(Arch. Nat. 25, 74—75)

Syntypen, Nord-Indien, leg. SCHAUM und BACON.

DEI: 1 Syntypus, Himalaya, leg. SCHAUM; 1 Syntypus, Ostindien (Etikettierungs- oder Druckfehler?).

xanthomerus KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)

(Arch. Nat. 25, 83)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELPER.

DEI: 1 Syntypus, Ostindien.

xanthoptera KRAATZ, 1859 (*Homalota*)

(Arch. Nat. 25, 30)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELPER.

DEI: 1 Syntypus, Ind.-post., leg. HELPER.

xanthopsga KRAATZ, 1858 (*Oligota*)

(Berl. Ent. Ztschr. 2, 351)

Syntypen, bei Paris, leg. AUBÉ.

DEI: Lectotypus, Paris, AUBÉ, von WILLIAMS (Ent. monthly Mag. 108, 19; 1972, als *xanthophaga*) festgelegt.*zosteras* THOMSON, 1856 (*Homalota*)

(Oefv. Svenska Vet.-Akad. Förh. 1856, 103—104)

Syntypen, an der Küste von Lomma in Skåne.

DEI: 1 Syntypus, Scania.

Wahrscheinlich nicht beschrieben!

alpigena SCHEERPELTZ (*Leptusa*)

DEI: 1 ♀, Grenze zw. Steger Hütte und Hartl-Alm, Nordost-Fuß d. Gamsstein, aus den Dunstlöch. am steir. nied.-öst., 16.—18. 6. 1924, ca. 1100 m, leg. KÄUFEL, als Cotypus ausgezeichnet.

alpigrada SCHEERPELTZ (*Leptusa*)

DEI: 1 Ex., Lechtaler Alpen, Umg. Gramais, ob. Otterbachtal, unter Weidenlaub, ca. 1700 m, leg. KNABL, als Cotypus ausgezeichnet.

alpina SCHEERPELTZ (*Leptusa*)

DEI: 1 ♀, N. Steiermark, Hochlantsch, als Cotypus ausgezeichnet.

angusticeps BERNHAUER (*Cryptobium*)

DEI: 1 Ex., Muzo, Columbian, leg. THIEME, als Typus ausgezeichnet.

aspera FAUVEL (*Placusa*)

DEI: 1 Ex., Amazonas, als Typus ausgezeichnet.

atricentris BERNHAUER (*Scopaeus*)

DEI: 1 Ex., Concepc., 6. 1903, als Typus ausgezeichnet.

australis BERNHAUER (*Coenonica*)

DEI: 1 Ex., Cairns, 7. 05, als Typus ausgezeichnet.

autaretana SCHEERPELTZ (*Leptusa*)

DEI: 1 Ex., Col Lautaret Dauph. STRUPI, als Cotypus ausgezeichnet.

biarmatum BERNHAUER (*Cryptobium*)

DEI: 2 Ex., Venezuela, Cuman, leg. V. BRUCK, als Typen ausgezeichnet.

bicallosus BERNHAUER (*Astilbus*)

DEI: 1 Ex., Mexiko, als Typus ausgezeichnet.

bifoveicollis BERNHAUER (*Hoplandria*)

DEI: 1 Ex., Sr. Durango, Mexico, coll. SPEYER, als Typus ausgezeichnet.

bogotae BERNHAUER (*Oxytelus*)

DEI: 1 Ex., bei Bogota, als Typus ausgezeichnet.

brasiliianus BERNHAUER (*Lispinus*)

DEI: 4 Ex., S. Catharina, Theresopolis, 188?, FRUHSTORFER, 1 Ex., Brasilia, St. Catharina als Paratypen ausgezeichnet.

brasilianus BERNHAUER (*Palaminus*)

DEI: 2 Ex., S. Catharina, Theresopolis, leg. FRUHSTORFER, als Typen ausgezeichnet.

brivicornis DODERO (*Leptophylus*)

DEI: 2 Ex., Arizto, Sand. 8. 1911, leg. DODERO, als Typen ausgezeichnet.

bulgarica BENICK (*Atheta*)

DEI: 2 Ex., Bulg. Sejmen, Marica, 21. 3. 1903, leg. RAMBOUSEK, als Typus und Cotypus ausgezeichnet.

- cadorica** SCHEERPELTZ (*Leptusa*)
 DEI: 1 ♀, Dolomiten, Marmolata, Nordhang, Zwergrauweide auf Felsen, 2200 m, Sommer 1955, leg. MOREZZI, als Cotypus ausgezeichnet.
- californicus** BERNHAUER (*Stilicus*)
 DEI: 1 Ex., Californien, als Typus ausgezeichnet.
- carpathicola** SCHEERPELTZ (*Leptusa*)
 DEI: 1 ♂, Bucsa ?, Siebenbürgen, als Cotypus ausgezeichnet.
- castaneus** BERNHAUER (*Betonuchus*)
 DEI: 1 Ex., Nov. Gran., als Typus ausgezeichnet.
- caucasicus** BENICK (*Atheta*)
 DEI: 3 Ex., Caucasus occ., Krasnaja poljana, 7. 1910, leg. ROUBAL, als Cotypus ausgezeichnet.
- chilense** BERNHAUER (*Lathrimaeum*)
 DEI: 1 Ex., Chile, als Typus ausgezeichnet.
- chilensis** BERNHAUER (*Neoleptoglossa*)
 DEI: 9 Ex., Chili, als Typen ausgezeichnet.
- christinae** BRUNDIN (*Atheta*)
 DEI: 1 Ex., Calabria, Sta. Christina, leg. PAGANETTI, als Typus ausgezeichnet.
- clare** BERNHAUER (*Atheta*)
 DEI: 1 Ex., Passa Quattro, Minas Zikan, als Typus ausgezeichnet.
- comparabilis** LEA (*Homalota*)
 DEI: 1 Ex., N. Australien, als Cotypus ausgezeichnet.
- conradti** BERNHAUER (*O ntholestes*)
 DEI: 1 Ex., S. O. Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT, als Typus ausgezeichnet.
- conradti** BERNHAUER (*Gyrophaena*)
 DEI: 1 Ex., S. O. Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT, als Typus ausgezeichnet.
- costaricense** BERNHAUER (*Cryptobium*)
 DEI: 1 Ex., C. R., Vara Blanca, zwischen Barba und Poas, 2000 m, leg. SCHMIDT, als Typus ausgezeichnet.
- costaricensis** BERNHAUER (*Medon*)
 DEI: 1 Ex., C. R., Vara Blanca, zwischen Barba und Poas, 2000 m, leg. SCHMIDT, als Typus ausgezeichnet.
- costaricensis** BERNHAUER (*Oxytelus*)
 DEI: 4 Ex., San José, C. R., leg. SCHMIDT, als Typen ausgezeichnet.
- cribellus** BERNHAUER (*Lispinus*)
 DEI: 2 Ex., Sikora, Madagaskar, Annanarivo, als Typen ausgezeichnet.
- cubae** BERNHAUER (*Belonuchus*)
 DEI: 1 Ex., Cuba, DOHRN, als Typus ausgezeichnet.
- densior** BERNHAUER (*Neoleptoglossa*)
 DEI: 2 Ex., Chile, FAIRMAIRE, als Typen ausgezeichnet.
- densiventris** BERNHAUER (*Hoplardia*)
 DEI: 1 Ex., Luzon-Benguet, Baguio, 2170 m, leg. BOETTCHER, als Paratypus ausgezeichnet.
- dentiventris** BERNHAUER (*Palaminus*)
 DEI: 7 Ex., S. Catharina, Theresopolis, leg. FRUHSTORFER, als Typen ausgezeichnet.
- distinctiventris** ROUBAL (*Apimela*)
 DEI: 1 Ex., Ca. b. Kluchor, 7. 1912, leg. ROUBAL, als Typus ausgezeichnet.
- diversiceps** BERNHAUER (*Medon*)
 DEI: 4 Ex., North-Queensland, Cairns, 7/05, als Typus und Paratypen ausgezeichnet.
- diversipunctus** BERNHAUER (*Philonthus*)
 DEI: 2 Ex., Malay. Ins., als Typen ausgezeichnet.
- domingoensis** BERNHAUER (*Medon*)
 DEI: 1 Ex., San Domingo, als Typus ausgezeichnet.
- excisus** BERNHAUER (*Palaminus*)
 DEI: 5 Ex., S. Catharina, Theresopolis, leg. FRUHSTORFER, als Typen ausgezeichnet.
- fischeri** BERNHAUER (*Xantholinus*)
 DEI: 1 Ex., Ctr.-Brasil., R. FISCHER, als Typus ausgezeichnet.
- flavicauda** BERNHAUER (*Alechara*)
 DEI: 4 Ex., S. Catharina, Rio Capivary, 1888, leg. FRUHSTORFER, als Typen ausgezeichnet.
- foreolicauda** SCHEERPELTZ (*Leptusa*)
 DEI: 1 ♀, Elsenkappel, Kärnten, Jevan, 1400 m, Farneriebe, 25. 7. 1942, leg. SCHEERPELTZ, als Cotypus ausgezeichnet.
- frater** BERNHAUER (*Phloeonomus*)
 DEI: 5 Ex., Queensland, Cairns, als Paratypen ausgezeichnet.
- fruhstorferi** BERNHAUER (*Belonuchus*)
 DEI: 8 Ex., Lombok, Sapit, 2000', 4. 1896, leg. FRUHSTORFER, als Typus und Paratypen ausgezeichnet.
- fuscata** BAUDI (*Leptusa*)
 DEI: 5 Ex., Alp.mar., als Cotypus ausgezeichnet.
- gerlitzenis** SCHEERPELTZ (*Leptusa*)
 DEI: 1 ♂, Gerlitzen, 1900 m, Ossiachersee, Cr., 6. 1954, leg. MANDL, als Cotypus ausgezeichnet.
- gracilis** STIERLIN (*Oxypus*)
 DEI: 2 Ex., Sizilien, als Typen ausgezeichnet.
- granadensis** BERNHAUER (*Xantholinus*)
 DEI: 1 Ex., Nov. Gran., Carac., als Typus ausgezeichnet.
- grata** BERNHAUER (*Atheta*)
 DEI: 1 Ex., Insel St. Thomas, als Typus ausgezeichnet.
- grignaensis** SCHEERPELTZ (*Leptusa*)
 DEI: 1 ♀, Lago di Como, Grigna, 6. 7. 57, leg. LIEBMANN, als Cotypus ausgezeichnet.
- guatemalenus** BERNHAUER (*Pae deromimus*)
 DEI: 1 Ex., Guatemala, leg. CONRADT, als Typus ausgezeichnet.
- guttula** BERNHAUER (*Zyrus*)
 DEI: 1 Ex., La Caja, 8 km w. San José, C. R., 1934, leg. SCHMIDT, als Typus ausgezeichnet.
- hackeri** BERNHAUER (*Acylophorus*)
 DEI: 1 Ex., Cairns, leg. HACKER, als Typus ausgezeichnet.
- hackeri** BERNHAUER (*Medon*)
 DEI: 1 Ex., Mulgrave E., leg. HACKER, als Typus ausgezeichnet.
- hackeri** BERNHAUER (*Philonthus*)
 DEI: 1 Ex., Coen District, Cape York, Queensland, leg. HACKER, als Typus ausgezeichnet.
- henningsi** SCHEERPELTZ (*Xantholinus*)
 DEI: 14 Ex., Mark, Umgeb. Nied-Neuendorf; 1 Ex., Umgebung Berlin, Hohen Neuendorf; 1 Ex., Mark, Umgeb. Mittenwalde; alle coll. NERESHEIMER, als Cotypen ausgezeichnet.

- horni* BERNHAUER (*Holotrochus*)**
DEI: 1 Ex., Sikora, Madagaskar, Annanarivo, als Typus ausgezeichnet.
- horni* BERNHAUER (*Medon*)**
DEI: 3 Ex., Cairns, 7./05, als Typen ausgezeichnet.
- horni* BERNHAUER (*Paragyrophaena*)**
DEI: 1 Ex., La Caja, 8 km w. San José, C. R., 1934, leg. SCHMIDT, als Typus ausgezeichnet.
- horni* BERNHAUER (*Pinophilus*)**
DEI: 1 ♀, N.S. Wales, als Typus ausgezeichnet.
- horni* BERNHAUER (*Plocioplerus*)**
DEI: 2 Ex., Callanga, Peru, als Typus und Paratypus ausgezeichnet.
- horni* BERNHAUER (*Stilicus*)**
DEI: 2 Ex., C. R., Vara Blanca, zwischen Barba und Poas, 2000 m, leg. SCHMIDT, als Typen ausgezeichnet.
- horni* BERNHAUER (*Tomozelia*)**
DEI: 1 Ex., Annanarivo, Sikora, C. SCHAUFUSS, als Typus ausgezeichnet.
- tdahoensis* BERNHAUER (*Bledius*)**
DEI: 1 ♀, Moscow Mt ID, 14. 5. 1921, leg. MELANDER, als Typus ausgezeichnet.
- insularis* BERNHAUER (*Belonochus*)**
DEI: 1 Ex., S. Domingo, als Typus ausgezeichnet.
- insularis* BERNHAUER (*Oligolinus*)**
DEI: 1 Ex., S. Domingo, als Typus ausgezeichnet.
- iriventris* BERNHAUER (*Philonthus*)**
DEI: 1 Ex., Mexico, Chiapas, als Typus ausgezeichnet.
- jurecekii* RAMBOUSEK (*Homoeusa*)**
DEI: 1 Ex., As. or. 919, Wladivostok, leg. JUREČEK, als Typus ausgezeichnet.
- kaiseri* SCHEERPELTZ (*Leptaea*)**
DEI: 1 ♂, Karawanken, Pelzen, Traventa und Stiege, 20. – 21. 7. 1942, leg. SCHEERPELTZ, als Cotypus ausgezeichnet.
- kamerunensis* BERNHAUER (*Aleochara*)**
DEI: 1 Ex., S. O. Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT, als Typus ausgezeichnet.
- kratzi* BERNHAUER (*Stilicus*)**
DEI: 2 Ex., Malay. Inseln, als Typus und Cotypus ausgezeichnet.
- krügeri* BRUNDIN (*Atheta*)**
DEI: 3 Ex., Italia cent., Camerata Nuova, 1909, leg. KRÜGER, als Typus und Paratypen ausgezeichnet.
- laticeps* SCHEERPELTZ (*Leptusa*)**
DEI: 1 Ex., Alp. Bergam., Oltre il Colle, als Cotypus ausgezeichnet.
- leai* BERNHAUER (*Con osoma*)**
DEI: 2 Ex., N. Queensland, Cairns, 7. 05, als Typus ausgezeichnet.
- liepoliti* BERNHAUER (*Paederus*)**
DEI: 3 Ex., Bahia, Brasil., 1937, leg. BONDAR, als Paratypen ausgezeichnet.
- linkiana* SCHEERPELTZ (*Meotica*)**
DEI: 1 Ex., Dübener Heide, Wöllnau, Winkelmhler Moor, 2. 1. 1965, leg. LINKE, als Cotypus ausgezeichnet.
- longelytrata* BERNHAUER (*Atheta*)**
DEI: 1 Ex., Valdivia, Chile, als Typus ausgezeichnet.
- longicollis* BERNHAUER (*Aleochara*)**
DEI: 1 Ex., S. O. Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT, als Typus ausgezeichnet.
- lucidus* FAUVEL (*Polylobus*)**
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Madagas., als Typen ausgezeichnet.
- major* FAUVEL (*Placusa*)**
DEI: 1 Ex., Peru, Schanusi, als Typus ausgezeichnet.
- malayicus* BERNHAUER (*Belonochus*)**
DEI: 1 Ex., Malay. Ins., als Typus ausgezeichnet.
- monitcola* SCHEERPELTZ (*Leptusa*)**
DEI: 1 ♀, Wechsel, Austr. inf., als Cotypus ausgezeichnet.
- murrayi* BERNHAUER (*Homoiobrachida*)**
DEI: 1 Ex., Port. Philipp., leg. MURRAY, als Typus ausgezeichnet.
- obliqueolatus* BERNHAUER (*Palaminus*)**
DEI: 2 Ex., Caracas, Columb., leg. THIEME, als Typus ausgezeichnet.
- opacellus* BERNHAUER (*Eumalus*)**
DEI: 1 Ex., Sta. Cruz, Mts. Cal., als Paratypus ausgezeichnet.
- opacicollis* BERNHAUER (*Neolitoglossa*)**
DEI: 2 Ex., Chili, als Typen ausgezeichnet.
- pacificum* BERNHAUER (*Anthobium*)**
DEI: 1 Ex., Californien, Rivers, als Paratypus ausgezeichnet.
- pallidipennis* BERNHAUER (*Oligolinus*)**
DEI: 1 Ex., Chile, als Typus ausgezeichnet.
- paradoxa* BERNHAUER (*Falagria*)**
DEI: 1 Ex., Brisbane, leg. HACKER, als Typus ausgezeichnet.
- paraguayana* BERNHAUER (*Atheta*)**
DEI: 1 Ex., Paraguay, als Typus ausgezeichnet.
- parvicollis* BERNHAUER (*Atheta*)**
DEI: 4 Ex., Sitkha; 1 Ex., Kadjak; leg. HOLMBERG, als Typus und Paratypen ausgezeichnet.
- petionensis* SCHEERPELTZ (*Sipalia*)**
DEI: 1 Ex., Pelien, Thessalien, als Cotypus ausgezeichnet.
- perrulata* BERNHAUER (*Atheta*)**
DEI: 1 Ex., Tempelberg, 900 m, Ginyün, bei Bébé, C. China, REITTER, als Cotypus ausgezeichnet.
- piceorufa* BERNHAUER (*Oxyopoda*)**
DEI: 1 Ex., Chili, FAIRMAIRE et SOLIER, als Typus ausgezeichnet.
- piceous* KRAATZ (*Pygostenus*)**
DEI: 1 Ex., ohne Fundortangaben, als Typus ausgezeichnet.
- provincialis* SCHEERPELTZ (*Thinobius*)**
DEI: 2 Ex., Emilia, It. b. Reno; 1 Ex., Bazzaro, Italia, leg. REITTER; als Cotypen ausgezeichnet.
- pseudodichroa* BERNHAUER (*Atheta*)**
DEI: 4 Ex., Cuman, als Typen ausgezeichnet.
- puncticollis* WENDELER (*Pinophilus*)**
DEI: 1 Ex., Costa Rica, Vulkan Turrialba, 10 km NÖ v. Irazu, als Paratypus ausgezeichnet.
- purpurascens* BERNHAUER (*Philonthus*)**
DEI: 1 Ex., (L.F.S.), als Typus ausgezeichnet.

- pusilla*** SCHEERPELTZ (*Leptusa*)
 DEI: 2 Ex., Alp. Bergam., Oltre il Colle, als Cotyphen ausgezeichnet.
quadripunctatus EPPELSHHEIM (*Philonthus*)
 DEI: 2 Ex., Kaukasus, LEDER, als Typen ausgezeichnet.
queenslandicus BERNHAUER (*Philonthus*)
 DEI: 3 Ex., Queensland, Cairns, 7. 05, als Typen ausgezeichnet.
rhaetonicus SCHEERPELTZ (*Leptusa*)
 DEI: 1* Ex., Obersberg bei Schwarzen i.G. A. i., Felsen nächst Almwiesen, 1300 m, 27. 8. 1919, leg. KÄUFEL, als Cotypus ausgezeichnet.
rivulorum SCHEERPELTZ (*Thinobius*)
 DEI: 4 Ex., Gailtaler Alpen, als Cotyphen ausgezeichnet.
robustus KRAATZ (*Apocellus*)
 DEI: 1 Ex., Mexico St., als Typus ausgezeichnet.
roubalietta BRUNDIN (*Atheta*)
 DEI: 1 Ex., Caucasus occ., Krasnaja Poljana, 7. 1910, leg. ROUBAL, als Typus ausgezeichnet.
ruficeps BERNHAUER (*Cryptobium*)
 DEI: 1 Ex., Caracas, Columbian, leg. THIEME, als Typus ausgezeichnet.
rufotestacea BERNHAUER (*Atheta*)
 DEI: 1 Ex., Insel St. Thomas, als Typus ausgezeichnet.
rufotestaceus BERNHAUER (*Lithochardes*)
 DEI: 1 Ex., Columbian, Honda a. Magdalena, als Typus ausgezeichnet.
schaufussi BERNHAUER (*Atheta*)
 DEI: 2 Ex., Sikora, Madagaskar, Annanarivo, als Typen ausgezeichnet.
schmidti BERNHAUER (*Atheta*)
 DEI: 2 Ex., C. R., Vara Blanca, zwischen Barba und Poas, 2000 m, leg. SCHMIDT; 1 Ex., C. R., La Caja, 8 km w. San Jose, 1930, leg. SCHMIDT; als Typen ausgezeichnet.
schmidti BERNHAUER (*Paeoderus*)
 DEI: 2 Ex., Vara Blanca, zwischen Barba und Poas, C. R., 2000 m, leg. SCHMIDT, als Typen ausgezeichnet.
semilividia BERNHAUER (*Atheta*)
 DEI: 1 Ex., N. Amerika, MORITZ, als Typus ausgezeichnet.
semitestacea BERNHAUER (*Silusa*)
 DEI: 1 Ex., Chile, FAIRMAIRE, als Typus ausgezeichnet.
seticollis BERNHAUER (*Atheta*)
 DEI: 1 Ex., Insel St. Thomas, als Typus ausgezeichnet.
sharpi WEISE (*Philonthus*)
 DEI: 1 Ex., Japonia, HILLER, als Typus ausgezeichnet.
siamensis BERNHAUER (*Acanthoglossa*)
 DEI: 1 Ex., Siam, Muok-Lek, 1000', leg. FRUHSTORFER, als Typus ausgezeichnet.
siciliana BRUNDIN (*Atheta*)
 DEI: 2 Ex., Sicilia, Nicolosi, 1906, als Typus und Paratypus ausgezeichnet.
sikorae BERNHAUER (*Leptusa*)
 DEI: 1 Ex., Sikora, Madagaskar, Annanarivo, 1922, leg. SCHAUFUSS, als Typus ausgezeichnet.
sikorae BERNHAUER (*Lespinus*)
 DEI: 1 Ex., Sikora, Madagaskar, Annanarivo, als Typus ausgezeichnet.
soltieri BERNHAUER (*Catadera*)
 DEI: 1 Ex., Chili, coll. FAIRMAIRE, als Typus ausgezeichnet.
soltieri BERNHAUER (*Silusa*)
 DEI: 2 Ex., Chili, FAIRMAIRE et SOLIER, als Typen ausgezeichnet.
spectabilis BERNHAUER (*Placusa*)
 DEI: 8 Ex., Brasilien, St. Catharina, als Typen ausgezeichnet.
sphaericollis SCHUBERT (*Algon*)
 DEI: 2 Ex., Pingshang, Süd-China, leg. KREYENBERG, als Typus und Paratypus ausgezeichnet.
subopacus BERNHAUER (*Phloeonomus*)
 DEI: 1 Ex., Queensland, Cairns, als Paratypus ausgezeichnet.
subremote BRUNDIN (*Atheta*)
 DEI: 8 Ex., Hispania, Astorga, leg. PAGANETTI, als Typus und Paratypen ausgezeichnet.
subtilealutacea SCHEERPELTZ (*Leptusa*)
 DEI: 2 ♂♂, 3 ♀♀, Geritzen, 1900 m, Ossiachersee, Cr., 6. 1954, leg. MANDL, als Cotyphen ausgezeichnet.
sumatrensis BERNHAUER (*Astilbus*)
 DEI: 2 Ex., N. O. Sumatra, Tebing-tingga, leg. SCHULTHEISS, als Typen ausgezeichnet.
sydneyense BERNHAUER (*Conosoma*)
 DEI: 2 Ex., Sydney, 17. 6. 06, als Typus ausgezeichnet.
syrticola BAUDI (*Leptusa*)
 DEI: 2 Ex., Fréjus, Gall., als Cotypus ausgezeichnet.
tahoensis BERNHAUER (*Atheta*)
 DEI: 2 Ex., Tahoe Cy Cal. leg. FENYES, als Typen ausgezeichnet.
thiemeti BERNHAUER (*Sticticus*)
 DEI: 1 Ex., Columb., Gebirge b. Bogota, 5000', als Typus ausgezeichnet.
turrialbanus WENDELER (*Pinophilus*)
 DEI: 1 Ex., Costa Rica, Turrialba, 800 m, als Paratypus ausgezeichnet.
venezolana BERNHAUER (*Atheta*)
 DEI: 2 Ex., Caracas; 1 Ex., MORITZ, als Typen ausgezeichnet.
venezolana BERNHAUER (*Medon*)
 DEI: 1 Ex., Carac. S., als Typus ausgezeichnet.
venezolonus BERNHAUER (*Quedius*)
 DEI: 2 Ex., Caracas, als Typus und Paratypus ausgezeichnet.
vicarium SAHLBERG (*Deliphrum*)
 DEI: 1 Ex., Tolstoinos, leg. SAHLBERG, als Typus ausgezeichnet.
weisei KRAATZ (*Pygostenus*)
 DEI: 1 Ex., Kwai, 3. 99, als Typus ausgezeichnet.
wendleri BERNHAUER (*Hoplandria*)
 DEI: 1 Ex., Luzon-Benguet, Baguio, 2170 m, leg. BOETTCHER, als Paratypus ausgezeichnet.

Zusammenfassung

Vorliegender Katalog beinhaltet die Coleopteren-Typen der Staphylinidae, die in den Sammlungen der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung, Bereich Eberswalde (ehemals Deutsches Entomologisches Institut), aufbewahrt werden.

Summary

This is a catalogue of the types of the Coleoptera of Staphylinidae preserved in the collections of the Department of Taxonomy of Insects of the Institute of Plant Protection Research, Eberswalde (former Deutsches Entomologisches Institut).

Резюме

Данный каталог содержит типы Coleoptera Staphylinidae, хранящиеся в коллекциях отдела таксономии насекомых Научно-исследовательского института защиты растений, Эберсвальдский филиал (бывший Немецкий энтомологический институт).